





# Materia Medica

DISTRIBUIDA

EM CLASSES E ORDENS SEGUNDO SEUS EFEITOS,  
Em que plenamente se apontão suas virtudes, doses,  
e molestias, a que se fazem applicaveis,

ADICIONADA

COM

AS TABOAS DA MATERIA MEDICA,

Methodicamente seguidas de selectas, originaes, e copiosas  
formulas,

E

DE HUM DICCIONARIO NOSOLOGICO,

OU

Nomenclatura Synonymica das molestias, symptomas,  
vicios, e affecções da Natureza,

POR

ANTONIO JOSE DE SOUZA PINTO;

NOVA EDICÃO

POR

LUIZ MARIA DA SILVA PINTO.



OURO PRETO,

NA TYPOGRAFIA DE SILVA.

- 1857. -

126042

# NOTES

THESE NOTES ARE THE PROPERTY OF THE  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
AND ARE NOT TO BE LOANED OUT  
OR REPRODUCED IN ANY MANNER

THESE NOTES ARE THE PROPERTY OF THE  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
AND ARE NOT TO BE LOANED OUT  
OR REPRODUCED IN ANY MANNER

THESE NOTES ARE THE PROPERTY OF THE  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
AND ARE NOT TO BE LOANED OUT  
OR REPRODUCED IN ANY MANNER

THESE NOTES ARE THE PROPERTY OF THE  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
AND ARE NOT TO BE LOANED OUT  
OR REPRODUCED IN ANY MANNER

THESE NOTES ARE THE PROPERTY OF THE  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
AND ARE NOT TO BE LOANED OUT  
OR REPRODUCED IN ANY MANNER

THESE NOTES ARE THE PROPERTY OF THE  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
AND ARE NOT TO BE LOANED OUT  
OR REPRODUCED IN ANY MANNER

THESE NOTES ARE THE PROPERTY OF THE  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
AND ARE NOT TO BE LOANED OUT  
OR REPRODUCED IN ANY MANNER

THESE NOTES ARE THE PROPERTY OF THE  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
AND ARE NOT TO BE LOANED OUT  
OR REPRODUCED IN ANY MANNER



## INTRODUÇÃO

Os que fazem uso da Medicina devem propor se três fins: primeiro, conservar a saúde natural, e isentá-la das molestias; segundo, recuperar a mesma saúde quando interrompida pela molestia; terceiro, dispor o doente para larga vida; tres são igualmente os meios principaes porque podem conseguir-se as sobreditas cousas. Primeiro, a dieta, e regime; segundo, o uso interno de medicamento; terceiro os meios externos em que se comprehende a Cirurgia.

Considerando a força natural da Construção humana, sem atender aos agentes externos, podemos concluir que ella não a destinada para muito mais larga duração que presentemente se lhe observa. A sólida base sobre a qual se brão os musculos, dando nos a faculdade de nos tiras ortar de hums a outros lugares nos protege e livra da força, e violencia externa; o curioso systema dos vasos da nutrição, e alimenta o todo, supprimdo o continuado dispendio que produz a incessante acção das partes; a descarga das materias inuteis pelas vias excretorias; a força com que o nosso corpo resiste a certos graus de frio, e de calor; o natural instincto para nos defendemos; os orgaos dos sentidos, e a sensibilidade geral, que tanto concorrem a proteger nossa existencia, informando nos immediatamente do perigo interno ou externo, etc. tudo, tudo nos comprôva duração mais longa do que experimentamos, pois raras vezes se passa um periodo de dois ou tres annos, sem que a machina experimente algum transtorno. Por todos os lados nos cercão a semelhanças da molestia; as mesmas cousas de que depende nossa existencia, alterando se em suas propriedades, parecem e viciaam a vitalidade: a infecção do ar; as mudanças na temperatura; os alimentos; o exercicio; as nossas profissões e paixões; tudo, tudo tem lugar de produzir na economia animal tom ou atonia.

Pois que a conservação da saúde, e a prolongação da vida depende da dieta, e a cura das molestias, nos negócios, he evidente o muito que interessa o conhecimento de ambas estas cousas.

Os remedios para o Pratico em Medicina , são o mesmo que os utensilios e instrumentos para os Officiaes mechanicos; ntenos que estes lhes conheção o prestimo , nunca poderão desempenhar seus intentos , ficando ao nivel dos que pertendem trabalhar sem conhecer o uso da ferramenta.

Damos o nome de Remedio ou Medicamento a huma substancia ou combinação de substancias , que corrige a acção molesta de huma parte ou de todo o corpo.

Estas substancias podem ser tiradas de qualquer dos tres Reinos Vegetal , Animal , ou Mineral , e os remedios podem ser modificados pela arte , e muitas vezes são alterados pelos commerciantes.

As virtudes de alguns remedios são numerosas , outros produzem effeitos diversos , segundo a dose em que se applicão , segundo o periodo e circumstancias da molestia ; por tanto he necessario conhecer as forças de cada medicamento , os symptomas que os requerem , e as circumstancias particulares . que possam obstar á sua administração ; este pois he o motivo que nos determina a proceder na forma seguinte : Primeiro , daremos o nome do remedio , e os seus synonymos . Relataremos depois as suas propriedades mais evidentes , isto he , as physicas , e em certo grão as chymicas . Por propriedades physicas entendemos as que o remedio tem em common com outras substancias , v. g. a figura , extensão , etc.

Exporemos logo o effeito que produz na economia animal , tanto no estado de saude como no da molestia . Diremos depois o modo porque cada hum delles se considera obrar . Pois que tendo os remedios principios diversos , as suas forças obrião com maior energia em huma parte do systema que em outra , e todos os remedios produzem duas especies de effeito , v. g. o Opio que na dose pequena obria como estimulante , em dose maior como narcotico . Explanaremos enfim as suas diversas formas , e as composições em que entrão .

Disponemos esta Materia Medica reduzindo-a ás seguintes classes . I. Dos Estimulantes . II. Dos Atonicos . III. Dos Vermífugas . IV. Dos Antacidos . V. Dos Remedios topicos . VI Dos Alimentos . Concluiremos esta Obra com as Taboas de Materia Medica acompanhadas

de formulas appropriadas o mais que foi possível, em cujo arranjo se observará que se fez a ennumeração dos remedios, segundo suas propriedades e diversas doses, pois he sabido que diversos Emeticos se empregão como Expectorantes, e Diaphoreticos; muitos dos Emenagogos são Catharticos; os Tonicos são quasi o mesmo que os Astringentes, e os Antispasmodicos, que os Estimulantes; por isso veremos repetidos os mesmos remedios em differentes classes, segundo o diverso modo, porque em diversas doses obrão na economia animal. Deste modo concluimos huma Obra que nos parece merecer o bom acolhimento do respeitavel Publico.

the following is a list of the names of the persons who have been  
 named in the various reports of the committee on the subject of  
 the proposed amendment to the constitution of the state of  
 New York. The names are given in alphabetical order, and are  
 taken from the reports of the committee on the subject of the  
 proposed amendment to the constitution of the state of New York,  
 as published by the printer of the senate, in the year 1894.  
 The names are given in alphabetical order, and are taken from the  
 reports of the committee on the subject of the proposed amendment  
 to the constitution of the state of New York, as published by the  
 printer of the senate, in the year 1894.

The following is a list of the names of the persons who have been  
 named in the various reports of the committee on the subject of  
 the proposed amendment to the constitution of the state of  
 New York. The names are given in alphabetical order, and are  
 taken from the reports of the committee on the subject of the  
 proposed amendment to the constitution of the state of New York,  
 as published by the printer of the senate, in the year 1894.  
 The names are given in alphabetical order, and are taken from the  
 reports of the committee on the subject of the proposed amendment  
 to the constitution of the state of New York, as published by the  
 printer of the senate, in the year 1894.

# MATERIA MEDICA.

## CLASSE I.

### *Estimulantes.*

Os remedios estimulantes são os que augmentão a acção do coração e arterias, promovem a circulação, e a absorbencia, o calor e energia dos nervos.

Alguns destes bñão com particular efficacia sobre hu a parte do corpo, e com menos em outras, por isso os dividiremos em diversas Ordens.

### *Dos Estimulantes em geral.*

Em geral entendemos por estimulantes, toda aquella applicação, que feita a huma fibra vivente ou irritavel, excita ou põe em acção huma ou todas as forças da mesma fibra.

Ha na parte muscular do corpo humano, hum certo principio de que depende a acção muscular, ha outro tambem no cerebro e nervos, de que depende a sensação; esta acção porém nem sempre he manifesta; pôde haver excitamento sem acção ou contracção evidente; assim como no systema nervoso, e alguns remedios excitão a irritabilidade sem acção muscular.

Ora ha corpos que excitão cada huma destas acções em particular, uns affectão principalmente o systema sanguineo; outros o cerebro. e fibras nervosas; hum grande numero porém de estímulos geraes affectão ambos. A razão disto parece ser, que ainda que haja hum principio distincto da irritabilidade; com tudo, como o cerebro e nervos são nutridos por vasos, e são muito vasculares, por isso hão de ter susceptivens aquas leis da irritabilidade, aê certo grau; pois que destes vasos se fórra a força nervosa.

Alguns estímulos porém affectão mais hum ays em que outro. O modo porque obaq os estímulos (sobre a construcção humana, nem sempre he accoapantado de acção externa evidente, ella em geral he avaliada pela ligeireza do pulso; com tudo, o estímulo mais poderoso ha de exhaurir a irritabilidade sem alterar muito o



pulso, ainda que o execute em menor quantidade, por isso os espiritos augmentão a força da circulação, etc.; porém em dose grande produzem morte instantanea, assim tambem o opio; e desta fórma obra o mais poderoso de todos os estimulos, isto he, muitos dos venenos animaes; pelo que pois se conhece haver huma quantidade de excitamento, que não tem apparencias evidentes, v. g. no pulso, etc.

O effeito geral do estimulo em quantidade moderada, he dispor o corpo para a acção; despertar o systema nervoso; e excitar a acção dos absorbentes, a circulação, secreções, excreções, e as acções do entendimento, v. g. alegria, etc.

Os estimulos differem huns dos outros em diversos particulares, alguns influem no systema com muita brevidade; outros mui lentamente; alguns affectão o total do corpo; outros obrão sobre alguma das partes; por isso os dividiremos em diversas Ordens.

## ORDEM I.

*Remedios estimulantes, que no seu primario effeito, augmentão a acção vascular, e o calor da construcção humana.*

Com a reflexão, he facil descobrir quaes sejam as molestias a que elles podem ser proficuos. Em geral as ditas molestias são indicadas por huma circulação languida; pelo torpor do systema nervoso; pela sensação diminuida; pela debilidade, v. g. quando he chronica; pela dyspepsia; pela anesthesia; ou insensibilidade; pela paralysisa; pelas scrophulas; pela rachitis, pelas queixas espasmodicas; pelo hysticismo; quando as forças dos musculos voluntarios de todo o corpo, ou de algumas das partes se achão diminuidas; quando haja torpon, syncope; e em quasi todas as queixas chronicas em que a acção do coração se ache enfraquecida e suspensa. Igualmente servem para despertar o estomago, de que lhes veio a denominação, de Estomaticos, chamando-se tambem Atenuantes, porque se julgarão adelgaçar o

sangue, e Antispasmodicos porque removem a disposição para o espasmo.

Os estimulantes não convêm a pessoas saudáveis mormente, na mocidade, o seu uso antecipa a velhice exaurindo a irritabilidade; porém quando haja torpor no systema então fazem-se necessários.

Doas qualidades ruins acompanhão todos os estimulantes: primeira, ser curto o tempo de sua acção, e este geralmente proporcionado à sua força, pois quanto maior he o estimulante, menos durão seus effeitos. A segunda he que a acção de todos elles he seguida de abatimento; motivo, porque devem repetir-se quando os effeitos da primeira dose hajão terminado; e esta he a grande arte de os ministrar, por isso devem dar-se em pequenas doses e frequentes; v. g. o vinho em febre e em debilidade nervosa, que muitas vezes he necessario dar-se de tres em tres ou de quatro em quatro horas. Esta fraqueza de nervos he ordinaria em cidades grandes.

Outra circumstancia tambem se faz attendivel, e he ser necessario augmentar-lhes a dose, proporcionando-a aos grãos da irritabilidade; v. g. no Opio, Belladona, Meimedio; Cicutia, &c.

### *Do Ether Sulfurico.*

O Ether sulfurico he de todos os fluidos o mais leve, o mais inflammavel e volatil; qualidade que elle possui em ponto tal, que não se une com a agua, nem com o alcohol, o que difficulta a sua administração. Usa-se tanto no externo como no interno.

O uso externo he muito limitado; achou-se que era conveniente para remover o que erradamente se chamou dores frias, isto he, nas dores que não são consequencia immediata de inflamação, mas sim de hum torpor existente em alguma das partes do systema nervoso, como a cephalalgia e outras dores rheumaticas, e espasmodicas e odontalgia rheumatica, bem que esta molestia quasi sempre provem de inflamação.

No interno, e na dose de quinze até sessenta

pingos he hum poderoso estímulo para o systema : enmenda ta o calor , accelera o pulso , e desperta o systema nervoso ; segue se lhe hum tendencia ao sono , se no estomago náo houver desranjo : en languidez , torpor , asthenia geral , tendencia ao esvaziamento , syncope hysterica , convulsões hycondria , cardialgia por gotta attonica , athrolygia arthritica ou rhumatica , paralysisa ophthalmica , dores das nervos , vomitos nervosos , colica , tussae , molestias do venticulo e intestinos , ou sejam flatulentas ou espasmodicas . Na asthma secca , ou verdadeira asthma spasmodica nada lhe excede á excepção da Tinctura de Opio , e Ipecacuanha com Opio .

Principiaremos a dar o Ether na dose de quinze pingos : mas ha casos em que se deve ministrar de meia citava ate oitava e meia ; mas he necessario conhecer bem o caso e a constituição do doente ; porque se o estomago se achar carregado augmentará o espasmo ; porém se a molestia não é symptomatica do estado do estomago , mas do estado do tempo ou torpor da pelle , então o Ether he de grande proveito . Hum onça de Ether com quinze gottas de Tinctura de Opio , cura humo violento por xisno ; mas deve ser a verdadeira asthma espasmodica ; porque na humida he nocivo , embaraça a secreção do muco e a expectoração , e produz hum sensação de suffocação ; a asthma humida sempre termina por expectoração .

He muito conveniente em typhos em que haja grande tremor nervoso , agitação e pulso interpolado ; a sua dose deve ser de cinco a seis pingos por vezes . Na tísica pulmonar não convem , segundo os maos effeitos que se lhe tem observado .

Estas mesmas propriedades são communs a todo o Ether , assim como o Ether Sulfurico Alcoolizado , apesar de que este sempre mostrou maior tendencia ao sono , e se chamou antigamente Licor Anodino de Hoffman ; he usado como o precedente em doses de trinta pingos ate oitava e meia .

Com tudo o Ether Nitrico tem hum propriedade muito differente , de que os Chymicos não dão a causa . He elle hum poderoso diuretico , e não ha causa melhor



em pessoas debilitadas, particularmente em febre, quando se lhe pertende augmentar a evacuação de urina, em estado de languidez e tendencia para o espasmo. Na temperatura de 76° produz suor, e diminhe a quantidade dos fluidos no systema. A sua força estimulante he muito menor sobre o systema sanguineo, que o do Ether ordinario. A sua dose he gottas trinta até oitava e meia.

### *Do Alkool.*

He o Alkool o producto da destillação a fogo n.º, e em grão de fervura de todas as substancias muco-sacharinas, que passáram ao estado de fermentação vinheira,

O mesmo Alkool em segunda e terceira destillação adquire estados differentes de maior rectificação. No ultimo estado dá-se-lhe o nome de espirito de vinho muito rectificado; he muito distincto; sem cor: muito leve; muito fluido, e inflammavel; seu cheiro he suave; tem bom sabor forte, penetrante, e ardente, mas agradável. Neste ponto de rectificação raras vezes ou nunca se dá internamente só por si, serve porém de base a diversas tinturas, e para dissolver materias resinosas.

Este espirito sendo feito de pouco tempo, contém muito espirito ethereo de ruim qualidade, o que o faz nocivo.

A gravidade especifica do Alkool para a da agua destillada he como 815 para 1000.

Applicado externamente faz contrahir todos os vasos, conservando-se sobre a pelle causa ardor, mas deixando-se evaporar, produz sensação de frio.

No interno em dose muito grande he funesto, ex-haurindo a irritabilidade de fórma que o sangue não coagula, e os musculos ficam frôcos.

Em casos de grande languidez e fraqueza de nervos ha de produzir bons effeitos na dose de huma oitava até duas diluido, assim tambem em todos os espasmos em que o Ether he recommendado.

Os danos de que he origem o abuso dos espiritos, são muitos, e continuamente os temos ante os olhos.

Ao principio fazem perder o appetite, e para remover a languidez que dahi se segue, augmentão a dose dos mesmos licores, mas a vontade de comer perde-se de todo. O Fígado sympathicamente padecer, não ha secreção de bile, inchão as glandulas do mesenterio e segue-se hum a geral debilidade indirecta. Os bôffes perdem a sua força, e segue-se a asthma, dyspnea, tuberculos, e algumas vezes, paralysisa: por fim vem hum a asthma ou hydropesia confirmada ou hum a verdadeira thisia pulmonar em que os tuberculos supurão com muita rapidez.

### *Do Vinho.*

He o Vinho hum composto de Agua, Alcool, Tartaro, e hum arexa, que differe segundo as diversas especies de Vinhos, e de hum a substancia extracto-resinosa, a que os Vinhos devem a sua côr.

O Vinho he hum a bebida tão agradavel como salutifera, quando he de boa qualidade e d'elle se usa sobriamente. O bom Vinho he facil de conhecer pela sua côr, limpidez, cheiro, sabor, e porque usado com moderação não causa incommodo algum. Os Vinhos falsificados são mui danosos, assim como igualmente o bom, quando seu uso he immoderado. Nestes casos o Vinho he hum verdadeiro veneno que abrevia a vida.

O effeito que o Vinho produz nos homens em geral diversifica segundo as diferentes constituições. Multos dos que bebem habitualmente, e em grande quantidade, vivem largos annos, e sem padecer molestia; a maior parte, com tudo, dos grandes bebedores não vivem muito, e acabão opprimidos de enfermidades.

Podemos conhecer que o uso do vinho he prejudicial, e o devemos evitar absolutamente, quando produz os effeitos seguintes, depois de haver bebido hum a pequena quantidade: o halito com hum cheiro vinhoso; artores azedos, e leves dores de cabeça, e quando bebendo-se maior quantidade que do ordinario, causa atordoamento, nauseas, briaguez, e com especialidade,

quando a briaguez produz huma especie de frenhezim, melancolia, colera, e furor.

O excesso no vinho produz os seguintes effeitos: irrita excessivamente o systema nervoso; desseca, e encorrea os solidos. affecta as visceras abdominaes, altera a organização do cerebro, e desordena as funcções mentaes. A molestia mais ordinaria entre os bebedores he a tylopesia, que produzem as obstrucções do figado, e do mesenterio; todas as visceras ficão em hum estado de dessecação e aridez.

O vinho considerado como remedio he muito precioso, e muito mais nas constituições que a elle não estão avezadas. Todas as vezes que as forças vitaes se achem exauridas por grandes evacuações por demaziado excitamento, e quando não ha tendencia alguma à inflamação, he elle para o estomago o estimulo mais agradavel e proveitoso.

Convem nas febres em quantidade moderada, e até mesmo nas biliosas, se o estomago se acha soffrivelmente limpo, nas bexigas confluentes; nas dysenterias, especialmente nas que attação nos acampamentos, e embarações que de ordinario são acompanhadas de febre putrida. E muitas molestias nervosas, asthenia, paralysisa, tosse convulsa depois de duas semanas, em mulheres exauridas pela leucorrhœa ou hysterismo. He elle hum dos meliores estimulantes; tonicos e antipasmodicos, excita a acção do coração e das arterias augmenta as secreções, e excreções; expelle o que no estado de saude deve ser expellido e por falta de acção se acha reuido; augmenta a secreção dos solidos, e por isso tende indirectamente a sustentar o systema.

No typho e outras molestias o sagú, a tapioca, o salepo mal poderao conservar-se no estomago sem a addição do; vinho elle estimula a viscera cœlypœtica, mas nao convem quando ha inflamação local ou acção arterial forte.

Algumas particularidades de constituição he impossibilitao o uso, portanto como ha pessoas cujo estomago nao sofre o acido mais diminuto, nestas ainda o melior vinho ha de produzir cardialgia e espasmos no estomago, suprimiremos pois este inconveniente com o Alcool diluido.

Quando o doente he bilioso, e em febres biliosas, são preferiveis os Vinhos acidulos como o do Rhin o Glarete, etc.: em pessoas que não bebem Vinho por costume, porem os que costumão beber do Porto causa lhes caldialgia.

Nem só o excesso do vinho pode ser prejudicial, a sua falsificação mormente pela oxyda vitrea de chumbo, deve causar accidentes bem terribes; por isso convem sumamente observar a qualidade do Vinho de que fazemos uso, especialmente como remedio.

Para conhecermos pois se o Vinho se acha inficionado do pela oxyda vitria de chumbo, usaremos da preparação seguinte; partes iguaes de potassa ou cal e de enxofre mettem-se em hum cadinho e fazem-se derreter logo para evitar a dissipação e combustão do enxofre, pequenos para o que o lume não he necessario muito forte. Derretida a mistura, deita-se sobre hum pedra untada com azeite e se deixa endurecer: e quebrando se logo em pequenos pedaços se guardará em garrata bem rolhada; de modo que lhe não toque o ar, porque he muito deliquescente. Quando quizermos fazer experiencia de algum Vinho, dissolve-se humma pequena porção desto sulfúreo em humma pequena quantidade de agua, e tomando hum copo bem limpo e melo do dito Vinho, deitao-se-lhes algumas gotas da dita solução; se o Vinho contem chumbo logo se faz amarelo, e depois escurece, turva-se e forma hum precipitado escuro ou cinzento; se o Vinho não tem chumbo faz-se pallido, mas não escurece.

Como os vinhos podem tambem achar-se falsificados pela alumina, e esta aperte o ventre e cause dores de estomago, podem experimentar se deitando-lhes algumas gotas de dissolução mercurial nitrica; porque se contem alumina, esta ne logo decomposta, e se forma sulfato de mercurio, ou nitrato de alumina.

### Do Phosphoro.

He o Phosphoro humma substancia volatil inflammavel em geral vermelha cõr de carne, mas sendo purificado pode obter-se tão transparente como a cõr branca derreliça, e fica tão brando que facilmente se corta a faca.



exposto ao ar e em brando calor derrete-se lançando hum fumo branco. Em 60 grãos de calor incendeia-se e arde com huma luz muito brilhante, hum fumo branco e cheiro suffocativo, mas he necessario que esteja bem secco. Sempre he extrahido de materias animaes.

Principiou a ter uso ha sessenta annos, veja-se huma collecção de Theses por Haller, igualmente d'elle tratado Wolff.

Tento se dado a cães enbrulhado em carne, e na dose de dois grãos causa-lhes humã inquietação indizivel, fazendo-os correr de huma para outra parte, e lhes excita convulsões, até que morrem: ou quando melhoirão he depois de haverem bebido muito, e terem repetidos vomitos luminosos.

He hum dos estimulantes mais poderosos, mas deve dar-se quando a irritabilidade, e a força não sejam grandes. He proveitoso no ultimo estado da dysenteria, e mais especialmente do tippo. Wolff relata casos de tippo nervoso, em que os doentes estavam comatosos, com o pulso incerto, e as mãos frias e quasi em passamento, apesar disso melhoirão pela applicação do Phosphoro. Tambem pode ser proveitoso na paralyia.

A sua dose deve ser muito diminuta, pois assim mesmo produz no estomago hum estimulo fortissimo. Póde fazer-se digerir o Ether sobre o Phosphoro; pois humã oitava de Ether ha de tomar dois grãos de Phosphoro: tambem podemos triturar o Phosphoro com azeite, e formar pillulas com miolo de pão, e assim podemos dar a trigesima ou quadragesima parte de hum grão por huma dose.

Diluido, tem sido recommendado como rubefaciente, mas produz violenta inflamação, e ulceração.

### *Da Canella. Casca.*

*Laurus Cinnamomum* Lin. ennéandria, monogina.

*Juss* Loureiro.

*Ceilão. China Malabar, Brasil.*

Em razao de conter hum excell nte oleo volatil, he ella hum dos remedios mais estimulantes; o oleo he tao

pugente que na lingua produz o effeito de cauterio actual.

A Canella excita no estomago huma acção mais forte estimulando-lhe as membranas mucosas, e produziudo augmento da secreção do succo gastrico; suspende os vomitos e colica, e com proveito se une à Quina, e a outros tonicos na dyspepcia, na debilidade dos nervos, na syncope e hysticismo, he muito conveniente de grãos vinte cinco ate meia oitava para huma dose.

O seu oleo de gottas tres até quatro, com o Opio ou Alkool, porem este he o melhor, alivia a gota atonica retrovertida.

A Canella he hum dos ingredientes nos Pós aromaticos.

A gangrena senil que provem de ossificação nas arterias em geral pôde curar-se pelos Pós aromaticos, e com pequenas doses de Opio; v. g.

R. ——— Canella em pô sutil grãos quinze  
Opio grão meio até  
grão hum e meio

Misture-se para tomar de tres a tres, ou de quatro a quatro horas.

Na Chlorosis quando ha huma circulação languida, a Canella unida ao Ferro he muito conveniente.

A Tinctura de Canella composta he huma preparação muito conveniente na languidez nervosa, na flatulencia, na disposição para espasmo e contracção, em dores gotozas do estomago.

O Alkool de Canella da-se na dose de oitava huma até tres. A sua agua de duas até quatro onças. A Cassia lignea ou Laurus Cassia de Lineo he muito semelhante á Canella, differe porém em ter o gosto mais picante e ser mais parda, quebra fibrosa, e tem muita mucilagem. As suas propriedades medicinaes são como as da Canella, o mesmo podemos dizer da Cassia Caryophyllata. Myrtus Caryophyllata Linn. e da Canella branca, Cortex Winteranus.

## Da Pimenta Semente.

*Piper nigrum* Linn. *Diandria, trigynia.*

Java, Sumatra, Siam, Malabar.

Por destillação produz hum oleo volatil, e hum espirito, que rectificado contem toda a sua força pungente. Ambas são convenientes em molestias nervosas, no cravo histerico, na chlorosis junta ao ferro.

A Pimenta branca he o mesmo em quanto a sua virtude, em molestias nervosas tem produzido bons efeitos de grãos seis até dez.

A Pimenta longa, *Piper Longum* Linn., tem pouco uso mas he de hum aroma agradável, entra na composição dos Pós aromaticos, e na Massa antibemorrhoidal de Ward, composição muito proveitosa nas hemorrhoides obstinadas, e fistulas originadas de falta de circulação no perineo.

A Pimenta de Guiné, *Capsicum Annum.* Linn. he hum dos estimulantes muito poderosos, e igual ao da Canella, especialmente na chlorosis de mistura com o ferro, quando ha languidez, e em pessoas que são nervosas, e sujeitas a syncope, e histerismo.

R: Extracto de Camomila, Pimenta de Guiné ann. part. ig.

Misture, e forme pillulas de grãos quatro para tomar huma por. trez vezes no dia.

## Da Gingibre- Raiz.

*Amomum Zinziber.* Linn. *Monandria Monogynia*  
Indias Oriental e Occidental, Brazil.

He hum estimulante mais brando que a Pimenta e Canella, sem que por isso deixe de ser hum dos mais saudaveis e proveitosos, não produzindo estímulo capaz de fazer debilidade indirecta. Ella he carminativa e em flatulencia de especie nervosa hé remedio superior; para cujo desempenho conduz muito a infusão a frio na proporção de meia onça de pôs recentes para huma libra de agua; passadas doze horas filtra-se e toma-se na dose de trez

até quatro onças; e no caso de haver dor, se juntão a cada dose seis gotas de Tintura de Opio. O Xarope de Gingibre he huma preparação muito conveniente sendo recete.

A sua tintura he util na dyspepsia e caldialgia atônica, flatulencia; e pode ser proveitosa na hydropesia danosa de mystura com os diureticos; e na chlorosis com o ferro, na dose de huma oitava até trez por vezes no dia.

#### *Da Noz Muscada. Coração*

*Myristica Officinalis. Linn. Pelyndria monogynia. Molucas e Brázil.*

Ha duas especies huma oblonga e outra redonda, esta he a melhor. He hum estimulante brando e excellente carminativo; torrada em modo que perca algum de seu oleo volatil, convem ás crianças que padecem debilidadade de entranhas.

Na diarrheia e languidez de primeiras vias, he muito proveitosa com alguns grãos de Rhaibarbo ou de Magnésia. O seu alcohol he hum aromatico muito conveniente nas cólicas flatulentas, dyspepsia, paralysis, etc. Sua dose he de huma oitava ate duas diluido.

A sua agua de meia onça ate huma.

#### *Do Cravo da India Flores não abertas.*

*Caryophyllus aromaticus. Tournefort. Anore rosacea. Pelyndria monogynia. Foss. Ayrto.*

*Molucas, Nova Guine.*

Deve escolher se os mais escuros, saos, odoriferos e agradaveis.

O seu nome em Portuguez lhe vem do feitio de hum pequeno cravo quadrado, de cor ferruginosa atirando para preto. Os melhores são os maiores e mais escuros, e que picando se com hum alfinete lanção huma certa materia oleosa; porque os mais pardos já perderão seu oleo volatil. São muito sujeitos à humidade, e quando, tendo perdido seu oleo volatil, se misturão com outros perfeitos, recebem huma parte consideravel de seu gosto e cheiro; porem a sequidão, o cheiro menos pungente, e a cor da malva, fazem patente a fraude.



São estimulantes aphrodisiacos e convenientes no torpor, colicas flatulentas; o seu oleo de gottas quatro até oito por dia, he hum excellente remedio misturado com mucilagem de gomma arabia, na falta de secreção de semen.

A formula seguinte he muito estimavel nas dores de dentes.

R.	Oleo volatil de Crave	gottas quatro.
	Carbonato de Ammoniac.	grãos oito.
	Opio puro.	grãos trez.

Misture-se muito bem e forme pillulas quatro para trazer huma sobre a cova do dente.

### *Do Muriato de Ammoniac.*

O Muriato de Ammoniac contém cincoenta e duas partes de acido muriatico, quarenta de ammonia, e oito de agua. Gira no commercio em forma de pães orbiculares convexos e denegridos de huma parte; concavos, limpos, lizos ou crystallizados da outra; tem hum sabor acre, picante, urinoso, e huma certa ductilidade.

Extrahê-se no Egypto, e fabrica-se na Europa. He extrahido do excremento dos animaes queimado, cuja ferrugem torna a sublimar-se em balões de vidro lutados. Tambem pode obter-se decompondo o sulfato de cal pelo carbonato de Ammoniac, e depois o sulfato de Ammoniac, pelo Muriato de Soda e sublimando-se.

He estimulante, desobstruente, diuretico, e resolvente; usa-se no interno na dysleipias, phisconia abdominal, hydropesia, molestias pituitosas, lombrigas.

O uso externo he em forma de banho, fomentação, etc., especialmente com Vinagre na Ecchymoma, entença, deslocação, gangrena, cephalalgia, phrenitis, feridas da cabeça, tumores nos peitos pelo leite, hydrocele, ophtalmia, sarna, ulceras sordidas, verrugas.

A dose no interno he de grãos dez até trinta;

### *Do Carbonato de Ammoniaco. Crystalizado.*

Extrahese das substancias animaes por destillação, porém melhor ainda pela decomposição do Muriato do ammoniaco.

Pela destillação do corno de veado ou de ossos obtinha-se o que se chamava Sal volatil de ponta de veado, ou Ammoniaco carbonico pyro-oleoso, que antigamente foi usado como antihysterico, e como o mais poderoso nas molestias nervosas por causa do seu oleo pyrologico.

O Carbonato de Ammoniaco he estimulante, excitante e antacido; he usado no catharro, asthenia nervosa; estimula o estomago, desperta a acção do systema sanguineo; determina para a pelle; e augmenta a transpiração.

De grãos cinco até dez diluido em agua por varias vezes no dia he a sua dose.

### *Do Ammoniaco.*

O Ammoniaco tem cinco partes ou seis de gaz azoto, ou nitrogeneo, e hum de hydrogeneo.- Dando-se em dose de seis gottas até doze, ou vinte diluido em grande porção de agua produz instantaneo calor no estomago, e se a dose he grande contrahе subitamente o estomago, de modo que causa vomitos; se he conservado, exera grande calor na pelle por sympathia com o estomago, nao em consequencia de hum excitamento geral, bem que elle accelera o pulso, e na temperatura acima de 105 grãos com o uso de fluidos quentes obriga a transpiração.

He de grande utilidade em todos os casos de languidez nervosa, e debilidade geral, em que não haja tendencia para a inflamação; nas febres, na cephealea, no cravo hysterico, dores e tras, isto he, que nascem de mero torpor da parte; na debilidade do estomago, e intestinos; e em todos os casos de paralysisa, excepto no primeiro estado da que nasce por plethora. He hum poderoso estimulante para os absorbentes, e por isso obra

na paralysis, a qual de commun depende da extravasão de hum fluido, na extremidade de um nervo.

No externo he hum rubefaciente, mas usando-se del-  
le concentrado caustica immediatamente. Póde usar-se  
com huma esconia ou panno esfregando a parte nas do-  
res de plenriz falso. Na tonsillitis e pharyngitis he de  
grande utilidade, determinando o saugue das partes in-  
ternas para as externas, porque augmenta a acção dos va-  
sos da pelle, por tanto.

R. — Oleo de azeitonas }  
Agua de Ammonia. } a partes iguaes.

Ella promove a resolução dos tumores serofulosos,  
que ao principio augmentão por mera debilidade dos  
absorbentes. Junta ao unguento de mercurio renova a  
arthropyosis, se a constituição se não acha fortemente  
disposta a ella; tem prestimo igual nas dores rheumati-  
cas especialmente juntanto lha Opio. No cravo hysteri-  
co deve applicar-se do modo seguinte:

R. — Ammonia preparada gottas cinco.  
Mistura camphorada gottas duas.

Misture-se para tomar de quatro a quatro horas,  
e tambem pillulas d'Azebre de grãos tres por duas vezes  
no dia.

O seguinte remedio composto como estimulante, per-  
tence a esta classe.

### *Tintura de Beijoim composta.*

He este hum dos estimulos mais poderozos, e mais  
convenientes em muitos casos. Ao principio poucas pes-  
soas podem soffrer hum a oitava, e os doentes nervosos  
não mais de pingos vinte, sem que lhes produza calor,  
e outros symptomas desagradaveis. He muito poderoso  
na aphonía, quando todos os outros remedios tem falha-  
do, com especialidade na que procede de catarro. Es-  
ta molestia procede muitas vezes de pura debilidade

Nas partes, e he frequente em musicos e cantores.

R. — Tintura de Beijoim } a oitavas seis  
           Agua pura                }  
       Forme bebida para varias doses

Tambem se faz recommendavel nas tosses de larga duração, na gotta ou espasmo do estomago, e sendo diluida augmenta o appetite, e a digestão; promove a reunião das feridas, induzindo a inflamação necessaria para formação da lymph coagulavel ou vinculo d'união.

### *Da Electricidade.*

Ha muito tempo que a Electricidade se applica como hum estimulante geral e topico, mas de ordinario não se applica como deve ser.

Huma pessoa em quanto está electrizada, e se lhe vai tirando a electricidade gradualmente, tem o pulso mais grosso e a transpiração mais augmentada. Quando tiramos faiscas electricas de alguma parte do corpo, nella se sente hum certo calor, e muitas vezes quando as faiscas são violentas ha vermelhidão e inflamação. He de certo hum poderoso estímulo para o systema nervoso; mas tem as qualidades más de hum summo excitante sendo applicadas chammas muito fortes, assim exhaure a irritabilidade, e essa he a razão por que os raios matão.

A Electricidade he recommendada em torpor do systema sanguineo, em falta de energia no systema nervoso, no torpor dos absorbentes, na paralysis, na chlorosis, na anæmia, na tendencia para syncope, na debilidade geral, em certos espasmos que affectão partes particulares, v. g. a Dausa de S. Vito. Nestas he muito efficaz; porém muitas vezes falha quando a molestia tem sido demorada. applica-se tirando grandes faiscas da parte affectada, ou fazendo passar a chamma electrica de hum a parte para outra, e a quantidade tirada ou communicada deve variar segundo as molestias; as grandes chammas são prejudiciaes em geral, por tanto devem



Applique-se as concenções com moderação por meio de pequenas e repetidas chamas. Quando houver tendencia para a plexia devemos usar da Electricidade com muita cautella, e de nenhum modo se deve applicar a chama á cabeça, mas sim aos braços, e partes lesas.

## ORDEM 11.

*Dos Estimulos que obrão principalmente sobre os nervos augmentando-lhes a energia, e que nos seus effeitos secundarios produzem somno.*

### *Dos Narcoticos.*

Os Narcoticos tem propriedades particulares; dados em certa dose diminuem a sensibilidade, mitigão as dores, e provocão o somno, e dahi lhes provem seu nome. Não sabemos de certo o modo porque operão; mas considerando a differença que ha entre o estado de vigilia, e o do somno, e as ordinarias causas que produzem esta alternativa, podemos ajuizar alguma coisa sobre este objecto.

No estado de vigilia gozamos de certa viveza de movimento muscular tanto voluntario como involuntario, e tambem ha hum grande grão de sensibilidade nos nervos, pela qual facilmente percebemos as impressões externas. Ora pela manhã o pulso de huma pessoa em saúde acha-se mais ligeiro, o entendimento mais tranquillo, e todo o corpo mais disposto ao trabalho tanto corporal como espirital. Este mesmo trabalho, ou exercicio consume aquelles principios vivificantes do systema muscular, e por isso aquellas sensações que de manhã erao vivas e agudas, para de tarde vão enfraquecendo ate chegar hum certo torpor, e por fim hum quasi total insensibilidade que he o somno; diz-se quasi total insensibilidade, porque então nem todas as impressões externas nos são perceptíveis.

Pelo somno parece que se reproduzem aquelles principios vivificantes dos musculos, pois quando despertamos nos sentimos com vigor renovado. Parece isto muito

verosimil porque depois de hum augmento de estímulos, bem que não violentos, estamos dispostos ao somno: muitas pessoas havendo comido e bebido sufficientemente depressa se achão exaustas, e ficão a dormir.

Em razão do defalque dos principios vivificantes dos musculos, he que parecem obrar o Opio, o Ether, e o Alcool. Em quanto ao vinho e espiritos duvida-se de que o seu modo de obrar seja igual: elles augmentão a acção do systema arterial e da sensação, e exaurindo a irritabilidade produzem torpor; mas pelo que respeita ao Opio e outros narcoticos he duvidosa a sua acção, pois que a tendencia a dormir he produzida depressa e sem que previamente haja excitamento algum sensivel no systema arterial.

O objecto dos narcoticos em quanto á Medecina he:

I. Mitigar toda a dor violenta, particularmente não sendo de inflamação aguda.

II. Induzir somno debaixo de certas circumstancias.

III. Suspender algumas descargas excessivas.

IV. Alterar aquelle estado dos nervos que dispõem para as convulsões.

Na sua administração devemos guardar as seguintes precauções:

I. Principiar por dose moderada, a excepção de quando os effeitos do remedio, e a constituição do doente sejam assaz conhecidos.

II. Nas crianças deve haver summa cautella, porque nellas o effeito he muito maior.

III. Igualmente em constituições em que ha hum determinação de sangue para a cabeça, porque os narcoticos a hão de augmentar. Esta precaução he relativa a certas queixas nervosas, e as pessoas tendentes à apoplexia ou paralyisia com determinação para a cabeça.

IV. Nunca devem administrar-se quando o estômago esteja viciado, particularmente por materias biliosas, por que então não produzem sonno; mas sim dores, nauseas ou violentas dores de cabeça.

V. Nunca se devem dar em febres inflammatorias, porque sendo estímulos augmentão o excitamento.

## Do Opio.

He o Opio o sumo espesso da Papoula, *Papaver somniferum* Linn. *Polyandria monogynia*. He um extracto gomoso resinoso em massa, de cor denegrida sanguinea, de cheiro desagradavel, quebradico quando secco; amolece facilmente entre os dedos, amargo, solavel em parte na agua fria, extrahese por incisão, expressão, e decocção na Syria, Turquia etc.

Sendo o Opio hum dos estimulantes mais energicos e diffusivos, não podemos duvidar de quanto seja conveniente nas asthenias, e de que devemos evita-lo nas hypersthenias.

A dose deve proporcionar-se ao grão da molestia, e às forças do enfermo.

Nas molestias em que houver asthenia directa, não podemos applicar grandes doses de estimulantes, em razão da superabundante susceptibilidade; por isso nellas convem o Opio em pequenas doses: pelo contrario porém na asthenia indirecta, pois que havendo nella falta de receptibilidade e de incitamento, são necessários os excitantes em maior dose; e por isso augmentaremos a do Opio. Por tanto diremos em geral as molestias a que elle se faz recommendavel.

O Opio he de grandissimo proveito nas dores violentas, no delirio, he poderoso nas colicas, e igualmente na paixão iliaca, que justamente podemos dizer he o grão maior da colica.

O Opio he a consolação dos gotosos, calma a violencia das dores, e diminue a duração do paroxismo. De ordinario produz bons effeitos na odontalgia e otalgia.

Quanto as inflammações, subindo ao maior auge, mostraõ tendencia para a gangrena, o Opio he remedio precioso; porque o excesso de energia de encitamento e a violencia da dor põe os solidos em atonia; o sangue e os outros fluidos estagnados alterão-se. Logo que se observe que a inflammação tende para a gangrena, deve empregar-se o Opio na dose que o doente possa supportar; pots que elle pòde reanimar a energia

vital que já principia a extinguirse; e por isso os praticos fazem uso da quina, dos remedios e virtuosos, e de quanto possa exaltar a força do systema universal.

O Opio faz-se recommendavel com particularidade, na dôr violenta de cabeça ou cephalgia causada pelo abuso do vinho e de licores, por alimentos muito calidos, ou por trabalho excessivo, etc.

Todos sabem que o Opio dado em doses consideraveis e reiteradas, he muito efficaz nas convulsões chronicas, no tetano, a mais perigosa de todas as molestias espasmodicas.

Se o Opio he de proveito nas convulsões, muito mais o he na epilepsia, na asthma, na ictericia, na ischoria que provem de espasmo da bexiga, nos partos laboriosos e consequencia de debilidade da madre, nas tores que provem do virus venereo, na catalepsia, na dança de S. Gui na hysteria, e.c. etc.

O Opio he remedio salutarifero nas molestias em que houverem evacuações abundantes, como diarrhea, dysenteria, hemorragias consideraves, vomitos copiosos de sangue, fluxo abundante de sangue hemorroidal, hemorroides, hemorragias uterinas e nasaes, hemoptisia, tísica pulmonar, catharros chronicos, retenção de catamenia por diminuição da energia dos vasos, etc. etc.

He tambem remedio soberano em febres nervosas, putridas e intermitten es; na febre do leite ou puerperal, nas biliosas e mucosas, nas bexigas confluentes, na peripneumonia asthenica, no rheumatismo chronico, na hydropesia, no catharro e tosse asthenica.

Pelo contrario o uso do Opio he contraindicado em todas as molestias em que as forças do systema se hajão intensivamente augmentado; he nocivo especialmente nas affecções e inflammacões hyperstenicas.

O Opio he nada menos conveniente nas molestias lic es asthenicas, taes como gangrena, ulceras, inflammacões devidas a debilidade, etc, por fim elle convem sumamente em todas as molestias asthenicas; he hum excellent cordial, e quasi o unico que ate agora se he descoberto.



A dose do Opio para huma pessoa regular, he da quarta parte de hum grão ate hum grão, a do Laudano liquido he de gottas seis até gottas quinze e mais; observe-se que estas doses deveri augmentar-se conforme o habito em que se ache o doente, de o ter tomado anteriormente.

Em certas pessoas muito irritativas, e em certos casos de asthenia directa, he necessaria a maior circumspecção na administração do Opio; pois huma dose bem diminuta pode causar vertigens, atordoamento, náuseas, e até vomitos: nestes casos deveri nos administrar o doente de huma forma em que precisamente possamos calcular a quantidade de Opio que se houver de dar ao enfermo. Parece que para desempenho deste objecto a forma liquida he preferivel a qualquer outra, em que pela addição de alguma agua aromatica destillada, de hum xarope, de huma infusão ou cozimento podemos comparar exactamente com a quantidade de Opio que o enfermo deve tomar de cada vez, e em geral quanto póde tomar em tempo determinado.

Bem que o Laudano liquido não tenha na realidade de mais virtude que o Opio em substancia, parece com tudo que deve ser preferido em razão do estado liquido que he mais commodo, e por que a sua dose he mais segura, tanto mais porque pode misturar-se com vinho, aguas aromaticas e quaesquer outros liquidos. Poderi nos unir proveitosamente o Opio com a Quina, Canella, Valeriana, Licor anodiuo, Ether sulfurico, Almis-car, Castoreo em fim com todos os excitantes sejão permanentes sejão diffusivos.

Tambem he recommendavel a sua administração em forma de clyster, mas triplicando-lhe ou quadruplicando-lhe a dose.

1.<sup>o</sup> No caso de espasmo ou outro embaraço no esophago que faça muito custosa a diglução.

2.<sup>o</sup> Quando o enfermo vomite o que toma, ou tenha repugnança invencivel a toda a especie de remédios.

3.<sup>o</sup> Quando a molestia tenha seu particular assento no tubo intestinal, como acontece no teneismo; neste

caso o contacto immediato deste estimulante produz hum subito alivio. Com tudo sempre he bom uni-lo com ingredientes mucilaginosos e oleosos, para que não excite em demazia.

4.<sup>o</sup> Quando a bexiga — da urina situada junto ao recto esqja atacada de hum alto grão de asthenia directa e de espasmo, e a excreção da urina esteja inteiramente suspensa, ou cutio hum espasmo contrahia o utero e a vagina; n'esse caso hum clyster opiado dà hum alivio instantaneo.

No uso e composição das mezinhas opiadas he necessario a cautella.

1.<sup>o</sup> Em que o Opio seja bem triturado e dividido para que se não pegue às rugas e paredes do intestino, e ligue com demasiada violencia, e muito tempo em hum mesmo lugar.

2.<sup>o</sup> Que a quantidade em que for dissolvido não seja grande, alias o enfermo a não poderia sustentar por largo tempo no intestino. Em pessoas adultas, de tres até quatro onças de liquido bastão; para mulheres, rapazes e pessoas muito irritaveis basta huma ate duas onças, juntandolhe huma pouca de mucilagem ou de oleo.

3.<sup>o</sup> Convem primeiro evacuar todo o excremento que possa estar encerrado no recto.

4.<sup>o</sup> Não deve exceder-se a dose indicada, aliás o remedio como violento poderia causar huma asthenia indirecta, que muitas vezes poderá levar o doente.

Quando hajão obstaculos que embaracem o uso dos clysteres opiados, como fistulas no recto, esta viscera cahida, hemorroides inchadas e dolorosas, etc. etc., e que o uso do Opio se faça necessario; tentaremos o methodo de Brera e Chiarenti recomendo à solução do Opio em liquidos animaes, fazendo fricções externas ao baixo ventre.

A dose he de seis até oito grãos, e mais.

Tambem he recomendavel a mistura do Opio com a mucilagem de gomma arabia, ou oleo para injeções na Gonorrhoea virulenta., v. g.

R. — Opio puro                      grãos oito até doze,  
Macil com de gomma arabia — oit tres  
Agua rosada                      onças seis

Triture-se muito bem o Opio com a mucilagem ate' ficar bem dividido, e juntese a Agua pouco a pouco, e faça injecção para usar trez ou quatro vezes no dia

No externo sendo combinado com outros estimulantes, ou só por si e' adequado para mitigar a dôr do torpor, a inflamação passiva, as dores hystericas, a arthrodynia, v. g.

R. — Linimento de Ammonia      onça huma e  
                                 meia.  
Tintura d' Opio      onça meia  
Misture-se. Ou

R. —	Ether sulfurico	onças duas.
	Tintura de Opio	onça meia.
Misture-se.		

Na Ophthalmia serophulosa, acompanhada com grande torpor dos vasos convem algumas gottas de Laudano liquido de Sydnham.

Como seja possível tomar huma grande dose de O. pio cujos effeitos possam ser funestos, diremos alguns meios recomendados para obviar taes consequencias.

Recomendão huns os emeticos, que na realidade são o melhor remedio, se este estímulante estiver ainda no estomago; o que he factivel, ainda depois de algumas horas, principalmente havendo sido tomado em substancia, e então parece ser muito proprio o seguinte.

R. — Sulfato de cobre. grãos quatro.  
Tartrito de potassa antimoniado .. grão  
hum  
Agua destillada onças duas  
Misture-se para huma dose sendo adulto.

Passado tempo mais largo, e que o Opio já não se ache no estomago, ou haja sido tomado em solução, como Laudano liquido, huns aconselham os acidos vegetaes, os purgantes, as sangrias, em fim o methodo reabilitante. Outros em que entra a maior parte dos modernos, recomendão o vinho, e os estimulantes diffusivos, como Alkali volatil, com que Ridleim salvou hum homem ja' agonizante.

Estes dois methodos que parecem contrariar se, tem cada hum seu valor real; mas só nas diferentes especies do incommodo produzido pela grande quantidade deste remedio. Se a quantidade demasiada causa hum hyperaethenia de incitamento, o rosto encende-se, a respiração he precipitada, o pulso cheio, forte e dure, etc, então os debilitantes e sobretudo a sangria são indicadas. Se pelo contrario o estímulo muito energico do Opio produzir aethenia indirecta que o doente fique adormecido, descorado, palido, a respiração fraca e lenta, o pulso frequente, mole e pequeno, o corpo cuberto de suores frios e glutinosos; então os estimulantes os mais diffusivos e energicos são os unicos meios de reanimar a susceptibilidade quasi a ponto de se extinguir. (\*)

### Da Belladonna.

*Atropa Belladonna* Linn. Pentand. monogyn. França, Portugal, Italia, e em toda a Europa.

He hum planta perenne, venenosa e mortifera em todas as suas partes.

As molestias em que tem sido recomendada são as mais obstinadas, como cancro, tumores scirrhosos das glandulas, particularmente dos peitos, a dose das folhas he de ordinario de dois graos augmentando gradualmente até quatro. He proveitosa na tosse convulsiva, principiando com hum quarto de grão augmentando até meio grão, por duas vezes no dia.

---

(\*) Sobre a acção do Opio em diversas preparações podia fallar-se com maior extensão, porem o lugar e a Obra o não permite.

He hum excellente anti spasmodico , mas convem primeiro dispor com hum emetico , e hum purgante ; e se a pelle estiver com maior calor são necessarios os remedios salinos. Tambem se faz recommendavel no hysticismo convulsivo.

*Da Cicuta. Herva.*

*Conium maculatum* Linn, Pentand, dyginia Juss.  
*Umbellifera*

*Europa.*

Os antigos e os modernos fizeram uso igual da Cicuta , e em casos identicos , e he hum excellente remedio. Foi applicada ao scirrho e cancro por Stork ; e apesar de que os seus encarecimentos são demasiados , ella he hum bom remedio na tosse convulsiva , no rheumatismo , especialmente chronico , na mania furiosa , inflammacoes scrophulosas , mas com particularidade nos olhos e periosseo na atrophia mesenterica das criancas. Pode ministrar-se a todos os sexos , idades em todos os tempos , e em doses não pequenas . A melhor forma he em pós , e he conveniente principiar por seis grãos no dia , porque muitas vezes não podemos exceder de oito grãos : algumas pessoas podem tomar hum escrupulo ou meia oitava. Seis grãos dos pós são mais efficazes do que quatro do extracto , o que prova que ella no extracto perde a sua virtude.

A infusão da Cicuta he hum excellente remedio na dose de hum escrupulo para quatro onças de agua fervendo. Para as criancas , a dose dos pós he meio grão ou hum por tres vezes no dia , e pôde li-se augmentando.

Na tosse convulsa devemos observar se a pelle tem maior calor , se o pulso he apressado , e se ha huma secreção copiosa de materia , por que neste caso antes do uso da Cicuta devemos dar hum ou dois emeticos , e hum purgante. faltando estes symptomas podemos entrar logo no uso da Cicuta.

Com ella não deve administrar se Opio algum às criancas pelo risco de lhes anectar a cabeça , e produzir



vertigens e nauseas. Se na tosse convulsa logo no principio se fizer uso da Cicuta, ella não dura mais de quinze dias. No primeiro estado da molestia o doente não deve sair fora, e conservar-se ha em huma temperatura moderada.

No segundo estado he necessario mudar de practica.

No rheumatismo a força deste remedio augmenta com a addicção dos Calomelanos, por tanto:

R. Colomelanos. — a terça parte d' hum grão.

Extracto de Cicuta. grãos cinco.

Misture e forme pillulas.

Ou

R. Colomelanos — a terça parte de hum grão.

Cicuta em pó grãos cinco até sete.

Misture e forme pillulas para tomar por tres vezes no dia. Este remedio continuado, por certo ha de produzir bons effeitos em quasi todos os casos chronicos, quando não sejam de muitos annos, e se as juntas não estiverem molestas. Nas affecções escrophulosas ella produz bons effeitos, mas he necessaria bastante cautella na addicção dos Calomelanos.

Quando a transpiração fo-se permanente, nada seria mais proveitoso; mas nos lugares em que a temperatura mudando de hora a hora, reprime a transpiração, não convem os Calomelanos.

No externo a Cicuta corrige o fedor do cancro em dez ou doze horas, ainda que muito offensivo seja.

A cataplasma de cinouras com meia onça ou huma de pó de Cicuta, ha de mudar a descarga para hum pus saudavel: a cataplasma deve renovar-se duas vezes ao dia; mas ainda que a cura assim pareça adiantar-se, passados alguns dias desaparecem estes bons effeitos pela disposição cancerosa.

### *Do Meimendro negro.*

*Hyosciamus niger* Linn. *Pentand. monogynia*  
Europa. Fôlhas, flores, e sementes são usadas.

He hum dos regemes venenosos, os seus effluvios são mortaes a algumas pessoas. Boerhaye em quanto estava fazendo a extracção em razão dos effluvios, foi atacado de tremor, perda de forças e vertigens.

Shortjing o dá por muito proveitoso nas hemorrhoides, no scirrho, e cancro para mitigar a dôr, quando falha o Opio. Storck o recommenda nas queixas espasmodicas, na hemoptisis, cephalalgia, na mania, na melancolia, na palpitação, etc. Elle o deo na dose de hum grão até hum escropulo.

Sendo proveitoso na hemoptisis, podemos concluir por analogia na tosse convulsa.

Greden augmentou-lhe a dose até dezoito grãos na melancolia, e diz que produzira serenidade de entendimento, e hum brando suor. Em outras pessoas tem produzido vertigens estuper, cephalalgia, torpor; mais isto depende da dose, porque o mesmo se nota no Opio, e em qualquer outro estimulante.

*Da Nicotiana, Tabaco, Herua.*

*Nicotiana Tabacum Lin. Penland. monog. Europa America. Asia.*

Tem hum gosto amargo e pungente, e communica as suas virtudes aos espiritos, e á agua.

Esta planta, excita no estomago hum calor pungente, náusea intoleravel, cursos, vertigens, syncope, suores frios como apoplexia, e até a morte.

O humo do tabaco injectado nos intestinos produz desfalecimento geral, e subida relaxação de espasmo, por isso he usado em dureza de ventre obstinada por espasmo dos intestinos, na paixão elíaca; produz relaxação na acção de todo o systema muscular, e he hum poderoso estímulo, cuja acção he passageira. Ha hum cosimento forte em humas pessoas ha de produzir os effeitos acima ditos, em outras ainda. Se dermos em huma pillula a oitava parte de hum grão das folhas seccas, ha de embrulhar o estomago e quando isto passe obra como pungente, aliaz produz diuresis, e ás vezes ambas as couzas; daqui lhe vem o ser conveniente nas Hydropesias. Tem-se curado algumas queixas dyspepticas, acompanhadas de obstinada dureza de ventre, symptomas de estado de

torpor dos intestinos, fumando tabaco, e engulindo a salve.  
Para que obren como leve purgante depois de haver fa-  
lhado o Ruibarbo, as purgas salinas, e os amargos, etc.

He de grande proveito nas colicas espasmodicas, lentas com impedimento de ventre, e flatulencia, e por tal o recomenda Turner nas suas *Ladagações Medicas e Observações*. Na hernia estrangulada o fumo injectado, ou hum clyster da infusão feita pela maceração de humra citava das folhas em doze onças de agua quente, tem ajudado muito para se reduzir o intestino, quando outros meios tem provado inefficazes.

A primeira vez que huma pessoa fuma sempre experimenta effeitos desagradaveis, muitas pessoas se tem arruinado com esse costume, mas sendo moderado he proveitoso, pois tem curado a odontalgia, que provem de inflamação da membrana; mas não deve usar-se, quando as gengivas estejam muito inflammadas.

Diemerbroech o recomenda fortemente como prophylatico na peste. Tambem se tem applicado na animação suspendida, ou affogados apparentes, mas parece não deve ser o melhor remedio por que he o que mais depressa tende a exaurir a irritabilidade.

He muy recomendado por Fowler em toda a especie de *Hydrosesia*, elle o deo em pò, em pillulas, e de infusão em vinho, agua, e alchool na forma seguinte.

R. — Folhas de Necotian. virgin.      onça huma  
 Agua fervendo      libra huma.

**Macere-se** por huma hora, coe-se, e filtre-se.

R. — Da infusão sobredita onças quatro,  
Alcool de 30 grãos onças duas.  
Misture-se.

A dose desta tintura he de quarenta gottas, augmentando progressivamente até oitenta.

Esta tintura tem merecido louvor na dysuria, principalmente na da pedra.



## ORDEM III.

**Dos Estimulantes que obrão, principalmente sobre os nervos; mas que não exat-o em grão igual o systema sanguineo, e se chamão Alexipharmacos.**

*Valeriana Silvestre. Raiz.*

*Valeriana officinalis Linn Triand. monogyn Eur-  
ropa*

Pringle observou que huma infusão da raiz conservára melhor a carne do que o sal, ou a infusão de Quina; e daqui lhe considerou virtude mais anteseptica: mas isto não prova, porque a acção dos medicamentos sobre o corpo vivo differe da acção chymica.

He muito conveniente em numerosas molestias, bem que ao presente não tenha tanto uso como em outro tempo. Obra como hum estimulante geral, segundo as experiencias de Carminati, especialmente para o systema sensitivo; e merece particular estimação nas molestias nervosas como na epilepsia, paralysis, hyterismo e affecções espasmodicas, na tosse nervosa, hemiorania, debilitade dos nervos opticos, lombriças, febres intermitentes, e convulsões.

Usa-se em infusão saturada, em pó, e em tintura.

R. — Raiz de Valeriana Silvestre	oitavas seis.
Rabano rustico, raiz.	oitavas tres.
Agua fervendo	libra huma.
Coe se depois de fria.	

A dose he de huma onça a'é duas. Pode juntar-se-lhe algumas vezes *Ammoniaco Carbonico Pyro oleoso* grãos seis, *Valeriana Silvestre* em pó, hum escropulo, para tomar de quatro a quatro, ou de seis a seis horas.

*Serpentaria Virginiana Raiz.*

*Aristolochia Serpentina Linn. Gynandria hexan-  
dria Virginia Carolina.*

Ella communica suas virtudes á agua , e ao espirito; e o extracto espirituoso he tido por mais energico do que os pós. He hum estimulante quente , que augmenta a força e frequencia da acção do coração e arterias , e em certo grão desperta o systema nervoso , e que pela maior parte promove o suor , esta a qualidade que a faz reconhecavel nas febres. Alguns a dão , em mistura com os pós de Contra-herva compostos como diaphoretico.

Merece grande estimação na prostração de forças , abatimento de espiritos , languidez nervosa , bem que muitas vezes falhe por ser antiga ; he recomendada nas febres putridas e dysenteria , nas chagas , putridas da garganta. A dose dos pós he hum escropulo até oitava huma e meia , de quatro a quatro horas.

### *Da Assafetida Gomma-resina.*

*Ferula Assafetida Linn. Pentandria. Digynia Indica orientales*

He sem dúbida hum remedio muito estimavel particularmente em queixas nervosas , nas diversas affecções hy tericas , hypochondria , sensações dolorosas , contracções spasmodicas , flaculencia , tosse convulsa , asthma , convulsões , e disposição para a syncope. O seu machoiro e mais estimado. A sua dose he de grãos quinze , ou hum escropulo , e huma formula de administrar muito boa , he a seguinte :

R — Assafetida	escropulos seis
Azebre	escropulo hum.
Cxyoa de ferro negro	grãos doze.
Xarope commum	q. b. para formar
pillulas de grãos seis cada huma.	

Cono as pessoas que padecem de hysterismo , de ordinario tem o ventre dureiro , o que causa irritação nos intestinos , as sobreditas pillulas na dose de duas todas as noites , produzindo huma dijecção diaria obsta á molestia.

A seguinte formula he muito boa nas dores de cabeça nervosas.

R. — Assafetida  
Azebar.

oitava huma.  
grãos cinco.

Misture-se, e faça pillulas N.º quinze, das quaes tome trez ao recalhar.

Esta composizio obra como hum tonico nervoso para todo o systema.

O Dr. Miller a recomenda na tosse convulsa da fórma seguinte :

R. — Assafetida  
Acetato de Ammoniac  
Infusão de Poejos

oitava meia.  
onça meia.  
onças tres.

Misture para tomar huma ou duas colheres de hora a hora.

Tem-se inculcado como vermifuga, mas os seus effeitos não correspondem.

He recomendada como emenagoza, e por isso entra nas pillulas de Galbano compostas.

Unida ao Azebre he conveniente na debilidadade de intestinos, ordinaria em gente velha.

White a louva em todas as desordens nervosas, em colicas e convulsões das crianças em elyster. Com Gomma Ammoniac na asthma.

Tem sido recomendada na carie dos ossos por Block, Schneider, e Richter; mas na dose de huma oitava, não tem produzido effeito. Emprega-se em chagas inveteradas por asthma. A sua natureza he dada na dose de huma oitava até durs.

### Do Ladano. Resina.

*Cistus Creticus* Linn. *Polyandr. Monogyn.*

He hum corroborante, obra particularmente no systema nervoso, e daqui vem os seus bons effeitos sendo applicado no externo.

Usa-se no emplasto cephalico, e estomatico.

### Do Storaque. *Rexina.*

*Stryx officinalis* Linn. Decandr. Monogyx.

Creta, Caramania, Persia, Syria.

Contem Acido Benjico

Teve grande aceitação entre os antigos, usa-se na asthma, tosse inveterada, nas molestias pituitosas das visceras, na bleunorrhea, leuchorrhœa, espasmos do ventre e intestinos, flatulência, molestias pituitosas do bôse, atônicas, dyspnea. A sua dose he de grãos dez até hum escropulo. No externo recomenda-se como vulnerario.

### Do Almiscar.

*Moschus moschiferus* Linn. He hum quadrupede ruminante, que junto ao anus tem huma bolça, na qual se acha esta substancia, unctuosa, engrunelada, de cheiro muito forte e penetrante, muito expansivo, sabor acre e amargo.

Tunquin e China.

He hum excelente remedio para o systema nervoso, augmenta a acção arterial, e alivia a languidez nervosa no typho commun. Tem merecido grandes louvores como antispasmodico, na tosse convulsa, nos violentos soluços espasmodicos em pessoas de idade. Plingle o recomenda no typho nervoso, e muitos outros; em convulsões, delirio, mania e em muitas molestias espasmodicas. A seguinte formula he recomendavel.

R. —	Agua de Hortela pimenta	onças cinco.
	Alkool de Junipro composto.	onça huma.
	Almiscar	escrop. dois.
	Mucilagem de gomma arabia	onças duas.
	Xarope simples	onça meia.

A dose he de tres colheres até seis de hora a hora.

### Do Alambre Bitume.

He o seu oleo estimulante, resolvente, antispasmodico, anodifico. O uso interno em espasmo e amenorrhœa

No externo combinado com azeite em fomentações à espinha dorsal nas dyaleisias, arthrodynia.

A dose he de gottas dez até doze.

### Do Castorio

O Castorio he huma materia rezinosa, extractiva e gelatinosa, de huma consistencia molle, de côr cinzento escuro, de cheiro forte e desagradavel, sabor acie, encontra-se em certos folliculos situados junto ás glandulas inguinaes do Castor fiber Linn.

Siberia, Canadá, Laponia.

Tem sido recomendado nas molestias nervosas, particularmente no hystericismo, epilepsia, convulções, combinado com aromaticos; em espasmos do estomago combinado com Alkali volatil. Os modernos não fazem delle grande uso, e lhe preferem outros estimulantes, v.g. Alcool de Canella, Tintura de Cardamomo, Electuario aromatico. etc.

A melhor fórma para ser tomado he a seguinte:

R. — Tintura de Castorio,	gottas vinte
Sapoulo de Ammoniaco	.....
Succinado	gottas oito
Mistura de Camphora	} á oitavas cinco.
Agua de Nuz muscada	

Misture, e forme bebida para tomar por trez, ou quatro vezes no dia.

A dose em pó he de grãos seis ate hum escropolo.

### ORDEN IV.

*Dos Estimulantes que augmentão a força de acção de todo o systema vascular, mas não a celeridade em grau attendivel, e que augmentão a energia dos nervos, e particularmente estimulam a acção do systema absorbente comprehendendo Tonicos, astringentes e alguns antispasmodicos.*



Remedios tonicos são os que dispõem o coração e arterias para huma acção mais forte, e efficaç, e que não estimulam em gráo algum notavel; como a Quina, Calumba, Quassia, os acidos mineraes, etc. Estes remedios dão hum gráo de força à constituição, e não estimulam em proporção. Mas, ainda que tal seja o caracter dos tonicos puros, alguns delles tem sua tal ou qual força estimulante; v. g. a Cascarrilha e Arnica, que algum tanto estimulam o sytema sanguineo.

Todos os tonicos augmentão a absorbencia, Darwin foi o primeiro que fez esta observação, e em razão disso lhes deo o nome de Absorbentia. Este he o seu caracter mais estimavel, e d'elle parece depender o seu modo de obrar salutarifero.

A debilidade ou falta de acção nas veias e vasos absorbentes, faz com que as cavidades fiquem carregadas, os vasos capillares cheios de congestões, e daqui provem dores e debilidade: a falta de absorbencia em huma parte, nella causa congestão, e ao mesmo tempo as particulas inuteis não são removidas; segue-se daqui não só dór, como tambem ficar impedido o movimento da parte.

Havendo falta de absorbencia, em geral ha tambem falta de nutrimento, pois os vasos lacteos não hão de obrar, e além disso as primeiras vias não hão de executar devidamente as suas funcções. Se os absorbentes do estomago estiverem debeis a superabundancia dos fluidos que nelles houver entrado, não poderá ser absorbida por elles; e esta he a causa ordinaria da indigestão. Se as veias estiverem enfraquecidas, as arterias hão de sympathizar, e por isso ha de haver huma secreção pervertida do succo gastrico. Porém quem produz esta falta de acção nos absorbentes? A que he ella devida? Provavelmente por se lhe haver diminuido a sua irritabilidade? Suspendamos aqui o nosso juizo, póde ser que seja a má administração dos estímulos.

Ainda que todos os tonicos promovem a absorbencia, com tudo, como os differentes órgãos são dotados de diversos grãos de irritabilidade, e esta por modos distinctos, por isso huns affectão mais hum órgão que os outros,

Os absorbentes da pelle são affectados pelos acidos mineraes. por isso se diz que elles suspendem o suor, que diminuem a erupção das bexigas, e que ajudam na cura de psora. Outros affectão os absorbentes das membranas mucosas, como Zinco vitriolado, Cal metallica, e a Quina; por isso curão molestias do estomago, dão-se em casos de extensiva suppuração, e na relaxação de membranas mucosas, como a dos bofes depois de peripneumonia. O systema venoso he estimulado pelos vegetaes acres, como agriões, rabo de cavallo, e mostarda; estes augmentão a absorbencia venosa, por isso o seu uso he tão proveitozo no escorbuto. O rhuibarbo, gallas, alumina, as materias calcareas e terreas estimulam os absorbentes dos intestinos, e dahi vem a utilidade do carbonato de cal em muitas diarrheas, não porque destrua a acidez, porém como estímulo particular para os absorbentes dos intestinos.

Muitos augmentão a absorbencia externa, como Rhuibarbo, Quina, etc. A absorbencia hepatica he augmentada pelo mercurio, remedios ferruginosos e saes metallicos. Todos os tonicos diminuem a secreção da outina, por isso ella he muito corada. Os tonicos dados em doses muito grandes, fazem vomitar, e purgar, e determinão para a cabeça, por isso são improprios na apoplexia, paralysis com determinação para a cabeça.

Ainda que alguns tonicos tenham influencia em partes especiaes; muitos, assim como a Quina, e o ferro extendem a sua influencia a todo o systema; tal he a sympathia geral entre as partes da nossa maravilhosa construção, por isso alguns ainda que particularmente determinados ás membranas mucosas, fortificão com tudo o systema por inteiro.

O uso dos tonicos he muito extenso, em metade das molestias são convenientes. A contraindicação do seu uso procede de varios motivos.

1.<sup>o</sup> Se o estomago de qualquer modo estiver cheio de bile, fluidos viscosos, ou comida não digesta, os tonicos não podem ser proficuos, ainda que alias indicados. Se houver bile os tonicos produzem dor no estomago; dores de cabeça, calor na pelle, e febre symptomatica,

isto termina em vomitos diarrhea, ou o doente he aliviado. Se ha comida não digesta no mdo, impede-lhes a acção. Se ha difficuldade no ventre, ou diarrhea biliosa não devem admittir-se até que estas materias encerradas nos intestinos, se achem evacuadas a certo ponto. Muitas vezes o estomago está tão fraco, que não pode digerir os tonicos, sem o auxilio dos estimulantes.

2.<sup>o</sup> O estado do pulso e o calor da pelle deve modificar a nossa pratica. Se houver pulso duro e delzado, innozindo-nos a suspeitar inflammation local, os tonicos são improprios. Se houver calor ardente, e secura de pelle, então igualmente são improprios, ou devemos combinar com elles algum brando diaphoretico.

3.<sup>o</sup> O estado da respiração, e as suas affecções também modificam a administração dos tonicos. Ainda que o doente se ache no maior abatimento de forças, se houver sensação de aperto, e dor, e o doente não respirar livremente, os tonicos hão de augmentar estes symptomas, e impedem a expectoração de modo, que quando humda pessoa he atacada de hum estellicidio, achando-se fraca, devemos primeiro libertar a da tosse e dy-pnea, e depois dar-lhe a Quina.

4.<sup>o</sup> Também lhes impede o uso, sendo aliás requerido, a disposição para apoplexia, indicada por symptomas de tezura na constituição, com dor aguda na cabeça, e repleção no rosto.

### *Da Quina. Casca.*

*Chinchona Officinalis* Linn. *Pentand Monog Peru. Santa Fe*

He hum dos tonicos mais puros, e melhores em todos os casos de relaxação e debilidade, ella augmenta a força da acção arterial, dos absorbentes por todo o systema, e da absorbencia nervosa, de modo que communica vigor a toda a construcção. As molestias a que se faz applicavel são innumeraveis, todas as cachexias, hum numero de neurosis, muitas locais, e muitas p~~re~~sexias.

Como febrífuga he dada no segundo estado do typho e da sincelia para combater a debilidade. Nunca he propria, quando o estomago esteja sujo. Põde dar-se de infusão, coimento, extracto, tintura, em pó, e combinada em todas estas fórmas. Seu merecimento realça nas intermitentes, em que raras vezes falha.

Depois de typho eia com grande debilidade, recobra o appetite e forças; na escarlatina anginosa, e outras muitas febres produz optimos effeitos; he muito efficaç nas bexigas confluentes, e deve ser dada abundantemente em vinho, em quasi todas as circumstancias em que o pulso se ache abatido, e appareçam petechias, mas nas outras variedades de bexigas confluentes, não he tão proveitosa como os cordiaes mais estimulantes: taes são as crystal-linas, que são cõr de pergaminho, então os esticulos directos fazem mais proveito; mas havendo symptomas de podridão, a Quina, os acidos mineraes, e o Opio são os melhores remedios.

Ella he dada nos tumores escrophulosos unida ao ferre; na hydropsia com diureticos e catharticos; em apesia ou fastio por mera falta de tonicidade no estomago; na debilidade chronica por excessos venereos, ou onanismo, e nas dores de cabeça periodicas he optima. Depois de evacuações da ichção hydropica, sempre he dada para vigorizar; junta com o Opio serve na gangrena, assim como com os espiritos; no rheumatismo aguto remittente; na febre biliosa depois de evacuada a bile he de summo proveito. He da mais geral applicação á excepção do Opio e Catharticos.

Alguns symptomas ha, por onde podemos ajuizar da sua util applicação. Se ella produz dôr de cabeça, sede, permanente e desagradavel calor na pelle, temos toda a certeza de que he impropria, ou a dose he demasiada; aqui he patente a diathesis inflammatoria, ou determinação para a cabeça. Se faz pezo no estomago, não deve continuar-se; mas isto pôde vir por mera debilidade, ou de vicio nas primeiras vias; no primeiro caso devem juntar-se-lhe os aromatics, e no segundo devemos usar dos emeticos e purgautes. Se ainda assim produzir o mesmo effeito será conveniente mudar para algum outro



fontes, como Calumbá, ou Quersia, porque huns dos  
tudo's aprovei ao aonde entros não.

A dose da Quina em pó he de meia citara até humma, por vezes no dia.

O seu esmalto composto, he muito usado na blachropia a petechial; nas dyseiprias acompanhadas de grande debilidade. A dose he de duas onças de duas a duas de tres, quatro, ou seis a seis horas.

Sua tintura de duas oitavas, ou quatro por vezes no dia.

O seu virho de hum a ença a'e tres.

Não pareceo necessario especificar as diversas qualidades de Quina, que se tem de coberto em razao de brevidade, e pelo mesmo motivo se deixa em silencio ahi as outras curas aqui adequadas, pois taverão se profusamente tratado dellas nas Direcções, para o uso da Anna de Abril, que antigamente se denominava Anna de Inflama, para ellas se reette o Leitor curioso.

*Do Solgueiro. Casca.*

*Salix Pentandra* Linn. Di. ec Decandr.

As suas virtudes foram já contadas pelas Escrip-  
turas antigas, e hartz, Buchs, Cullen, e outros le-  
dores grandes louvores, por ter vividos applicas ás da Qui-  
mica: us se em pó, ou em cosimento. Este he muito  
poffivel na idina seguinte:

R. — Fô de casca de Salgueiro                      huma onça.  
atê onça hua e meia.

**Agua pura** ..... libra buona e mela.

fosse a e libe huma.

A dose de cada uma é meia.

De 3 a 5 doses de meia colherada até uma, por três vezes no dia.

É muito proveitosa nas queixas espasmodicas, nas nódulos e fístulas antigas, nas obstrucções do fígado, nas ulcers inveteradas, na hemorragia passiva; e nas ainda que estas virtudes sejam analogas ás da Quina, sempre lhe heo muito inferiores.



## Do Carralho.

*Quercus Robur, Linn. Monocot. Polytrich.*

A casca, o lenho, as folhas, o fruto, e o gão todo elle tem muitos principios astringentes, e por isso são tónicos, mas a virtude astringente excede á tónica. Não se he- mos eu que résida a sua virtude tónica, pois que as Oxyas metálicas, igualmente são tónicas, e não ha analogia al- guna entre ellas, e os tónicos vegetaes. Nos tónicos vegetaes por muito tempo se julgou que o acido galho- sô era o seu principio astringente, mas he mais provavel ser o principio tanin.

Antigamente todas as partes do Carralho foram usa- das interna e externamente na dysenteria, henteria, e hemorrhagias do bife.

Os fructos tanto no interno como no externo, são usados como repellio contra as escisipellas.

O cosimento dos fructos torrados, he muito conve- niente depois das necessarias evacuações, e em forma de clyster, e de bebida. A torreação augmenta mais o ta- nin. Por tal he recommendado por Schroder, Mark, e Arnold na atrophia, asthma e-pneumonia, na catarrhe difficullosa, na menorrhagi., e hydropsia. Augmenta as evacuações naturaes do suor, e urina, e em geral não produz impedimento de ventre; dado até certo grau pro- duz erupção miliar.

Na asthma e tuberculos do bife, elle tende a produ- zir dy-pnea, nunca deve dar-se no principio da etica, por tanto:

R. — B lotas de Carralho sem casca, torradas como Catê e em pó

Agua pura

Cosa se até Libra humas, para tomar humas chavezas por tres vezes no dia.

O cosimento das folhas com mel, e acido mineral fórma um bom gargarejo na cynanche maligna.

A casca em pó usa-se no externo para suspender a gangrena.

## Do Millefólio.

*Achillea Millefolium* Linn. Syngen. Polyamia. Europa Virginia.

As suas folhas e flores são tidas por tónicas, e antispasmodicas, e por hum brando remedio nervoso.

O seu extracto da-se na dose de grãos doze, até hum oitava.

## Da Simarruba. Casca.

*Quassia Simarruba* Linn. Decandr. Manog. Exotica.

He muito recomendada na dysenteria, e he hum poderoso lenitivo nas affecções espasmodicas e hystericas dos intestinos, e dá tom ao estomago. Na dysenteria putrida tem mostrado bons effeitos, depois de limpos os intestinos, e corresponde melhor nas dysenterias sanguinosas que nas biliosas; se bem que alguns authores lhe exagerão seu merecimento.

R. — Casca da Raiz de Simarruba onça meia.

Agua. libra huma e meia.

Ferva-se até libra huma.

A dose he de tres onças, por duas ou trez vezes no dia.

Este cosimento he conveniente nas dyaleipyras, e na dyspepsia.

## Da Romã Flor casca, e fructo.

*Punica Granatum* Linn. Icosandr. Monog. No Sul da Europa.

Contem o tanin, extractivo, e acido galhico.

A casca faz-se recomendavel na hientheria, e dysenteria chronica, e em diarrheas antigas e obstinadas.

R. — Casca de Romã contusa oitava huma.

Agua fervendo. onças oito.

Macera-se por trez horas, e coa-se.

R. Da infusão coada onça huma e meia

Tintura de Opio de Londres      gottas quatro.  
Misture se para tomar por trez vezes no dia.

Esta infusão he igualmente proveitosa, como garga-rejo na cynanche maligna.

A infusão das flores he' muito mais fraca, mas tem sido recomendada, e he muito util nos hemorrhagias passivas; v. g. menorrhagia, hematemesis, e hemoptisis passiva, em que não convem os tonicos mais fortes, vomitos violentos, cholera por ureia irritação; mas he necessario juntar-lhe os acidos mineraes.

As flores da Romã na sua virtude nada diferem do *Milifolio*. o que ja se disse na *Pharmacopea Cylica, Medica, e Chirurgica*, e tem em seu abono não só os Mestres da Faculdade, como a razão e a experiencia. Em quanto aos Mestres leia se Cullen, Kergius. Vitel, Lafont Gouzi, Mourray. Chortet. Em quanto à razão e experiencia, vemos que as infusões do *Milifolio* e dos *Balaustrios*, e de todos as substancias que abundao em principio tanico, que em outro tempo se chamava astringente, combinadas com o Sulfato de ferro formao hum Galato de ferro ou tintura indessolúvel, e por consequente mostrando a mesma natureza foi erro dos que criticáram, de hase classifico nos astringentes, e se o lugar o permitisse, se trataria a materia mais vastamente, sem que ficas-se de jó a a resposta ao mesmo critico, sobre a comparação do balsamo de Capaiba, de Canada, de Mecca, do Peru, Toletano, etc., com a Terebentina.

#### Do Cattô ou Terra Japonica.

*Mimosa Catechu*. Linn *Polygamia. Monoecia*, *Indias Orientaes*; Ilhas de Sonda, e Molucas.

Esta substancia he hum dos astringentes mais poderosos, e muito conveniente em varios casos, e em diarrheas obstinadas, que não cedem a outros remedios nem mesmo ao Opio. Ella em geral combina-se com o Opio e he propria, quando necessitamos de hum astringente tonico e não irritante.

Nunca deve empregar-se, quando a diarrheea seja acompanhada de dôr ou descarga biliosa; a dose he de grãos cinco até hum escropulo.

Produce muito bons effeitos na diarrheea colliquativa, e suspende a excessiva descarga na dysenteria.

Não convem na hemoptisis; pois nesta qualquer tônico basta a produzir inflamação do bofe, tosse, e dyspnea, e são mais adequados outros astringentes metálicos.

### *Do Kino.*

Esta substancia, segundo Mourray, obtem-se por incisão da casca d'huma arvore, que se cria nas margens do rio Gambia na Africa, he de côr vermelha escura, solúvel em agua, e alkool, de sabor muito astringente, e no fim adocicado.

Differe do Sangue de drago, em que não he solúvel em agua; assemelha-se ao Cato, mas contem muito mais do principio tanico.

Esta substancia tem merecido grandes elogios na diarrheea ou dysenteria chronica, nas hemorrhagias, e na hemorrhhea, e hlenorrhœa.

A dose em pó he de grãos dez até hum escropulo. Sua tintura de meia onça até huma.

O seu electuario com Terra Japonica de meia oitava até huma por duas ou tres vezes no dia. Sem pó com Sulfato de Alumina de grãos dez até vinte duas vezes por dia.

### *Da Noz vomica.*

#### *Noz Vomica Linn.*

Foi recomendada na peste por Gesner, e muito usada em uso com proveito nas febres. He hum dos melhores tónicos em anemias obstinadas; tem produzido bons effeitos na epilepsia inveterada, quando não procede do desarranjo de organização. Ella he hum tónico combinado com certas forças narcoticas, e determina para a cabeça, augmenta a força e vontade de comer.

A sua dose he de grãos quatro ou cinco por duas vezes no dia, e raras vezes pode augmentar-se a oito grãos, sem causar vertigem.

Em quanto dura o seu uso, todas as funcções se fazem bem, não se observa effeito notavel, mas ella augmenta a força arterial. Nunca pôde ser propria, quando haja tendencia para apoplexia, pois nenhum tonico pode ser proprio, quando haja vertigem, ou estupor.

### Do Sangue de Dragão.

*Dracena draco* Linn. *Hexandra* *Monogynia*. *Pterocarpus draco*. *Calamus rotang* Linn.

He astringente, conten muito principio tanico.

Faz se recommendavel na menorrhagia, hematemesis, e hematuria, a sua forma he a seguinte.

R. — Sangue de Dragão em pó oitava huma.  
Sulfato de alumina oitava meia.  
Conserva de Rosas q. b para formar bolos N.º vinte.

Para tomar tres por tres vezes no dia.

A sua tintura he usada nas gengives ulceradas.

### Do Trifolio Fibrino Herva.

*Menyanthes trifoliata* Linn. *Pentandr*. *Monogy*.

Ella he hum dos melhores, entre os tonicos brandos e estomacicos. A sua infusão augmenta o appetite, as forças da digestão, e as forças por todo o systema.

He muito excellente na apepsia por mera atonia, na cepheale nervosa, e particularmente no escorbuto.

O çumo recente com mel, produz bons effeitos na gotta, segundo as observações de Crichton, e Boerhave. Tambem se faz recommendavel nas febres intermittentes, e na menorrhagia.

Os seus pós tem sido applicados nas lombrigas, na dose de huma oitava, tres vezes por dia.

Sua tintura he recommendada na dyspepsia gastrodynia na dose de huma oitava, ate huma onça.

Seu extracto na dose de grãos seis ate meia oitava.



*Da Arnica. Herba, flor, e raiz.*

*Doronicum pardianches* Linn. Syng. Polyg. Su-  
perf.

As folhas e flores abundão em acido gallico.

He tónica, estimulante, e com muita energia estimu-  
la os absorventes, mormente os da pelle. Não convem  
na hydropesia, como se julgava. Promove a immediata  
absorvencia do sangue extravasado, e produz huma sen-  
sação dolorosa na parte em que elle se acha extravasado,  
o que se imputa à augmentada acção dos absorventes.

He melhor usar de toda a planta, por que algumas  
vezes as flores só por si causão violentas dores de estom-  
ago, quando a dose he consideravel, ainda que isto não  
lhe estorve seus bons effeitos.

He muito recomendada em muitas molestias; em ty-  
phos, angina pectoris, peripneumonia nota, rheumatismo,  
paralysis, e epilepsia, nas febres intermitentes, na anar-  
rosia, pois os modernos conhecerão que os elogios de  
Rocherort, B.chner, Collin, etc., são exagerados, por  
quanto se achou prejudicial na angina pectoris, e peri-  
pneumonia, e que nesta até mesmo he perigosa; pois que  
faz a expectoração, e a respiração mais difficil.

Na asthma humida he muito proficua, se a descarga  
he abundante, com pequena tendencia para espasmo; e  
quando he necessario augmentar forças: mas de todas  
as molestias he a paralysis aquella, em que a Arnica se  
ostenta mais proveitosa, combinada com Alkali volatil, ou  
com a Camphora; por isso,

R. — Pds de Arnica escrópulos dois até

Ammoniaco carbonico

Xarope comm. q. b. para formar pillul

Para tomar por trez vezes no dia com a Mistura cam-  
phorada, ou sem ella.

*Do Cardo Santo. Folhas*

*Centaurea Benedicta* Linn. Syngenes. Polig. frutuos.

He recomendada nas intermitentes, e proventosa na

Missing Pages: p. 45-46



declinação dos typhos, em molestias do estomago e de nervos, na cephalaea nervosa promove a digestão, e não produz impedimento de ventre

A sua dose em pó, he de meia oitava até huma.

A sua infusão de onças duas até quatro.

Seu extracto de grãos seis até doze.

### Da Genciana. Raiz

*Gentiana Lutea. Linn. Pentandr. Digyn. Alemã. nha. Suissa. França*

He hum dos melhores estomaticos, bem desagradavel, he pouco astrigente. O seu uso he igual ao da Quina nas debilidades chronicas languidez, e particularmente na dyspepsia, e intermittentes. A infusão da Genciana, especialmente acompanhada com os aromaticos he muito excellente; a tintura he igualmente boa, e o extracto junto com o ferro, forma pillulas muito estinaveis no chlorosis.

R. Infusão de Genciana composta — onça, huma e meia

Tintura de Cardamomo composta — oitava huma

Misture se para se tomar por trez vezes no dia.

### Da Quassia Lenho.

*Quassia Amara Linn. Decandr Monogyn Exotica.*

He hum dos amargos mais puros, concentrados, e permanentes, e o menos astrigente. He o melhor remedio na aepsia por mera atonia, tambem na atonia chronica, que frequentemente se segue ao parto, e yenteria. He de muito uso nas intermittentes e para dar tom ao estomago debilitado por excessos venarios. Obsta à colica e espasmos, convem nas febras baixas, e corrige a tendencia para vomitar, por mera dyspepsia.

R. Rasuras de Quassia

oitava huma

Agua pura

onças oito.

Faça se infusão por seis horas, e coe-se.

- R. Da infusão coada onças duas.  
Tintura de Alhazema comp. oitav. huma.  
Misture para tomar trez vezes no dia.

### *Da Angustura, Casca.*

Esta casca tem sido muito louçada pelos modernos na dysenteria, diarrheas rebeldes, bleedorrhoea, nas febres intermittentes, na dyspepsia, em tosses convulsivas, etc.

A sua dose em pó he de seis grãos até doze por varias vezes no dia.

A sua tintura he de huma oitava por vezes no dia em algum vehiculo.

- R. Casca de Angustura contusa onç. huma.  
Agua fervendo. lib. huma.  
Faça-se infusão, coe-se em frio.

- R. Da infusão coada onça huma e meia.  
Agua de Noz muscada oitava huma.  
Misture se para uma dose, que se repete por vezes no dia.

Algumas vezes convem juntar-lhe.  
Tintura de Opio gottas quatro.

### *Da Culumba, Raiz.*

Grandes elogios se tem dado a esta raiz nas febres biliosas, diarrheas, vomitos, hypocondria, hysterismo, encephalgia, cephalaea nervosa, porém tem-se observado ser mais efficaz na dyspepsia, vomitos biliosos, depois das evacuações convenientes.

- R. — Culumba contusa onça meia.  
Agua fervendo lib. huma

Faça-se infusão, e coe-se em frio.

A dose he de huma onça até duas, por trez ou quatro vezes no dia.



Algumas vezes convem juntar-lhe

	Tintura de Gingibre . . .	escropulo hum.
Ou —	Tintura de Opio	gottas quatro.

A dose da tintura he de hum oitava até duas.

A dose dos pds de hum escropulo até meia oitava.

### Da Bistorta. Raiz.

*Polygonum Bistorta. Linn. Octandr. Trigyn.*

Perene. Contem Amido, tanin, e acido gallico.

He usada esta raiz na leuchorrhœa, hemorragia dos intestinos, e outras.

He tonica e astrigente, Chronel lhe faz grandes elogios nestas molestias.

A dose he de dez grãos até meia oitava.

### Da Losna. Folhas e Samidades.

*Artemisia absinthium. Linn. Syngenes. Polygam. superfl.*  
*Europa.*

Esta planta he considerada como estomatica, anthelmintica, antiseptica e tonica. Pinel a recomenda nas dyaleispyras. Outros a applicação na gotta, e no hysteresmo. Externamente usa-se como resolvente. Os Chinses e as Nações orientaes usão della no rheumatismo em fórma de moxa.

### Do Ferro.

O Ferro em todas as suas preparações, he hum remedio tonico dos melhores, porém quando o estomago esteja debil e mui sensivel, he necessario dalo em pequenas doses. Elle destroe os acidos das primeiras vias, reanima as secreções e excreções; pelo contrario suspende em razão de sua virtude tonica, as excreções

causadas pela debilitade, taes como as hemorragias, as perdas involuntarias do semen, etc, logo he útil nas affecções asthenicas, e prejudicial nas athenicas; convem na phisica nas hemorragias meruas por debilitade, na atrophia por excessos venereos, particularmente na chlorosis; augmenta consideravelmente a força da acção arterial, sem augmentar a celeridade do pulso.

Faz-se necessaria a união da Magnezia ao ferro, quando o estomago se acha carregado de muitos acidos, porque ella absorve os acidos das primeiras vias, e então o ferro não pode ser atacado pelos acidos, e assim não se desenvolve gaz algum.

Todas as preparações de ferro dão humã côr preta às fezes

A limalha de ferro dá-se na dose de tres grãos até dez ou vinte, em dose grande produz enjoo, e vomitos.

O Sulfato de ferro he estiptico, e he usado como anthelmintico, e na hemorrhea e blennorrhea, convem dissolve lo em Agua. A dose he de grão hum e meio até quatro, por tres vezes no dia.

R. — Myrrha em pó	oitava meia.
Khuibarbo em pó	grãos cinco.
Sulfato de ferro	grãos dez.
Extracto de Genciana	grãos doze.
Xarope simples	q. b.

Forme pillulas número vinte, para tomar duas por três vezes no dia.

R. — Sulfato de ferro	} a oitava meia.
Extracto de Quina	
Xarope commun	
	q. b.

Forme pillulas numero trinta, para tomar duas por tres vezes no dia.

Estas formulas são muito convenientes na chlorosis, leucorrhœa, amenorrhœa, rachitis, dyspepsia, pyrosis, piiscemia abdominal, ictericia

Muitos, e diversos podem ser os grãos da oxidação

do ferro, e todos elles produzem os mesmos effeitos, e esta é porém do estomago pôde fazer que hum seja preferivel aos outros; mas em geral nenhuma das preparações merece preferencia particular.

O Muriato de ferro ammoniacal tem sido recommendado nas errophulas, na leuch ribea, e nas febres intermittentes unido á Quina, ao extracto de Gentiana, Camomilla, etc., na dose de dois grãos até quatro.

A sua natura he preferivel ás outras preparações nos estomagos fracos, e de pessoas delicadas. A sua dose he de gottas dez até vinte ou trinta.

Seu vinho na dose de huma oitava para as crianças, por duas ou tres vezes no dia; para os adultos he de meia onça até seis oitavas.

### *Do Zinco. Vitriolado.*

#### *Vitriolo branco, Sulfato de Zinco.*

Por muito tempo foi dado como emetico, na dose de grãos seis, dez até vinte obra com muita pressa. He um excellentissimo tónico em todas as molestias de debilidade, e o mais proveitoso com especialidade, quando ha receio de augmentar o volume do sangue, como em o nantur, ãs repletas, e pessoas gordas que padecem queixas estomacaeas.

He igualmente o mais poderoso e recommendavel nas palpições, hysteria, cephalaea nervosa, vertigens nervosas, paralytia, sendo meramente symptomaticos de hum affecção de estomago; tambem na asthma espasmodica e epilepsia por debilidade do estomago; na cossa convulsiva tem sido recommendado como remedio muito efficaç.

Nas diarrheas chronicas he de hum grão, dois ou tres grãos, por duas ou tres vezes no dia.

A forma de ministrar he a seguinte.

**R.** — Sulfato de Zinco  
Extracto de Chamomila  
Xarope commun

grãos cinco.  
oitava parte.  
q. b.

Forme pillulas número quinze , para tomar huma ;  
duas , até trez , por trez vezes no dia.

R. — Cozimento de Quina onç. huma e meia.  
Sulfato de Zinco meio grão.

Forme bebida para huma dose , que se deve repor-  
tir duas ou tres vezes no dia

R. — Extracto de Quina oitavas duas.  
Cascarrilha em pó oitava meia.  
Sulfato de Zinco escrop. hum.  
Xarope commum q. b.

Forme pillulas número sessenta , para tomar duas até  
trez , por tres vezes no dia.

He muito conveniente juntar ao Zinco a infusão de  
Cascarrilha , de Genciana composta , o cozimento de Qui-  
na , etc.

No externo em fôrma de banho , injeccões , etc. , he  
proprio na ophthalmia , ulceras da cornea , aphtas , ulce-  
ras , blenorrhœa , synanche mucosa , varices do anus ,  
odontalgia para pôr sobre o dente careado. A dose he  
de hum grão até dez em huma ou duas onças de agua  
destilada.

### *Da Oxida de Zinco.*

Esta Oxida he emetica , antispasmodica , astringen-  
te , o uso interno he na epilepsia , hysteria , e outras  
molestias espasmodicas , scarides , etc.

No externo em fôrma de banho , de unguento , etc. ,  
he propria nos herpes , ophthalmia das palpebras , fendas  
nos peitos ; a dose he de meio grão até quatro grãos com  
assucar.

## *Do Arsenico Branco.*

### *Oxida de Arsenico.*

Os Doutores Lind, Flower, Willams, Gener, Crishton fizerão uso delle nas dyaleipyras rebeldes, molestias cutaneas, elephantiasis, cancro, e talvez será util na hydropesia, na syphilitis rebelde, na paralyasia?

A sua dose he de huma decima parte de hum grão, e de huma gotta até quatro de solução de Flower por duas ou tres vezes no dia.

Sendo a força deste remedio muito venenosa, e corrosiva, e em pequena dose heroica, só na mão de hum Pratico habil e vigilante, he que pôde merecer confiança a sua escrupulosa applicação.

O seu antidoto, he o Sulfureto de Potassa dessolvido em agua.

## *Dos Acidos Mineraes.*

Todos são tonicos excellentes, a sua acção he oxygenar o estomago, e todo o systema

Fazem-se principalmente recommendaveis nos typhos putridos, bexigas confluentes, suores colliquativos, especialmente em crianças, febre biliosa commun, nos vomitos biliosos juntamente com remedios astringentes, na cynanche maligna e escarlatina. Em todas estas molestias são muito proveitosos, e a união dos outros tonicos lhes augmenta as forças.

### *Do Acido Muriatrico*

Este acido convem na iscluria dos rins, na dysuria. etc.

A sua dose he de gottas trez até seis, em porção bastante de agua, dose que se pôda repetir por vezes no dia.

No externo, unido ao mel he optimo nas aphtas, nas ulceras gangrenosas da garganta.

### *Do Acido Sulfurico.*

Este acido he muito usado nas febres petechiaes,



hemorrhagia, molestias espasmódicas, procellidas de nítida irritabilidade, dyspepsia, pyrosis, gastrodinia por ácidos, psoria, e outras molestias cutaneas.

No externo em molestias cutaneas e ulcérâs atônicas, putridas; na tophilitis gangrenosa.

A dose no interno he de gottas seis ate vinte, em grande porção de vehiculo mucilaginoso com açúcar.

### *Do Acido Nitrico.*

Tem sido usado este acido com muito proveito pelos Drs. Dentores Scott, Rollo, Beddoes, e outros. Tem se mostrado o efficaz nas molestias em que o excesso do mercúrio possa ser obstaculo à sua cura, quando as cõdições venereas se fazem phagecénicas, e quando ellas alastrão pelo e minuido uso do Mercurio, como nos casos de chápâs ulceradas na garganta, com carie do osso do paladar, ou dos dentes. nestes termos, se o doente se achar muito abito por demasiada salvação, immediatamente deve suspender-se o uso do Mercurio, e deve substituir-se o Acido nitroso em grandes doses, o qual depressa hade suspender o progresso da doença. Desse modo ficão suspensos os symptomas augmentar se hão as forças e appetitte ao doente, e se porá em estado de continuar brandamente o uso do Mercurio, e virá a melhorar. O acido suspende o progresso da molestia, mas não realiza a cura. Tambem he proveitoso quando o Mercurio produz suores colligativos, ou dysuriea.

A sua dose he de dez gottas ate uma chava, e mais, diluido em vehiculo apropriado.

A seguinte fórmula tem produzido bons effeitos na dysenteria.

R, —	Acido nitrico	oitavas dras.
	Opio puro	grãos dras.
	Agua pura	onças tres

Misture para tomar huma colher de sopa, tres ou quatro vezes ao dia, em algum vehiculo.

### *Do Sulfato de Alumina.*

Este sulfato he usado na hemorrhæa, dysenteria, colica atonica e de chumbo, diarrheæa, leucorrhœa, e diabetes.

O uso externo he em forma de gargarejo, injectão colvrio, etc. na ophthalmia membranacea, na laxidão das gengivas; na synanche atonica, mucosa. A sua dose he de grão hum gradualmente subindo até vinte por vezes no dia.

### *Do Acetato de chumbo.*

Este acetato tomado internamente em pequenas quantidades, não produz effeitos alguns notaveis no estomago, porem suspende muitas hemorrhagias, e secreções hem sensivelmente, em grande quantidade he veneno, e em doses pequenas he sumamente proveitoso. He proprio em todas as hemorrhagias passivas, e em algumas activas, mas na maior parte destas não convem, porque a sua virtude tonica, faz que o vaso roto padeça inflamação flegmonosa.

He proveitoso em todo o caso de menorrhagia, a qual he semp e huma hemorrhagia passiva; igualmente na hematuria e hematemesis. Nos casos ordinarios, poderão bastar o Sulfato de alumina, os acidos, o sangue de drago; porem nos casos violentos, faz se necessario o Acetato de chumbo, e he sempre sem perigo, para o que:

R. — — Acetato de Chumbo crystallizado.

Opio purificado  
Conserva de rosas

}

ã grãos dois.  
q. h.

Misture, e forme pillulas numero seis para tomar huma por trez vezes no dia, ou de seis a seis horas com alguma bebida astringente; v g infusão de Rosas ou de B laustrias com Acido sulfurico.

he hum bom remedio na diarrheæa colliquativa, em forma de clyster combinado com Gomma atabia, e Opio v. g.

R.—— Acetato de chumbo  
Gomma arabia  
Opio puro  
Agua

grãos seis até doze  
onça huma.  
grãos dois ate quatro,  
libras duas.

Misture-se para seis, ou oito doses.

No externo applica-se aos herpes; manchas e pequenas excoriações cutaneas, nas varices dolorosas do anus; no feichoão; e chimoma; arthrodynia rheumatica; comixão, fistula, ophthalmia; blennorhea.

### Do Pao Campeche.

*Haematocxylum Campechiannum* Linn. Decandr.  
*Menogy*

Este lenho he usado na diarrheia, e dysenteria chronica; hi ueribazia com tenesmo; na hemorrhagia com as previas disposições necessarias, associando algumas vezes ao seu cosimento o Carbonato de Cal, a Tintura de Gomma-resino-Kino, a Tintura de Opio, etc.

### Dos Banhos frios.

Os Banhos frios são sempre usados como tónicos. Todo o corpo abaixo de 86<sup>o</sup> fica frio para a constituição humana: o modo principal porque obrão, he produzindo hum repentino torpor nos vasos da pelle, e lançando o sangue para os vasos maiores, a reacção destes vasos he o beneficio do seu uso. O grau das forças deve regular o grau da temperatura. O banho frio depois de molestias agudas não deve baixar de 50.<sup>o</sup>, e em mulheres enfraquecidas, depois de partos, leucorrhœa, etc. o banho mais proprio he de 60.<sup>o</sup> ate 80.<sup>o</sup>

A temperatura sendo baixa, de ordinario faz damno, e quando os vasos do botto, e outras partes se achão fracas, o pranto frio pôde causar-lhes ruptura.

Os Banhos frios são convenientes depois das bexigas, e em todos os casos de eccophulas, excepto a thísica; em atecções nervosas; hystericas; e muitas espasmodicas; na debilidade chronica; dyspepsia; leucorrhœa; purgação, etc.

## ORDEM V.

*Dos Remedios estimulantes cujos effeitos são principalmente de erminados para a pelle, e produzem transpiração ou suor, se o corpo for conservado no calor de 70; mas em temperatura mais baixa augmenta alguma outra secreção, isto he, estimulação alguns outros órgãos secretantes,*

*Dos Diaphoreticos.*

Como até o presente não temos conhecimentos exactos sobre a anathomia dos vasos exhalantes, e por outra parte estejamos certos da sua existencia, observando igualmente que elles bem como todos os outros se contrahem, e se dilatão por muitas causas, dando assim maior ou menor circulação aos seus fluidos, de que depende o estado de grande ou molesta muito frequentemente; concluimo- que elles tem o principio de irritabilidade, e estão sujeitos ás mesmas leis que os outros vasos; e por isso as applicções externas, como o calenco, as fricções etc., lhe augmentão a força; e que a febra ou perda destas tres cosas cousas os contrahem. Observamos tambem que quando a materia transpiravel he expellida pela acção dos vasos, achandose a pelle fria, esta obra como num refrigerante, e condensa aquella a ponto de a fazer visivel; porém quando a temperatura da pelle se acha acima de 108 grãos, a transpiração não he visivel, o que he devido à sua rapida evaporação; facto este que bem notou o Doutor Alexandre. E porque a transpiração e suor parece n ter origem na acção dos mesmos vasos, se bem que aquella seja mais sutil, mais fugaz, algum tanto mais uosa e grossa, e muito parecida ao humor das glandulas sebaceas; este porém tenha qualidades mais salinas, que o fazem analogo à materia da urina, e tenha ao mesmo tempo maior consistencia, mais tenacidade, maior cheiro, sabor, e côr: segue-se 1.º que se pela excreção da transpiração e suor, são expellidas do corpo vivente maternas ou inureis, ou que retidas podem causar molestias, ou aggravar outras;

quando, ou pela frialdade, ou pelo torpor da pelle esta excreção não possa executar-se; devemos promove-la por meio de remedios adequados. 2.<sup>o</sup> Que a separação que alguns pertencem fazer dos remedios que provocão o suor, e dos que excitão a transpiração insensivel. he inteiramente desnecessaria.

3.<sup>o</sup> Igualmente se segue, que a administração dos remedios que promovem a diaphoresis, deve dirigir-se se unto o temperamento, a idade e sexo do enfermo, segundo os habitos e caracter da affecção, etc., etc.

Para excitarmos a diaphoresis, devemos procurar cu que a acção de todo o systema vascular se augmente, e assim se conservão livres os vasos cutaneos, e as suas extremidades desimpedidas; cu que a acção dos vasos cutaneos se augmente. Os meios de augmentar esta acção do coração e systema arterial, a fim de promover a diaphoresis são:

1.<sup>o</sup> Eua grande quantidade de fluidos diluentes que contem muito calorico, os brandos estimulantes augmentão-lhes a efficacia, porém são prejudiciaes, quando a febre seja grande, porque augmentão a temperatura, e assim estorvão o suor.

2.<sup>o</sup> Por sympathia singular com o estomago causada por certos remedios estimulantes, os quaes produzem diaphoresis sympathica, v. g. o Carbonato de Ammoniao por estímulos applicados á pelle, v. g. Fricção, Calorico, Banho quente, Rubefactientes., e.c.

4.<sup>o</sup> Augmentando a circulação em geral com o exercicio.

As circumstancias que exigem os diaphoreticos são;

1.<sup>o</sup> Quando a secreção cutanea he muito diminua relativamente ao estado saudavel, cu ella tenha diminuido subitamente ou nao.

2.<sup>o</sup> No principio de certas molestias febris.

3.<sup>o</sup> Quando no decurso de qualquer molestia vemos que hum leve suor produz alivio por certo tempo.

4.<sup>o</sup> Quando seja conveniente aliviar hum a determinação molestia dos fluidos circulantes, v. g. La cefalalheria e diarrhea.



Pelo contrario são prejudiciaes os diaphoreticos em geral, em todos os casos em que a debilitate seja muito para temer, e as evacuações não estejam findas, assim como no fim das febres em que o doente se acha muito abatido. São temiveis na hectica concomitante da thísica; ou quando haja hum grande abcesso; na profusa suppuração que segue hum a amputação; na rachitica e na tabes mesenterica.

Quando administrarmos os diaphoreticos, devemos como regra geral exhibir bastante porção de liquido aquoso no tempo de sua acção, aliás pôde seguir-se calor ardente com vigilia e dôr, particularmente se o doente se achar exausto por outras evacuações, como na dysenteria e diarreia.

Muitas vezes, se quizermos que hum diaphoretico obte como tal, será mais conveniente da lo pela manhã, porque então ha de haver certo grau de irritabilidade, para que elle produza melhor effeito; tanto assim que o Châ só em certo grau de calor, produz a diaphoresis nesta mesma epoca. Com tudo este methodo não he conveniente no rheumatismo agudo, e outras m lesões, em que melhor convem da lo à noite ao recolher, para que se encontre com a dôr que sobrevem pelo meio da noite, ou logo que o doente aquece. Muitas vezes será conveniente repetir o pelo meio da noite, para conservar o estado de transpiração até pela manhã.

### Da Agrimonia

*Agrimonia eupatoria. Linn. Dod-candr Dyryn. Europa.* Toda a planta he usada.

He hum brando diaphoretico. A sua infusão he recommendavel, no catarrho, tosses, e queixas rhumaticas, na diarreia, obstrucções do figado, reitricas, ulceras nos rins, no bôlle e fígado, e muito particularmente nas erupções furfuraceas da pelle.

B.	Agrimonia	em s duas
	Agua fervendo	libras huma e meia.

Faça infusão por doze horas, de que se tomarão quatro onças por 'trez' trez ou quatro vezes no dia.

### Do Jarro Raiz.

*Arum Maculatum* Linn. *Gynandr. Polyandr. Perene.*

Esta raiz he hum estimulante para o estomago, e para todo o systema dos solidos, promove todas as secreções, especialmente o suor, e algumas vezes a urina, e tambem promove a absorvença por modo bem digno de notar-se.

He recomendada no rheumatismo, queixas catarrbaes, e atonia do estomago. O Doutor Chrishton a louva na arthrodynia rheumatica, e observou que ella promove a absorvença da materia gelatinosa, espalhada por baixo dos ligamentos, que muitas vezes he a causa das crueis dores do rheumatismo: porem, diz elle, quando haja tendencia para a inflamação, ella excita demasiada acção arterial e excitamento no systema, augmentando a dôr.

R. — Raiz de Jarro em pó oitava huma  
 Agua de Canella onças tres.  
 Tintura d'Opio de Londres gottas doze.

Misture-se para quatro doses.

### Da Camphora.

*Laurus Camphora* Linn. *Ennandr. Monogyn. Exotica.*

He hum dos materiaes immediatos dos vegetaes, he volatil, accidificavel, de sabor acre, aromatico, extrahido por decocção e destillação, purificado por sublimação.

He estimado ha longo tempo como diaphoretico, febrifugo, antispasmodico; e sedativo. Não foi conhecido dos Gregos, e os Arabes forão os primeiros que delle

usarão como remedio. Avicena faz menção delle como de hum refrigerante, e foi usado como tal nas febres violentas; porém as suas forças serão melbor conhecidas modernamente. No seu estado volatil he tal a sua força, que mata muitos animaes e insectos, e por isso se usa nos Gabinetes de Historia Natural.

He hum poderoso antiprodisiaco, e convem em certa especie de pilapismo. Tem tido muitos louvores em molestias de natureza muito opposta, como nas febres continuas, no hysterismo, na languidez nervosa, na paralysis, e arthrodynia; por outra parte na mania, inflamações internas, rheumatismo agudo, tosse convulsa, e outras molestias; mas esta differença depende da quantidade do dito remedio. He util nas febres nervosas, combinado com o Electuario aromatico, e com a Mistura salina. Na paralysis deve dar se em substancia e em grandes doses, v. g. de grãos trez até oito por trez vezes no dia, com mucilagens, e Alkali volatil; mas deve ser depois das evacuações necessarias. A mesma fôrma convem na arthrodynia, sendo lhe augmentada sua força pelos Calomelanos, ou Antimonio e Opio, ou Guaiaco. Na mania tem sido applicada; mas não ha certeza de seus effeitos. Porém sabemos que as molestias, em que ella he summamente util, são typho nervoso, paralysis, arthrodynia, certos casos de delirio, e as bexigas confluentes. Não he propria quando haja determinação para a cabeça, nem na epilepsia; mas faz se muito necessaria nas queixas espasmodicas. Na asthma secca he excellente na fôrma seguinte.

R. — Mistura camphorada	onças cinco.
Tintura d'Opio camphorado	oitavas duas.
Ether vitriolico	oitavas duas.

Misture para tomar trez colheres de sopa por trez vezes no dia.

A seguinte fôrma he muito conveniente, e sempre produz alivio na dyspnea e orthopnea.

R. — Ether vitriolico	onça huma
-----------------------	-----------

**Camphora**

grãos doze

Misture, e dême solução para tomar humna colherinha na força da dyspnea, dando-se em algum vehiculo. Ella tambem se applica na tosse convulsa, dyseria, chorea, e outras molestias espasmódicas e nervosas.

No externo usa se para mitigar a dôr no rheumatismo, tumores escrophulosos, contorções, e contusões.

Dada na dose de dez grãos a e quatro com alguma mucilagem oppõe se à stranguria induzida pelas Cauteridas.

Em qualquer molestia em que pretendemos usar della, he necessario que o estomago se ache limpo.

**Das Chamedrios Herva**

*Teucrium chamaedrys. Linn. Didyn. Gymnospermene.*

He muito recomendada p r Senner e S linandes, fôrma parte dos famosos dôs de Porland: he recommendada na gotta, arthrodynia, tosses antigas, asthma, Chlorosis, e febre. Contem muita resina, a qual obra bem como a gomma Guttaco.

A sua dose, estando secca, he de meia oitava até humna.

**Do Mezereão. Raiz.**

*Daphne Mezereon. Linn. Octandr Monogyn.*

Tem tido estimulação na cura do syphylitis, quando falha os mercuriaes. Ella he proveitosa nas affecções do periosseo, precedidas do abuso do mercurio, excepto quando o mesmo osso esteja realmente molasto. Elle estimula e determina para a pelle, e o estomago nao pôde supportar dose grande. A seguinte formula he de Russel, e he muito boa.

R. ——— Casca da raiz de Mezereão      onça humna.  
                   Agua commum                      libras doze.  
     Faça cozimento até libras oito, no fim do cozimento junte --- Alcaçuz      onça humna

Coe depois de frio para tomar meia libra por duas vezes no dia. Ella não produz evacuação alguma, só se houver grande sensibilidade de nervos porque então fará purgar.

No externo usa se como epispastico na opthalmia, dôr de cabeça, rheumatismo, catarro, e escrophulas.

*Do Guaiaco. Lenho, e Gomma resina.*

*Guaiacum Officinale Linn Decandr. Monogyn. Brazil*

Elle estimula o systema arterial, os vasos secretantes da pelle, e da substancia celular, promove a absorvencia, e excita todos os pequenos vasos sanguineos, por isso he tão proveitoso no rheumatismo em que os seus effeitos são os mais decedidos. He louvado por Pringle na dôr dos lombos, sciatica, e outras affecções rheumaticas ob-tinadas.

R. — — —	Resina de Guaiaco.	oitava meia
	Machazem de gomma arabia	onça meia
	Assucar	oitavas duas.
	Agua d'Hortelã pimenta	onça buona

Misture-se para tomar ao recolher, e no dia seguinte se deve usar de pequenas doses de A kali volatíl diluido em agua morna

He muito recommendado nas escrophulas, e leucorrhœa, rheumatismos. As formulas seguintes são optimas.

R. — —	Pôz de Ipecacuanha com Opio.	grãos dez
	Gomma de Guaiaco	escropulo um.
	Misture-se para tomar ao recolher.	

R. — —	Tintura de Guaiaco ammoniacal	onças duas.
	Nitrato de Potassa	oitavas duas



Misture-se para tomar hum colheinha por duas vezes no dia em soro de leite, tomando pillulas de Opio de meio grão á hora de recolher.

R.	Gomma de Guaiaco	gr. quinze
	Nitrato de Potassa	escrop. meio.

Misture-se, e fôrme pós para tomar por tres vezes no dia, tomando ao recolher hum colheinha de hum grão de Opio.

### *Da Imperatoria Raiz.*

*Imperatoria Ostruthium Linn. Ferlandr. Digyn. Perene.*

He estimulante e diaphoretica; he muito louvada na retenção de urina, na colica, e flatulencia. Ella he conveniente na debilidade chronica acompanhada de fraqueza de intestinos, e difficuldade de ventre.

### *Da Arruda. Herba.*

*Ruta Graveolens. Linn. Decandr Monogyn. Perene*

He diaphoretica, carminativa, e excellente remedio nas affecções nervosas. A conserva de Arruda he hum excellente remedio, quando os intestinos se achão distendidos por flatulencia, tambem he conveniente o seu cozimento em forma de enema para as convulsões nas crianças.

### *Da Salsaparrilha. Raiz.*

*Smilax Salsaparrilla Linn. Dioecia. Hexandria. America Septentrional.*

He pretenosa no estado avançado do syphilitis, e quando o uso immoderado do mercurio tem produzido ulceras phagedenicas; tambem auxilia a acção do mercurio em constituições escropholosas.

He muito recommendada por Fordyce nas dores nocturnas. Deve administrar se em grandes doses. Os seus

pós na dose de duas bitavas até meia onça por tres vezes no dia, he hum remedio proveitoso às crianças que padecem syphylitis.

Ella determina para a pelle, e por isso convem em muitas molestias cutaneas acompanhadas de torpencia na pelle, como erupções cutaneas escamosas

R.	Salsa parrilha	onças trez.
	Agoa pura	libras seis.

Faça cosimento para libras trez de que se hão de tomar onças seis por tres vezes no dia.

Ainda que o seu extracto seja proveitoso, com tudo os pós he a forma que mais convem, sendo tomados em leite ou emulsão de amêndoas, mas em abundancia.

*Do Sassafras. Raiz, casca, lenho.*

*Laurus Sassafras. Linn. Enneandr. Monogyn.*

He hum estomatico quente, augmenta a força da acção arterial, exerce sua influencia sobre os pequenos vasos da pelle, e promove o suor.

He conveniente no rheumatismo, cachexia, hydropesia, escorbuto, e chlorosis. A sua infusão junta com a gomma Guaiaco, he muito excellente na arthrodynia. O seu oleo de gottas seis até dez, tambem he recommendado na mesma molestia.

*Do Scordio. Herva.*

*Teucrium Scordium. Linn. Didynam. Gymnosp. Perenné.*

Foi muito louvada pelos antigos, como estimulante, e diaphoretica, e particularmente proveitosa nos herpes; foi recommendada na ascites e amenorrhæa.

*Do Tomitho bravo. Herva, e flores.*

*Thymus Serpyllum Linn. Didynam. Gymnosp. Genne.*

He hum brando estimulante e diaphoretico; Lezichio

recommenda nas obstrucções do fígado, na simples relaxação dos sólidos, na paralyia, apoplexia, vertigem, e hydropesia, na cachexia, quando ha falta de energia nervosa, e a circulação nos vasos cutaneos he pequena; remove a dô de cabeça na braguez.

R. — Folhas de Tomilho bravo      onça meia.  
 Agua pura      onças cinco.  
 Infunda para tomar em hum dia.

*Do Antimonio.*

As preparações de Antimonio podem dividir-se em emeticas, e diaphoreticas, todas elles sendo dados sem demasia fazem determinação para a pelle, mas sendo principalmente grande a sua dose, produz no estomago convulsões para o expellir.

*Do Antimonio Tartarizado.*

He muito conveniente quando o estomago se acha sobre carregado de fluides biliosos, ou grossos ou viscosos; com tudo, elle antes de produzir seus effeitos, muitas vezes causa nauseas, a não ser dado em grandes doses; porque então a sua acção he rigorosa, e continuada por muito tempo. Quando quizermos excitar nauseas mais do que vomitar, elle he muito conveniente, mas para servir de emeucio a ipecacuanha he preferivel.

A sua dose he de hum grão até trez como emetico. Em climas quentes he necessario augmentar esta dose : porque para produzir vomito he preciso que haja hum certo grão de torpor na pelle com nausea. Veja-se Emeticos e Rubefacientes.

O Tartrito de potassa antimoniado, ou o Antimonio tartarizado pôde substituir toda e qualquer preparação de Antimonio, dando-se em diversas doses porque por elle se conserva sempre humia continuada determinação para a pelle.

R. Carbonato calcareo oitava meja.

**Tartrito de potassa antimoniado** .. .. .  
grãos dois.

Misture, reduza a pó, e divida em oito ou dez papeis.

Deste modo fica hum *symples oxyda* como os pós de James, e não obra como emetico, mas determina fortemente para a pelle.

R. **Tartrito de potassa antimoniado,** grãos dois.  
**Acetato ammoniacal** onça. quatro.

Misture para tomar meia onça de trez a trez, ou de quatro a quatro horas em cozimento de cevada.

Esta mistura produz hum facil transpiração sem nausea, ao menos quando o estomago não tenha hum tendencia para isso.

Esta mistura tem produzido bons efeitos no rheumatismo, quando outros remedios tem falhado. He proveitoso em todas as febres com inflammação, e na maior parte das molestias em que he indicada a determinação para a pelle.

R. **Vinho de antimonio tartarisado** gottas quinze.  
**Xarope diacodio** oitava hum.  
**Cumo de limão saturado com carbonato de potassa** onça meia.  
**Agua** onças duas.

Misture para tomar de quatro a quatro, ou de seis a seis horas.

R. **Tartrito de potassa antimoniado** o quarto de hum grão.  
**Cumo de limão saturado** onça meia.  
**Agua** onças duas.  
**Xarope diacodio** oitava hum.

Misture para tomar de quatro a quatro, ou de seis a seis horas.

## Das Oxydas de Antimonio.

Todas as Oxydas de Antimonio são diaphoreticas, todas ellas determinão para a pelle, sem estimular o systema sanguineo, ellas não augmentão a força da acção arterial, porém pelo contrario tem huma força debilitante ou sedativa, sendo capazes de diminuir a força da acção arterial e muscular. São proveitosas em todas as febres com inflamação, em synochas, bexigas, sarampo, pneumonia, e outras, em dose tal que produza suor. He muito conveniente em todos os exanthemas, especialmente quando haja grande calor e secura de pelle. Quando a sua acção se encaminhar aos intestinos, então se lhe deve juntar o Opio.

A Oxyda hydro-sulfurada de antimonio rubro-fusca he muito recomendada nas affecções cutaneas, principalmente nas de qualidade psorica.

R. Oxyda de Antimonio hydro-sulfurada  
rubro-fusca } a grão hum  
Magnesia }  
Assucar citava huma.

Misture-se para huma dose, a qual se repete de manhã e de tarde.

Esta preparação tem sido recommendada em catarrhos chronicos, na thistica pulmonar, principalmente na de especie tuberculosa, não he conveniente quando a molestia se acha adiantada, pois augmenta os suores colliquativos, e a diarrhea; mas sim no principio. Esta dose pôde augmentar-se, segundo as forças e idade do doente: combinada com o Opio he util na tosse, e summamente proveitosa nas escrophulas. Em seus lugares fallamos das outras preparações.

### Do enxofre.

A sua acção he sobre a pelle ou intestinos, e sendo dado em pequenas doses he diaphoretico, em dose maior he laxante. Elle pôde ser administrado na dose de dez grãos por trez vezes no dia; ou na forma de precipitado, isto he, lente de enxofre, e esta forma he



certainmente a mais efficaz, ou seja como diaphoretico ou como cathartico, accomoda-se melhor ao estomago, não produz nausea e obra mais sobre os intestinos, em quanto o Enxofre não affecta mais a pelle.

He recommendado, e tem produzido bons effeitos em muitas molestias do peito, na Peripneumonia nota, nas toses chronicas, e particularmente na asthma humida. Da-se geralmente na fórma de electuario.

R. — Flor de enxofre	onça huma.
Noz mu-chada	oitava huma e meia.
Folhas de Sene em pó }	ã oitavas duas.
Gingibre em pó }	
Mel optimo	onças duas.

Misture e fórme electuario para tomar huma oitava duas vezes no dia

Applicado externamente he muito bom para varias molestias cutaneas pustulares, nas molestias psoricas he hum especifico.

## ORDEM VI.

*Remedios estimulantes cujos effeitos principaes são determinados para os rins.*

### *Dos Diureticos.*

Grande he a quantidade, e variedade de materia expulsada dos rins, como inutil ao corpo.

Esta materia consta principalmente de varios productos salinos, recebidos nos alimentos, ou formados no curso da circulação, e vem a ser. phosphatos de cal e ammonia e muriato, e phosphato de soda. Em muitas occasiões tambem são expellidos muitos acidos animaes, e muitas vezes as bases dos acidos, como tambem alguma gelatina, e particularmente phosphato. Com tudo, o phosphato de cal não existe no soro do sangue, mas em fluidos que se achão em algumas cavidades.

Entre a materia expellida pelos vasos da pelle, e pelos rins ha huma grande analogia; quando huma diminue, augmenta a outra; se a transpiração he diminuida

augmenta a descarga da urina: mas não acontece o contrario, porque impedida a evacuação das urinas, não achamos alivio da parte dos vasos cutaneos, e a secreção, e augmento da urina continua.

Não padece d'úida que as materias assim expellidas sejam inuteis, e ate prejudiciaes ao systema se forem retidas, o que bem se prova na paralytia dos rins.

Pela urina se evacua os saes que recebemos pelo alimento, a terra dos ossos: a ammonia em parte he formada depois de evacuada a urina. Os principaes proveitos dos diureticos, são extrahir do sangue a agua que com elle gira, e levar com si os fluidos accumulados nas cavidades.

### *Da Digital. Herva.*

#### *Digitalis purpurea Linn Didynam Angiosp.*

Tomada em dose de hum terço de grão por huma pessoa de saude, augmenta uniformemente a excreção da urina com mais ou menos nausea. E a dose maior produz vertigem, nausea terrivel, prostração de forças, grande frouxidão na circulação, pulso languido, e muito mais vagaroso; se estes effeitos passam, segue-se consideravel fluxo de urina: se o doente não ehe apoplético. Huma dose grande parece exaurir toda a irritabilidade.

Foi recommendada pelos Doutores Parkinson Darwin, Withering, e Baker na epilepsia em molestias hydropicas: modernamente foi applicada nas molestias febris em que a velocidade da circulação, he a circumstancia principal da molestia.

Tem virtudes consideraveis como diuretica, e tem curado a ascites e hydrothorax, quando os outros remedios tem falhado. He necessaria muita cautella na sua administração; motivo, por que não devemos principiar em dose maior que hum terço de grão dos seus pós, e iremos augmentando proporcionalmente até trez grãos; ainda que esta dose quasi sempre causa alteração na circulação, o pulso com ella tem abatido de 76 a 30, a até mesmo a 26 ou 24, produzindo hum estado comatoso; e muitas vezes inchação geral. Ella

afecta mais as crianças que os adultos, e as mulheres mais que os homens.

Na epilepsia nada aproveita, mas he muito recommendada nas hemorragias, thistica pulmonar, e febres acompanhadas de grande celeridade de pulso, como na esscarlatina, no sarampo, etc.

Na hemoptisis acompanhada de grande ligeireza de pulso, e de affrontamentos, he conveniente, e pode dar-se com mais largueza que na hydropesia, nas outras hemorragias, v. g. hematemesis e menorragia he totalmente desnecessaria. Quando a thistica se acha plenamente estabelecida ella não convem, antes he contraindicada; pois debilita o systema em summo gráo, produzindo abatimento de forças, e anorexia.

Em quanto ao seu uso nas febres, ella tem seu valor na esscarlatina e sarampo; algumas vezes tambem diminua a violencia da mania feroz.

Bem que della se use em pós, infusão. tintura, e cosimento; com tudo a melhor forma he em pó, e dada segundo a dose que acima dissemos.

### Da Infusão.

R. — Pós de Digital  
Agua fervendo.

oitava huma  
onças oito.

Macere-se por quatro horas, coe-se para tomar huma onça de seis a seis, de oito a oito, ou de doze a doze horas,

### Da Infusão com Alkool.

R. — Folhas de Digital  
Agua fervendo

oitavas quatro  
libras duas.

Macere-se por quatro horas, coe-se e junte-se-lhe Alkool

onças duas.

Forme tintura aquosa para tomar meia onça por duas ou tres vezes no dia, da Tintura espirituosa fallaremos em outro lugar.

### Do Colchico.

*Colchicum autumnale* Linn. *Hexandr. Trigyn.*

He hum remedio muito poderoso, porem muito perigoso ainda em pequena dose.

He de muito proveito em todas as especies de hydroesia, o oxymel parece a melhor forma de o applicar, e na dose de hum a oitava obra como diuretico, sem produzir calor ardente, febre, etc.

A addicção da substancia oxygenada tira-lhe todas as propriedades desagradaveis, tem sido proveitosa na hydrothorax, ascites e anasarca.

### Das Cantharidas.

*Melocresicatorius* Linn.

O seu uso interno he talvez muito menor do que devia ser. A sua energia he tal, que na dose de dois ou tres graos produz stranguria e outras sanguiolentas. Em doses minimas estimula o systema sanguineo notavelmente, e com especialidade os vasos absorbentes.

A sua tinctura he de grande proveito nas escrophulas obstinadas unida a Quina; a estranguria he reprimida com diluentes mucilaginosos.

R. — Cantharidas em pó subtil      graos dois.  
 Euphemaceti      oitava meia.  
 Mucilagem de Gomra arabia quanto baste.

Misture, e forme pillolas N.º oito para tomar hum de seis a reis, ou de oito a oito horas.

De todas as molestias he a impotencia aquella em que melhor convem. Nas ulceras dos rins não são convenientes, nem nas da bexiga assim como na gonorrhœa. He proveitoso na paralysisa o seu uso. O seu uso como vesicatorio he muito vasto, pois convem em geral em todos os casos, em que as frças se achem abatidas ou interpeçidas, quando seja necessario excitar a sensibilidade e irritabilidade; nas enfermidades exanthematicas, acompanhadas da mesma debilidade; nas affecções produzidas por frio, em que o movimento se ache lento, os fluidos espessos; quando haja torpencia, estupor,



conceitões humores, fies, mucosidades e nos e pas nos cau-  
sados por obstrucção, e outras causas: nos dores chlo-  
nigas sem inflamação que he que se tira por causa qualquer  
estímulo forçado no mesmo lugar da dor, e que he ne-  
cessario expellir; nos humores e ebrippões huias re-  
trocedidas. Consequencias estas da propriedade tónica,  
inflamante, irritante, corroborante, estimulante, e fun-  
dente das Cantharidas

O seu uso como vesicatorio realça nas febres putri-  
das, malignas ou nervosas, nas pethecticas, quando as  
forças vitaes se achão abatidas, ou como suppressas,  
quando haja sonlencia, delirio, etc.

São igualmente efficazes nas febres eruptivas e télex-  
antematicas de qualquer especie que sejam, como bexigas,  
sarampo, etc., por a muito mais nas bexigas effluen-  
tes, pois diminuem a erupção nos órgãos precisos do  
rosto e peito dissipando parte do humor varioloso, e da-  
quando o por huma via em que não ha perigo alamo,  
prevenindo os accidentes funestos que podião padecer se  
nos olhos, trachetéria, hofes, etc. Com ellas se es-  
tabelece a erupção retrocedida por qualquer motivo.

Se a sua efficacia he grande nas molestias agudas,  
muito mais vantajosa a devemos considerar nas moles-  
tias chronicas mortmente, nas que dependem de vírus,  
ou virus em que os humores se achem infectados, por  
fim, são tantas as enfermidades em que ellas são applica-  
veis já como causticos, já como rubefacientes, que gos-  
tamente podemos dizer, que ellas são humo dos reme-  
dios mais vasto e secundo da Medicina, e que he

Veja-se Houllier, Freind, Hoffman, Mouró, Fer-  
nelio, etc.

### **Do Balsamo de Cupaiba.**

Este balsamo he extrahido da arvore *Cupaiba offi-*  
*cinalis*, Linn. *Desandr. Monogy. plicor incisio*

Teve uso na Leucorrhœa e Gonorrhœa e em mo-  
lestias das partes genitais nas ciceras dyschietas nos.  
He considerado como hum brando astingente e diapnetico.  
Em quantidade moderada obra pertamente sobre os rins,



e estimula os órgãos urinarios, em doses maiores he hum brando apperiente. He muito conveniente na leucorrhea na dose de gottas trinta em assucar de pedra por tres vezes no dia, mas he muito prejudicial no estado inflammatorio da gonorrhœa.

He recommendado nas hemorrhoides na forma seguinte:

R. —	Resina liquida de Cupaiba.	oitava huma.
	Gemma d'ovo	no huma
	Tintura de Opio	gottas vinte
	Assucar puro	oitavas duas

Misture-se.

Da mesma fôrma tira a irritação dos tumores, e obra como hum astringente no estomago, e intestinos. Não convem de modo algum nas queixas pulmonares e ulceras dos rins, pois augmenta a dôr e a inflamação, e febre symptomatica em qualquer inflamação interna.

### Da Terbentina de Veneza.

*He extrahida do Pinus Larix Linn. Monoec Monadelph.*

He estimulante sendo tomada na dose de hum escropulo até huma oitava, excita grande calor por todo o corpo, pulso apressado, e muitas vezes grande dôr de cabeça, e se não segue dôr de cabeça, determina para os rins, e he muito diuretica. Usando-se com demasiada frequencia, e em doses grandes produz estranguria e oûrina sanguinolenta. Na dose de dez grãos até meia oitava he proveitosa na gonorrhœa, leucorrhœa, e debilidade dos órgãos, porem nunca se deve dar, quando haja suspeita de pedra.

O óleo de Terbentina he dado com grande proveito nas dores dos lombos, na sciatica; arthrodynia de gottas quinze até trinta. He muito excellente nas queimaduras; a parte deve ser untada com o óleo quente, applicando-se-lhe depois flos empapados em aliguento

**Elem.** Este tratamento obsta a levantar vesicacões.  
Veja-se Kentish, sobre as queimaduras

Na leucorrhea he bem recommendavel a seguinte formula.

R. —	Terebentina	oitava humã e meia
	Sabão de Hespanha	oitava humã e meia
	Rubarbo em pó	escopulos dois
	Xarope commum	q. b.

Para formar pillulas N.<sup>o</sup> quarenta, e tomar duas por  
trez vezes no dia.

### *Do Acetato de Potassa*

He recommendado como diuretico desobstruente, usa-se na phisconia abdominal, na anasarca, seguiu de escarlatina, nos tumores infartados das glandulas meseraicas; na dose de dez graos até humã oitava.

### *Do Sulfato de Cobre.*

Em pequenas doses he tónico e diuretico.

R. —	Sulfato de Cobre	} a grão dois
	Opio puro	

Misture forme pillulas N.<sup>o</sup> seis para tomar humã de quatro a quatro horas.

Em casos de Hydropsia que depende da fraqueza dos vasos, na tísica tuberculosa recente (dado como lauseante) na hemorrhagia e blenorrea rebelue, na epilepsia, e outros espasmos rebeldes.

No externo convem nas ulceras fungosas, sordidas, verrugas, e cutias excrescencias.

A dose no interno he de meio grão até humã por dia.

*Do Junipero. Bagas.*

*Juniperus communis* Linn. *Dicentra* Monadelph.

As bagas são estimulantes, diureticas, usão-se na hydropesia, dispepsia, colica flatulenta, etc. Na hydrogesia faz-se recommendavel a seguinte formula.

R. ——— Bagas de Junipero. onça huma  
 Agua fervendo libras duas  
 Cõe-se a frio e dissolva-se  
 Borax tartarisado onça huma  
 Tintura de Digital oitava meia  
 Espirito de bagas de Junipero composto onça huma e meia

Misture.

A dose he de duas até trez onças por vezes no dia.

*Do Rabão Rustico.*

*Cochlearia Armoracia* Linn. *Tetradynam Sili- culosa.*

Esta raiz he estimulante, diuretica, e antiscorbutica, usa-se na paralysisa, no temperamento flegmatico. Unida a outros tonicos, v. g. Cascarrilha, Quina, etc., estimula o systema venoso, e remove a congestão do principio dos nervos.

R. ——— Alkool de Rabanos composto oitavas duas  
 Tintura de Quina onça huma

Misture. A dose he de huma colher de chá até duas por trez vezes no dia em vehiculo apropriado.

R. ——— Rabano Rustico } a onça huma  
 Semente de Mustarda }  
 Agua fervendo libra huma.

Macerese por quatro horas e coe-se, e ao licor coado junte-se.

Alkool de bagas de Junipero onças duas.

Miscure. A dose he de duas onças por tres ou quatro vezes no dia.

Algumas vezes convem juntar a cada dose.

Acetato de Potassa

oitava mela.

Ou — Tintura de Scylla

gottas dez.

Ou — Tintura de Digitalis gottas desaseis

Da Scylla.

### *Scylla Maritima* Linn. Hexandr. Monogyn.

He proveitosa como expectorante, diaphoretica e diuretica. Considerando a só como diuretica muitas vezes pode produzir bons effeitos na ascites e anasarca, e junta aos Calomelanos he hum remedio muito efficaç.

Recommenda-se na asthma, e outras molestias pituitosas do bôlle. As seguintes formulas são dignas de estimulação na hydropesia.

R. — Ráz de Scylla recente escropulo hum.

Muriato de Mercurio doce sublimado

grãos dois.

Opio

grão hum.

Conserva de Rosas

q. b.

Para formar pillulas N.º seis, de que se devem tomar duas pela manhã, e duas à noite, todos os dias, b hende-he em cima algum liquido estimulante, v. g. Agua de Martelã pimenta, Alkool de Junipero composto, ou Ether nitrico, etc.

A Scylla tambem se faz recommendavel no hydrothorax, na anasarca sobrevindo à escarlatina.

R. — Scylla secca em pó hum grão hum

rosil de Calmelanos.  
Conserva de Rosas

grão melo.  
q. b.

Para formar huma pillula que se deve tomar duas vezes no dia.

A sua tintura igualmente ha sido elogiada como dinretica, nunca porém se deve empregar como expectorante. A sua dose he de gotas vinte até trinta por trez vezes no dia.

## ORDEM VII.

*Dos Remedios estimulantes que principalmente obrão sobre os intestinos, e vasos das membranas mucosas dos intestinos, produzindo augmento de evacuação por camera.*

### *Dos Catharticos.*

Os Catharticos são bastante numerosos, e huns são brandos em seu modo de obrar, outros porém são violentos; também são differentes em quanto a outros respeito. Alguns diminuem a celeridade do pulso, causão huma sensação de frio e torpor por todo o systema sanguineo, v. g. os purgantes salinos. por isso todos elles são febrífugos. Outros são tónicos, como o Rhuibarbo, o Azebre, etc., e são proprios na dyspepsia, e atonia. Outros são estimulantes, e contem com especialidade nas molestias biliosas, e para promover a absorvencia.

He admiravel a differença dos catharticos, em quanto à sua força; alguns parecem obrar estimulando a investidura muscular dos intestinos, augmentando assim o movimento peristaltico; outros estimulam os vasos dos intestinos que secretão hum fluido para augmentar o movimento peristaltico. Usamos dos catharticos para os seguintes fins.

Desoperar os intestinos das materias contendas, e por largo tempo demoradas. Para este fim qualquer purgante pode servir, com tanto que se consiga o fim, e não deixe para o futuro impedimento de ventre.



2. Como evacuaute geral para diminuir o volume dos fluidos circulantes, especialmente a parte aquosa do sangue, ou por outros termos, para determinar da cabeça, e de outras partes em molestias inflammatorias, e de outras naturezas.

3. Para estimular o systema absorvente, e tirar os fluidos que os absorventes tomão a si, quando o sangue não he abundante, e não he necessaria a sangria

Os catharticos em geral deixão dureza de ventre por duas causas, primeira por estarem os intestinos totalmente evacuados; segunda, pelo torpor que se segue ao excitemento.

### *Da Cana Fistula.*

*Cassia Fistula. Linn. Decandr. Menogyn.*

A polpa da Cana Fistula he hum brando aperiente e nutritivo nas febres, e couvem nas molestias em que purgantes mais fortes podem ser damnosos.

O seu Electuario dá-se na dose de duas oitavas até meia onça.

R. — Polpa de Canafistula	onças duas.
Jalapa em pó	oitava huma.
Oleo volatil de Herva-doce	gotas duas.

Misture, e forme electuario para tomar oitavas duas, segundo as circumstancias.

R. — Polpa de Canafistula	onças seis
Tamarindos	} a onça huma e meia
Maná	
Xarope rosado	onças seis

Misture-se. A sua dose he de meia onça até seis oitavas.

### *Do Maná.*

He o Maná huma substancia muco-sacharina, concreta, obtida por incisão do Fraxino Orno. *Linn. Polygam. Dioecia.*, que nasce especialmente na Calabria.

Esta substancia he purgante na dose de huma onça até onça e meia. Pode combinar-se com o Sulato de Sulfato de Magnésia, com Tamarindos, etc.

Para a diarrheia e catarro das crianças he recommendavel na formula seguinte.

R. — Manteiga	onça huma.
Óleo de amendoas doces	onça meia.
Xarope simples	onça huma e meia.

Misture. A dose he huma colher de chá por tres ou quatro vezes no dia.

### *Dos Tamarindos. Fruto.*

*Tamarindus Indica: Linn. Triandr. Monogyn. Africo e Azio*

Este fruto he refrigerante, antifebril e laxante, usa-se nas febres inflammatorias, diarrheia biliosa, dysenteria epidemica, icterica, etc.

A dose da sua polpa he até onças duas:

### *Do Oleo de Rícino.*

Este oleo he extrahido por expressão da semente do *Ricinus communis: Linn. Monocot. Monadelph.* Arvore que hoje se cultiva na Europa.

Este oleo he purgante na dose de meia onça até huma. convem na dureza de ventre rebelde, na colica e dysenteria.

Administra-se igualmente como anthelmintico, he hum purgante proprio para expellir as ascarides, dando tonicos nos intervalos; tambem he utilidado em clyster no vello, e na colica, produzida por lombrigas.

R. — Oleo de Rícino	onça huma.
Mucilagem de Gomma-arabia	onça huma.
Tintura de Seme	onça huma.
Agua de hortela pimentada	onças quatro.
Lauçano liquido	gottas quarenta.

Misture-se S. A. Para tomar a quarta parte de quatro a quatro horas.

Esta medida he recomendavel na colica precepsida do  
cunho.

R. —	Óleo de Ricino	once 1/2 ana.
	Xarope comum.	op. 1/2 ana.
	Ether sulfurico	quarta 1/2 ana.

**Misture.** Esta mistura tem sido muito recorre-  
da na tenia, contra a qual fallarão outros reme-  
dios. Algumas vezes, segundo as circumstancias, podem aug-  
mentar esta dose.

A seguinte formula merece louvores nas lombriças.

R. — Cosimento de Arruda }  
 . de Lousa } libra huma.  
 . de Sabina }  
 Oleo de Ricino onça meia até huma.  
 Misture e forme clyster.

### Das Folhas de Senne.

*Cassia Senna.* Linn. *Decandr.* *Monogyn.* *Ex.*  
*oliva.*

As folhas de Senne são hum purgante bastante energico, que muitos e sabios Medicos preferem a outros purgantes na cura de molestias chronicas. Ellas não poucas vezes produzem humma irritação na membrana mucosa das vias intestinaes.

R.	Folhas de Senne	oitavas trez.
	Semente de Coentro contusa	oitava huma.
	Sulfato de Soda ou de Magnesia	oitavas de s.
	Agua fervendo	ouças seis.

Digira-se por meia hora em calor brando, e se pa-  
ra huma ou duas doses.

R.	Inusão de Senne tartarizada	onças trez.
	Tintura de Jalapa	oitava hum
	Misture para numa dose,	

## Do Rulbarbo. Raiz.

O Rulbarbo he a raiz do *Rheum Palmatum*. *Linna. Enneandr Trigyn Exotica*. Contem extracto amargo, oxalato de cal, tanniu e acido gallico.

He dotada esta raiz de huma consideravel força tónica e astringente, e não menos laxante. Dois ou trez dias depois do seu uso sente-se huma dureza de ventre. Usa-se na dyspepsia como laxante, e quando pertencemos libertar os intestinos que estão fracos, das materias nelles contendas, mas sem os irritar ou debilitar. Muitas vezes combina-se com os tonicos para lhes augmentar a efficacia em constituições doreiras.

Na dose de quinze grãos até meia oitava, he hum brando cathartico; na dose de huma oitava purga fortemente. Elle obra leptomente trez ou quatro horas depois de tomado, mas sem dores de ventre. He preferivel a outros purgantes astringentes, em razão de não exigir dose grande, ser muito seguro no seu modo de obrar, e não debilitar como os outros. Usa-se na hypochondria, abatimento de espiritos, na hysteria com impedimento de ventre, e nas dores de cabeça nervosas.

R.	Rulbarbo em pó Noz muscada Extracto de flor de Macella Oleo volatil de Hortelá pimenta	}	a oitava meia. escropulo hum. gottas seis.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------

Misture, e forme pillulas trinta, para tomar trez cada dia, ou segundo as circumstancias.

R.	Rulbarbo em pó Jalapa em pó Extracto de Macella Oleo volatil de Cravo	}	oitava meia. a escropul. hum. gottas seis.
----	--------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------

Misture-se, e forme pillulas trinta, cuja dose he a mesma que acima.

Em pequenas doses he muito proveitoso nas dores do ventre nas crianças, quando ha dijecções verdes

glutinosas, lodosas ou acidas.

R. Pós de Rhuibarbo  
Mistura cretacea

escropulo hum.  
onças trez.

Misture-se para tomar huma colherinha de quatro, a quatro, ou de seis a seis horas.

Juntando lhe tintura de Opio he m uito nveniente nas diarrheas.

Em pequenas doses tambem obra frequentemente como estomático, e augmenta as forças da digestão.

R	——	Rhuibarbo em pó	oitava huma.
		Sabao	escropulo hum.
		Oleo volatil de Cravo	guttas quatro.

Misture-se e forme pillulas vinte, para tomar duas por dia.

### *Dos Saes Neutros Purgantes*

Estes Saes são assás numerosos.

### *Do Sulfato de Magnesia*

He hum dos purgantes mais suaves, seguros, e melhores; de oitavas seis até huma onça purga com violencia e sem dôr, diminue a excessiva circulação, produz em todo o sytema huma certa frescura. He proveitoso em todas as febres inflammatorias. Em pequenas doses he excellente na hemoptises e outras hemorragias internas.

R.	——	Infusão de Rosas	onça huma e meia.
		Sulfato de Magnesia.	oitava meia

Misture e forme bebida para tomar de trez a trez ou de quatro a quatro horas.

### *Do Sulfato de Soda.*

Igual ao precedente.



A dose he de oitavas dez até onça huma e meia.

### *Do Tartrito de Potassa.*

He hum brando cathartico, diuretico, desobstruente, usa-se na physconia abdominal, mania, melancholia, ictericia, metastases lactea, hydropsia.

A sua dose hê de oitava meia ate onça uma em seu adequado vehiculo.

### *Do Sulfato de Potassa.*

Este Sulfato he purgante, diuretico, resolvente. Usa-se na dyaleipyras, phisconia abdominal.

A sua dose he de grãos dez até meia onça.

### *Do Tartrito de Soda.*

Este tartrito he cathartico, desobstruente.

A sua dose he de onça uma até onça uma e meia.

### *Da Jalapa. Raiz.*

*Convolvus Jalapa Linn. Pentandr. Monogyn. America.*

A sua força purgativa provem do principio resinoso. Deve pizar-se quando della quizermos fazer uso, e junta-la com Assucar ou Tartrito acidulo de Potassa, ou com outro sal neutro, regra que se deve observar na receita de todos os remedios, cuja força purgante existia no principio resinoso. De todos os purgantes drasticos he o mais brando, na dose de grãos quinze ate meia oitava purga com força, e pela maior parte causa dores em razão da quantidade da resina que contem. Estas dores podem ser mitigadas pelos aromaticos e pelos diluentes mucilaginosos ou caldos tomados em abundancia. Triturada com o Tartrito acidulo de Potassa fica mais bem dividida, e he mais activa. Para muitas pessoas fica

mais agradável sendo misturada com assucar. A sua tintura he huma preparação muito boa, e repetidas vezes se junta á infusão de Senão para lhe acellerar o effeito, por isso:

R.	Tintura de Jalapa	oitavã huma.
Ou	Infusão de Senão tãrtarisado	oitava huma e meia
		onça huma e meia.

Misture.

Nunca he propria em molestias inflammatorias, pelo seu grão estimulante que a todo o systema communica. He muito conveniente na hysteria porèm não em dose muito grande. Misturada com parte igual de Magnesia alba fica tão branda e isenta de dores de ventre, que pode dar-se com proveito ás mesmas crianças.

### *Da Escamonea.*

He hum succo concreto, extracto resinoso por incisão da arvore *Convulvus Scammonia. Linn. Pentandr. Monocyn.*

He hum purgante drastico, que motiva dores de ventre, e em doses grandes produz cursos de sangue. A dose ordinaria he de grãos quatro até doze, em dose diminuta pôde dar-se sem perigo até mesmo ás crianças. Algumas vezes tem produzido bons effeitos na hydropesia, quando se requetem purgantes drásticos antes de se ministrar os diureticos.

### *Das Coloquintidas.*

*Cucumis Colocynthis. Linn. Monoec. Syngen.*

Em pequena quantidade purga violentamente, e muitas vezes produz dôr e irritação nos intestinos e cursos sanguinolentos. Podem usar-se na dispepsia, hysteria, diâbilidade chronica e cachexia, na colica, e para obstar á dureza do ventre.

R.	Extracto de Coloquintidas composto	oitava meia.
----	------------------------------------	--------------

Celomelaños

grãos cinco

Opio puro

grãos quatro,

Misture, e forme pillulas N.º seis, para tomar huma de duas a duas horas.

R. Extracto de Coloquintidas                      oitava huma.  
 Oleo de azeitonas                      onça huma e meia.  
 Cozimento de flor de Macella                      libra huma  
 Misture, e forme clyster para logo se dar.

### *Do Muriato de Mercurio Sublimado.*

Usa-se deste Muriato na physconia abdominal, dysleipya rebeldes, blechropyra amarilla, arthrodynia rheumatica, lumbrigas, hepatites chronica, hydropesia, atrophia mesenterica, ictericia e dysenteria

O uso externo em fôrma de pó he nas ulceras syphiliticas, esfregando as gengivas, etc., e a superficie interna da bocca, na syphilites manchas da cornea, inchação dos olhos, etc.

He hum purgante irritativo, mas sendo propriamente preparado he sem perigo, e não produz espasmos. Tem a propriedade de evacuar o muco; e com excitar o movimento peristaltico no tempo de sua acção, remove todos os fluidos viscosos. Para dar às crianças convem junta-lo com o Carbonato de Cal, para lhes evitar as dores do ventre.

Na dose de seis até oito grãos purga em geral qualquer pessoa. O methodo mais conveniente e seguro he dar trez ou quatro grãos em huma pillula, e ao amanhecer huma dissolução de seis oitavas até huma onça de Sulfato de Magnesia. As crianças supportão maior dose que os adultos em razão de terem os intestinos forrados de maior quantidade de materia mucosa. Elle faz effeitos de emetico só quando o estomago está cheio, mas ainda então he proveitoso.

Merece particular recommendação para limpar os intestinos das crianças em todos os casos biliosos, v. g. febres biliosas, na colica biliosa, e na cholera morbus. He o melhor remedio na febre amarilla na dose de grãos

de seis a seis horas, ajudando e com as fricções externas de pomada mercurial feita com partes iguaes, de modo que exerce a acção mercurial com a brevidade possível.

União á Jalapa, e ao extracto de Coloquintidaes composto, he conveniente na obstinada dureza de ventre. Se neste mesmo caso houverem náuseas ou vomitos, convem dá-lo succintamente; na ictericia he summamente proveitoso.

R. — Muriato de Mercúrio doce  
Ópio puro  
Sabão

grãos seis.  
grãos trez.  
oitava meia.

Misture, e forme pillulas N.º seis, para tomar huma trez vezes no dia.

Na hepatites he talvez o melhor remedio na dose de tres grãos ate seis, de seis a seis horas ajudado das fricções externas da pomada mercurial, assim como se dose na febre amarella; huma vez pois que se induza o pyalismo o doente em geral está salvo. Veja se Silagogos.

### Da Gomma Gutar

Este suco resino-gommoso he extrahido por incisão da Gambogia Guta Linn. *Golyandr Monogyn Exotica*.

Tem sido recommendado na ascites, anasarca, e náusea na dose de tres grãos a 6 ito, combinada com assucar. Ella he hum cathartico poderoso associada com os Colomelatos.

A sua tintura ammoniacal tem se achado util em varias molestias cutaneas. A sua dose he de huma oitava até duas; todas as manhãs e tardes em algum vehiculo.

### Do Azebre.

*Cabulino, Hepatico, Siccotrico.*

Este suco espesso extrahido do Aloes perfoliata Linn. *Hexandr. Monogyn.*

Convem na dureza de ventre, na dyspepsia. A sua

dose he de grãos cinco até vinte.

Alguns o recommendão na cachexia, elle estimula poderosamente o estomago, e o recto, e os vasos adjacentes, por isso se faz util na amenorrhea, não convem nas hemorrhoides, e o seu uso immoderado produz esta molestia

Unido aos brandos topicos he proprio na dyspepsia por mera atonia. Junto ao Carbonato de Cal he util na Cardealgia. Com a Assafetida he bom na hysteria. De mistura com o extracto de Coloquintidas composto, forma hum excellente purgante. Associado à Myrrha, ao Ferro he desobstruente.

R. — Aloes Succotrino	escrupulo meio
Rheubarbo em pó	oitava meia.
Extracto de Geuciana	escrupulo hum.

Misture, forme pillulas N.º vinte, para tomar duas por duas vezes no dia.

R. — Aloes Succotrino	escrupulo meio,
Extracto de Macella	escrop. hum.
Calumba em pó	grãos. vinte.

Misture e forme pillulas N.º vinte, para tomar hum ou duas por trez vezes no dia.

R. — Extracto de Coloquintidas composto.	
Massa de pillulas aloeticas	
anna	oitava meia,
Oleo de Cravo	gottas quatro.

Misture, e forme pillulas N.º vinte, de que se tomará hum por trez vezes no dia ou segundo as circunstancias.



## ORDEM VII.

*Dos Remedios estimulantes que principalmente se dirigem ao utero excitando a evacuação da Catamenia.*

*Dos Emenagogos.*

He mui frequente que a secreção do sangue, que nas mulheres deveria ter principio na puberdade ou não appareça, ou tendo occorrido hum a ou duas vezes nesse periodo ou em qualquer outro da vida torne a suspender-se, ou gradualmente, ou subito por mezes ou annos. Se a falta não causar molestia geral não devemos ter cuidado. Aquellas a quem isto acontece raras vezes conservão sua côr natural, antes flocão pallidas e descoradas, padecem dores de estomago, dyspnea e outros symptomas desagradaveis; por isso a mulher moça a quem falta a catamenia e conserva boas côres, não indica amenorrhœa mas sim gravidação a não haver hum a desordem geral no systema e symptomas de chlorosis.

A amenorrhœa algumas vezes nasce de hum a molestia organização do utero e ovario; por isso ella muitas vezes accompanha o principio de hydropesia do ovario, e sem razão se tem equivocado com a prenhez, pois nesta molestia ao principio acompanhado de hum a inchação geral do mesmo abdomen, e hum a suspensão da catamenia continuando com tudo boa saude e vontade de comer; não ha senão pequena dôr e desasociego pelo abdomen.

Os Emenagogos podem reduzir-se a duas classes.

1. Dos que fortalecem o corpo todo, e não os vasos uterinos em particular, isto hê, tonicos geraes e estimulantes, como Myrrha, Opoponax, Galbano.

2. Dos estimulantes directos para o utero, os quaes produzem catamenia pela sua acção particular, como Sabina, Electricidade, etc.

## Da Myrrha

He huma gomma resina extrahida de huma arvore pouco conhecida.

Tem tido grande voga como emenagoga, bem que só per si não seja muito efficaç. Muitos dos antigos a tiveram por desobstruente, resolvente, e estimulante. Ella he hum dos melhores tonicos, e he estimulante. He proveitosa nas constituições frouxas, na torpência dos vasos, e hy-teria acompanhada de languidez. Na dureza de ventre habitual, he muito proveitosa com o Azebo.

A sua acção he determinativa para o bosse e partes genitales como tambem para o systema lymphatico, por isso e' usada nas tosses antigas, e na tísica pulmonar.

R. — Myrrha	oitavas duas.
Nitrato de Potassa	oitava huma.
Tintura de Opio	oitava huma.
Conserva de Cynobasto	onça huma.

Misture, e forme electuario para tomar huma colherinna por trez vezes no dia.

Na tísica por escrophulas tem mostrado grande virtude, quando não ha inflammação activa, nem tosse secca ou dyspnea. A Myrrha combinada com a Scilla e Tintura de Opio tem suspendido totalmente o que parecia causas decedidos da molestia subelita. Podemos usar della nas fórmas sobreditas ou em bebida na dose de grãos dez ate um escropulo. Juntando se com o ferro e hum emenagogo que raras vezes deixa de curar nos casos de chlorosis. A tintura de Myrrha com Aloes é estimulante e proveitosa na amenorrhœa, quando convenha dar os appetientes com os tonicos; porem a Myrrha he melhor em substancia. Com o Alkali fôrma uma massa saponacea.

R. — Myrrha em pó	grãos doze.
Ferro vitrolado	grãos trez,

Carbonato de Potassa	grãos seis.
Agua de Hortelã simp.	onça hum e meia.
Alk. ol de Noz mu-chada	oitava, hum.

Misture para beber duas vezes no dia.

R. — Myrrha em p.6. oitava hum.  
 Potassa em dissolução grãos trinta e cinco.  
 Triture se tudo, e junte se-lhe  
 Sulfato de ferro escropulo hum.

Misture, e forme pillulas N.º vinte, para tomar duas por trez vezes no dia.

A tintura de Myrrha he frequentemente usada no externo como vulneraria, e algumas vezes tem seu lugar nos gargarejos.

### Da Sabina.

*Juniperus Sabina. Linn. Dioec. Monadelph. Perenis.*

Ella tem grande efficacia sobre os vasos do utero, e sendo dada em abundancia hade causar profusa hemorrhagia do utero ou dos bofes. He propria em chlorosis, quando o tom do systema se acha recuperado, e principia a recuperar se as cores. Sendo dada em quanto no systema houver grande falta de sangue, especialmente das partes vermelhas ha de causar prejuizo, porque a hemorrhagia que ella causa he offensiva. O seu extracção pôde dar se de grãos dez ate hum escropulo, e a tintura de gotas vinte até trinta.

### Da Ruiva dos Tintureiros

*Rubia Tinctorum Linn. Tetrandr Monogyn. Perenne.*

O Professor Horne a applicou e louva muito na chlorosis, ella dá ao leite, à culina e aos ossos hum cor vermelha escura, quando he usada em quantidade. Tem sido recommendada nas obstrucções das vias particularmente do fígado. Pôde dar-se na dose de grãos dez ate hum escropulo.

### *Do Ferro. Veja-se Tonicos.*

Este he o melhor , e quasi o unico emenagogo.

Todas as suas formulas são proveitosas , quer seja no seu estado metalico , quer seja no de perfeita ou imperfeita oxyda. Os seus effeitos no estado metalico são geralmente o augmentar o appetite e as forças digestivas , enegrecer as fezes , dar mais côr ás urinas , melhor semblante , e quando hajão acidos nas primeiras vias elle as corrige e a desprende em fôrma de gaz hydrogeneo sulfurado ou phosphorado. Quanto maior quantidade de acidos houver no estomago , tanto mais proveitoso ha de ser o ferro no seu estado metalico , porque em razão delles o ferro he oxydado antes que obre no corpo vivo. As suas preparações todas são oxydas ou saes. O Ferro dà tom e vigor a todo o systema , e huma côr brilhante a todos os que o tomão por tempo dilatado. Elle com especialidade he proveitoso em todas as moléstias chronicas.

### *Da Oxyda de Ferro amarella.*

Hoffman lhe faz grandes encomios na chlorosis e debilidade geral , a melhor fôrma de a dar he em pillulas com extracto de Genciana ou de Macella ; igualmente he proveitosa na dyspepsia atonia geral , e escrophulas.

He dada de grãos quatro ate grãos dez por trez vezes no dia , conservando ao mesmo tempo o ventre lubrico.

### *Do Sulfato de Ferro.*

He a fôrma em que mais frequentemente se applica , e he hum excellentê emenagogo. Augmenta o appetite e forças digestivas , dà maiores forças , e aviva a parte colorante do sangue. A sua dose he dois grãos ate quatro. Huma dose grande faz vomitar.

O Celebre remedio do Doutor Griffith. , he o seguinte.

R. —	Mirrha	hum escropulo.
	Sulfato de Ferro	grão hum e meio.
	Potassa	grãos quatro.
	Agua de Hortelã	onça huma e meia.

Misture, e forme bebida para tomar trez vezes no dia. Vejam se as Preparações de Ferro na Ordem IV.

Como o Ferro em dose grande faça vomitar, e a dose pôde ser demasiada segundo as circumstancias em que o doente se achar, por isso he necessaria muita cautella na sua administração e unilo sempre com alguns pôs aromaticos, v. g. Canella, Cardamomo, Gengibre, etc.

### *Do Galbano.*

Gomma-resina extrahida por incisão da raiz do *Bubon Galbanum*. *Lin. Pentandr. Dign. Exotica.*

He hum dos estimulantes e tonicos poderosos, quando a acção dos vasos pulmonares ou uterinos se achão entorpecidos. Promove a expectração como a gomma Ammoniaco, porém he menos poderoso. He carminativo, mas improprio na hypersthenia. As pillulas de Galbano compostas com Azebre são proveitosas na amenorrhœa.

R. —	Pillulas de Galbano compostas	oitava huma.
	Azebre	escropulo hum

Misture, e forme pillulas N.º vinte para tomar duas por duas vezes no dia.

### *Do Opoponaco.*

He huma gomma-resina extrahida por incisão da raiz do *Panax Opopanax*. *Lin. Pentandr. Dign. Exotica.*

He hum excellente tonico e estimulante que exerce



a sua influencia até nos mais pequenos ramos do systema arterial, e augmenta todas as secreções, especialmente do utero e bôfes, por isso he conveniente na asthma espasmodica ou humida junta com a scylla, igualmente convem na chlorosis. A sua dose he de grãos dez até hum escropulo.

## ORDEM IX.

*Des Remedios estimulantes que obrão sobre os vasos secretantes da materia mucosa dos bronchios e cavidades de ar dos bôfes e lhe augmenta a descarga.*

### *Des Expectorantes.*

A Secreção da membrana mucosa dos bôfes pode se alterar, por affecções espasmodicas, e por inflamações o humo alterado encorrega os bronchios, e he necessario promover hum a secção abundante para os reduzir á sua escala natural.

Muitos e diversos são os expectorantes, o regime antiphlogistico, os diluentes, como agua morna e singras podem considerarse expectorantes. Tudo o que diminue a augmentada acção do systema vascular promove expectoração na inflamação pneumonica; a dor he aliviada pela expectoração quando ella descarrrega os vasos. Porém aqui só nos limitamos aos estimulantes que obrão directamente sobre os vasos dos bôfes.

Os expectorantes podem dividir se em estimulantes, como gomma Ammoniaco, Sagapeno, e Scylla; segundo Mucilaginosos, como Althea e as gommás simples.

### *Da Gomma Ammoniaco.*

Esta gomma he hum dos melhores expectorantes, e cuja acção particularmente se dirige á membrana mucosa dos bôfes, fazendo a secção mais livre e delgada, estimulando todo o systema vascular; por isso he impropria na inflamação aguda dos bôfes, quando ha dor

a tensão da arca, porque ella augmenta a inflammacão. O seu uso principal he nas tosse de longa duracão com pequena expectoracão. A emulção ammoniacal he preferível ás pillulas, pois he absorvida mais facilmente na parte superior dos intestinos, em quan o as pillulas passam mais abaixo antes de se dissolverem, e requerem dose dobrada para produzir o mesmo effeito.

R. — Emulção ammoniacal                      onça meia.  
Emulção de Amendoas                      oitavas seis.  
Oxymel scilítico                      oitava huma.

Misture, e forme bebida.

R. — Cumo de Limão saturado                      } a oitav. seis.  
Emulção de Ammoniac                      }  
Vinho de Antimonio tartarizado                      gottas dez.

Misture, e forme bebida.

Quando haja certo grão de febre com dór de cabeça, etc., sera muito conveniente juntar-lhe a mistura valina. Muitos preferem dissolve-la em agua de ammonia acetada, o que a faz muito nauseante, mas poderosa. He muito conveniente no catarrho, ou para melhor dizer na tosse chronica em que ha pouca expectoracão, e tambem na asthma humida, quando a expectoracão he escassa.

R. — Emulção ammoniacal                      onças cinco.  
Oxymel scilítico                      onça meia.  
Tintura d'Opio camphorada                      onça meia.

Misture para tomar duas colheres de sopa trez ou quatro vezes no dia.

R. — Gomma ammoniaco                      oitava huma.  
Scylla secca                      grãos cinco.  
Opio puro                      grão hum e meio.  
Oleo volatil de Herva doce                      gottas quatro.  
Xarope commun                      q. b.

Triture-se, e forme pillulas N.º quinze, para tomar huma por trez ou quatro vezes no dia.

Muitos Practicos a recommendão como desobstruente do figado e mesenterio. Unida aos Calomelanos augmenta sua efficacia nas affecções escrophulosas do mesenterio, e na atrophia mesenterica.

### Da Scylla.

Vejão-se Diureticos.

Ella he summamente proveitosa como expectorante e diaphoretica. A sua dose da raiz recente he de quatro até cinco grãos, e da secca de hum até dois grãos.

Junta à emulção de Ammoniacco augmenta as forças de ambas as substancias, ella sempre he melhor dada em pillulas.

R. —	Emulção de Ammoniacco	oitavas seis.
	Emulção commun	onça meia.
	Ether sulfurico	gottas oito.

Misture para tomar de seis a seis horas com a seguinte pillula.

R. —	Scylla secca em pó	grão hum e meio.
	Sabão duro	q. b.
	Forme huma pillula.	

O acetato de Scylla dá-se de gottas cinco até meia oitava.

O Oxy mel de Scylla de huma oitava até duas.

As pillulas de Scylla ate cinco grãos por trez vezes no dia.

A sua tinctura não he hum bom expectorante, mas sim hum diuretico. Vejão-se Diureticos.

### Do Benjoim.

Esta resina he extrahida por incisão do *Styrax Benzoe. Linn. Decandr. Monogy. Exotica.*

A sua tintura tem sido recommendada na rouquidão e total afonia, na dose de meia oitava ate huma,

misturada com vehiculo mucilaginoso, v. g. cosimento de Musgo Islandico, Raiz de Althea, etc.

Ella he proveitosa em doses moderadas na asthma espasmodica e humida, quando a expectoracao he nimia, e o doente com ella fica abatido: igualmente no catarrho chronico sem febre.

R. — Tintura de Benjoim composta gottas trinta.  
 Erculção de Gomma Ammoniaco, e de Amen-  
 doas. anna onça huma.

Misture para beber de quatro a quatro horas.

As flores de Benjoim ou acido benjoico sio proveitosas na dyspnea na dose de grãos seis até dez por duas ou trez vezes no dia.

#### Da Althea. Raiz.

*Althea Officinalis. Linn. Monadelph. Polyand. Perenne.*

O cosimento desta raiz he huma bebida proveitosa no catarrho e pneumonia, e alivia a tosse. Quando a falta de expectoracao provem de pneumonia, os expectorantes mucilaginosos são os mais convenientes. He muito boa no sarampo combinada com a Scylla e tintura de Opio; igualmente convem na dysenteria.

R. — Raiz d'Althea onça meia.  
 Agua libra huma e meia.

Cosa-se até libra huma, nas ultimas fervuras infunda.

Alcaçuz oitavas seis.

Coe-se a frio. A dose he de duas onças até quatro, segundo as circumstancias, ou conforme a tosse apertar.

#### Da Tossilagem.

*Tussilago Farfara Linn. Syngenes. Polygam. Suffr. Perenne.*

Alguns praticos recommendão o uso das folhas e flores na tosse; constipação, tísica, e febre hectica.

### Do Hyssopo.

*Hyssopus. Off. Linn. Didynam. Gymnosperm.*

As summitades floridas, e as folhas forão por alguns anthores celebradas como resolventes, brandamente tonicas, e expectorantes. O chá do Hyssopo he por certo estimulante, expectorante, e conveniente no catarrho, tosses, e pneumonia. Em algumas partes usão d'elle como vermifugo.

### Das Malvas.

*Malva Rotundifolia Linn. Monadelph. Polyandr.*

As folhas e flores contem muita mucilagem, e são proveitosas na dysuria catarrho, pneumonia e dysenteria.

### Do Sabugo.

*Sambucus Nigra. Linn. Pentandr. Trigyn.*

As flores e bagas são emollientes e peitoraes; a sua infusão he humma bebida muy propria no catarrho e sarampo.

### Do Spermaceti.

Esta substancia misturada com gemma de ovo ou mucilagem de Gomma arabia, faz certa emulção conveniente com especialidade na stranguria por Cantharidas, na dysenteria, ulceração dos intestinos, e particularmente no catarrho, na pneumonia leve, tosse secca, falta de expectoração, e na dyspnea.

R. ——— Spermacete  
Gemma de ovo  
Katope balsamico

escropulos dois.  
onça meia.  
oitavas duas.



Ether sulfurico  
 Agua

gotas seis.  
 onças duas.

Misture forme bebida para tomar de quatro em quatro horas.

### Da Seneca Raiz.

*Polygala Senega.* Linn. *Diadelph. Octandr. Exotica.*

He recomendada na thisea incipiente, na hemoptis e peripneumonia, e outras queixas pulmonares; em cataplasma he muito util na mordedura de cobra cascavel, que produz symptomas de pneumonia. A dose dos seus póis he de meia oitava; do seu cosimento de huma onça até onça huma e meia.

R. — Raiz de Seneca onças trez.  
 Agua libras duas.

Ferva-se até libra huma, coe-se  
 Este cozimento he conveniente na hydropesia anethrodynia, etc.

### Do Musgo Islandico.

*Lichen Islandicus.* Linn. *Cryptomag. Algae Perenne.*

Esta planta ha poucos annos he muito recommendada na thisea pituitosa, na leucorrhœa, diarrhœa, dysenteria, molestias atonicas dos boffes, na tosse convulsiva. O Doutor Crichton diz que na thisea pulmonar o Musgo Islandico de todos os tonicos he o que produz melhores effectos, quando o doente principia a lançar pelo eccarro materia purulenta.

O seu cosimento he levemente amargo, e encerra as propriedades de hum tonico e nutritivo.

R. — Musgo Islandico onça huma.  
 Agua libras huma e meia.

Cosa-se até libra huma, coe-se com forte expressão.  
 Esta dose deve tomar-se no periodo de vinte e quatro horas.

**Dos Remedios estimulantes** cuja acção principal-  
mente se dirige ás glandulas e ductos sali-  
vares estimulando e augmentando a excreção  
da saliva.

Os Silagogos podem dividir-se em Geraes, e Locaes que são os que meramente obrão em consequencia do seu estímulo local.

*Anthemis Pyrethrum* Linn. Decandr. Monogyn.  
*Ærotica.*

Ha tempo que esta raiz he conhecida como estimulante nas glandulas salivares, e por isso he proveitosa na paralyasia da lingua ou torpor da mesma.

R. — Raiz de Pyrethro                      onça huma e meia.  
Agua                                                  libra huma.

Coza-se até onças oito, coe-se e a frio jun-  
te-se-lhe.

**Alcool de 15 grãos                      onça meia.**

**Misture-se para gargarejo ou boxexar.**

Ella impede a dôr de dentes procedida da inflamação da membrana na raiz do dente. Tambem he muito util na relaxação da uvala ou amygdalas.

**Vejão-se Narcoticos.**

He hum optimo estimulante, quando ha falta de sensação na bocca, ou humma especie de paralyisia ou torpor.

Todas as especies de Pimenta e Cravo, etc. são si-  
alagogos e estimulantes.

## *Do Azougue.*

O Mercurio no estado de fluido não tem efficacia alguma na Medecina. Sô quando se acha mais ou menos combinado com hum porção de oxygeno atmosphérico influe manifestamente sobre as propriedades vitaes do systema dermoide considerado como orgão absorvente.

### *Da Oxyda de Mercurio vermelha pelo fogo.*

Pott recommenda esta preparação como hum excellente antesyphilitico. Hunter lhe faz os mesmos elogios. A sua dose he de meio grão até hum. Collea a combina com o Opio, e afirma que os seus effeitos são mais seguros. A sua dose he de meio grão até hum.

### *Da Oxyda vermelha de Mercurio por Acido nitrico.*

He usado nas ulceras syphiliticas calozas, ou fungozas, na ophthalmia chronica; e igualmente como escarotico.

### *Do Muriato de Mercurio Precipitado de Scheele.*

A sua virtude nada differo dos Calomelanos ou do Muriato de Mercurio doce.

### *Do Sulfacto de Mercurio Amarello.*

He emetico, drastico, e errbino, proprio nas molestias rebeldes da pelle, e algumas vezes util na hydroesia. A sua dose he de meio grão, como emetico de quatro até cinco grãos.

### *Do Muriato de Mercurio Oxygenado.*

Este Muriato he venenoso, caustico, e requer muita cautella na sua administração. A sua dose he da quarta parte de hum grão. Em dose demasiada produz

dyspepsia, dor, e espasmo no estomago, e algumas vezes diarrhea violenta. Quando mesmo em dose moderada venha a produzir ansiedade, então será conveniente juntar-lhe Opio, ou a sua tintura. He muito perigoso em pessoas de estomago debil, ou que padecem evacuações como diarrhea, dysenteria, etc. No interno deve administrar-se com vehiculos mucilaginosos. O antidoto deste veneno he o carbonato de potassa dissolvido em agua com hum pouco de azeite; ou o cosimento de Quina, ou de Casca de Carbalho.

No externo em forma de banho he excellente para os tumores venereos, e na opththalmia.

R. — Muriato de Mercurio oxygenado      grãos dois.  
                  Agua destillada                      onças oito.  
          Misture-se.

*Do Muriato de Mercurio Precipitado.*

He usado no externo em molestias cutaneas. Mr. Ring louva muito a seguinte formula, em que diz, nunca observára falencia.

R.      Muriato oxygenado de Mercurio      grãos dez.  
          Muriato de Mercurio precipitado      oitava huma.  
          Banha de porco                              onças trez.  
          Oleo volatil de Vergamota              gottas trinta.

Misture, e forme Unguento, para fazer unção quotidiana.

*Do Muriato de Mercurio doce por Sublimação.*

Na dose de hum grão até seis he hum benigno purgante particularmente em pessoas de intestinos irritaveis, sendo dado como antisypthilico deve unir-se ao Opio na dose de hum grão até dois por duas vezes no dia, a fim de prevenir-lhe a acção cathartica.

*Do Sulfureto de Mercurio Antimoniado negro.*

He util nas doencas cutaneas, na amaurosis, bexigas

ellignidade mesenterica das crianças, vermes e arthrodynia rheumatica. A dose para crianças he de grãos dois até trez, e para os adultos de grãos seis até quinze por duas vezes no dia.

### *Do Sulfureto de Mercurio negro.*

He recommendado nas lombrigas e molestias de pelle, na dose de grãos seis até sessenta por dia.

### *Do Sulfureto de Mercurio vermelho.*

Usa-se como fumigatorio nas ulceras e outras molestias cutaneas por syphilites.

No syphilites o melhor modo de administrar o Mercurio, he por fricções introduzindo-o pelos absorventes da pelle, sendo assim seus effeitos mais seguros, produzindo menos inquietação, e prejudicando menos a constituição, pois não passa pelo canal alimentar, para o que a seguinte preparação he a melhor.

### *Do Unguento de Mercurio.*

He a melhor de todas as preparações quando seja bem frito e com o Mercurio oxydado. A dose para uma fricção he de meia oitava até oitava e meia, repetido-se todos os dias, ou em dias interpolados segundo a gravidade da molestia etc.

### *Do Unguento de Mercurio Nitrado*

He muito util nas molestias cutaneas e na tinha da cabeça ainda mesmo da especie mais obstinada. Devendo lavar-se a cabeça com agua e sabão, a fim de tirar as busteillas que poder ser.

O Mercurio augmenta notavelmente a secreção, e promove a absorvencia em toda a construcção humana, com especialidade as secreções alvinas, muitas vezes a urina e em pessoas fracas produz suor copioso. He



sympliciter na constipação, e em todas as obstrucções das vias abdoaminaes, v. g. na inflamação chronica, e do fegado grande, na atrophia mesenterica. Muitas vezes entra a hydropesia, e logo que a constituição por elle seja affectada, os diureticos hão de ter certamente o effeito que dantes não tiveram. Elle augmenta a accção das arterias mais delgadas do systema, e produz haec in inflammatione de specie erysipelatoza. Assim como na bocca e gengivas, que sendo com humidade, com o Mercurio chega a ulceração. Elle he frequentemente util na erisipia, paralyia, e arthrodynia. A sua força alterante he augmentada pelo antimouio.

### ORDEM XI.

*Dois Remedios estimulantes, que excitando a accção espasmodica no estomago e movimento convulsivos nos musculos do diaphragma e abdomen, abrião o estomago e a expectoracão que em si contém.*

#### Dos Emeticos

Muitos são os casos em que os Emeticos se fazem necessarios; são convenientes e proprios todas as vezes que no estomago haja materias offensivas que excedem desassossegado, em ellas se he já muito frouxo, por casualidade, em se hão formado por defeito da digestão; e em todo o caso em que o estomago esteja cheio por debilidade do mesmo organo, ou por materias biliosas ou mucosas. Se acozo venenoso venha a occupar o estomago, sendo vegeaes, o melhor em todo he um emetico quando se dá immediatamente; porém sendo venenos metallicos, se não for immediatamente dado o emetico, este poderá causar mais dano que proveito; pois hade augmentar a inflammation já produzida pelo veneno: o meio effeito mais proveitoso sera de compor o metal, v. g. o arinico pelo Sulfureto de Potassa, etc. Podemos applicar os Emeticos:

1. Para desenvolver o estomago da bile, e materias puras.
2. Para diminuir o excesso, do movimento peristaltico, como na dysenteria.
3. Para promover a expectoração, como na thussia.

4. Para quebrar espasmos, v. g. na tosse convulsa, e na asma.

5. Para promover a absorvência, como na hydropesia.

Na thísica, havendo grandes abcessos, e difficuldade de expellir a materia pela tosse, a concussão do diaphragma no vomito promove a ejeção da materia, e alivia a tosse por algum tempo. Tambem estilha o systema absorvente, e faz que as partes mais delgadas da materia purulenta se despeguem. Por isso os emeticos são uteis na tosse convulsa, quando ha grande quantidade de materia mucosa nos bronses, e quando o estomago sympathizando com os bronses esta carregado de materia viscosa. Tambem são proveitosos na asthma humida, na pneumonia, no principio de todas as febres, na escarlatina anginosa, e na hydropesia; porém nunca tem uso nas febres acompanhadas de inflammation local.

Os emeticos mais usados são a Ipecacuanha e o Tartrato de Potassa antimoniado.

#### Do Asaró.

*Asarum Europæum* Linn. Dodecandr. Monogyn. Perenne.

A raiz na dose de hum escrópulo ate meia onça he emetica e purgante; ella quando excessiva, perde a sua força e actividade, e então passa a hum estimulante para a pelle e para os rins, e por isso algúas a recommendão na hydropesia e dysenteria. Igualmente he hum poderoso emético.

#### Da Ipecacuanha.

*Viola Ipecacuanha* Linn. Singen. Monogyn. Americo. Brasil, Virginia.

Esta raiz teve a primeira applicação na dysenteria em que ella he muito efficaç. Dos Emeticos he o mais brando na dose de grãos quinze a hum escrópulo, porém nas pessoas de estomago muito irritavel a dose deve ser muito menor. Algumas vezes a sua accão he igual no estomago e intestinos. Comunica sua virtude ao vinho, á agua, e ao alcohol.

A dose do seu vinho como brando emetico para o adulto he até seis oitavas, para crianças de idade de hum anno, até hum oitava.

A Ipecacuanha como emetica em muitos casos he preferivel ao Tratruto de Potassa Antimoniado. Em doses pequenas he hum poderoso tonico, e determina para a preferia vagarosa, mas excellentemente.

Na dysenteria convem ser dada primeiro como emetica, depois deve continuar se em pequenas doses, o que surte optimos effeitos, algumas vezes junta com pequenas doses de Opio, ou com outros tonicos.

R. -- — Ipecacuanha . escropulos dois.  
Conserva de Rosas q. b

Para formar pillulas N.º trinta, para tomar hum de quatro a quatro horas com o cosimento de Simarruba.

O Doutor Aikn, e outros multos a recommendão na asthma espasmodica dando -- grãos cinco -- como emetica por trez vezes na semana. Com a mesma intenção he recommendada na tísica, tosse convulsa, molestias catarrhaes antigas, e na menorragia, etc.

He summamente proveitosa no rheumatismo, e a sua força he augmentada pelo Opio.

Os seus pós com o Opio promovem a transpiração, e impedem a disposição febril.

Junta à Gomma Guaiaco he muito proveitosa nas dores dos lombos e de sciatica.

R. Pós de Ipecacuanha com Opio }  
Gomma Resina Guaiaco } a gr. cinco.

Misture, e forme pós para tomar trez ou quatro vezes no dia.

### *Do Tartrito de Potassa Antimoniado.*

He emetico, cathartico. Em pequenas doses he sudorifico, nauseante, diuretico, e antispasmodico. Usa-se

no externo nas pontadas pleuríticas, affecções espasmódicas dos órgãos da respiração, na arthrodynia. Vejam-se Remédios Tópicos, e Diaphoreticos.

A sua dose he de grãos trez até seis em outras tantas onças de agua, segundo a idade e irritabilidade se deve á dar huma colher pequena ou grande de quarto a quarto de hora, ou de meia a meia hora até excitar vomito.

### *Do Sulfato de Cobre.*

Este Sulfato de quatro a cinco grãos obra como emetico com promptidão e facilidade, por isso he recommendavel, quando depois de haver comido se descobrem symptomas apopleticos, ou na gotta, ou em espasmo no estomago por alimento improprio, ou outras substancias, e em casos biliosos.

### *Do Sulfato de Zinco.*

Na dose de grãos dez até vinte he hum emetico, e não produz relaxação de estomago.

### *Da Mustarda.*

He emetica na dose de huma oitava.

### *Da Necciana- Tabaco.*

Esta planta produz nauseas cruéis, a sua cataplasma sobre o estomago tem a virtude emetica, e he muito propria nos casos em que os emeticos não podem dar-se adequadamente pela bocca.

R.	Folhas de Tabaco	onça huma.
	Agua fervendo	q. b.

Pize-se em gral de Pedra, e forme-se cataplasma. S. A.

## ORDEN XII.

**Dos Remedios estimulantes . cuja acção obra sobre a inestidura muscular do estomago e intestinos , expellindo a flatulencia.**

**Dos Carminativos.**

No estado de saude sempre ha huma quantidade de ar que alarga os intestinos , a qual se desenvolve dos alimentos no tempo da digestão , em que proceem do ar que passa pelo pyloro , o dito ar continuando a unirse ás fezes , e he expellido . Em muitas molestias em breve tempo se forma nos intestinos huma quantidade de ar desuzada , que os dilata muito , produzindo desassossego , syncope , borborismos pelo ventre , etc . Esta dilatação de intestinos em mulheres nervosas he sufficiente para produzir hysterismo , cepheale nervosa , convulsões , colica , e espasmos de estômago . Daqui proveem a utilidade dos carminativos . Muitos delles perdem a sua força pouco depois de se haverem tomado , e requerem ser dados em abundancia e com frequencia para produzirem seu effeito .

**Da Laranja , e Limão .**

*Citrus Aurantium Linn.* } *Polyadelph Icósandr.*  
*Citrus Medica Linn*

A casca de ambos estes fructos , he o melhor carminativo e tonico para as primeiras vias , dá a melhor infusão porque a agua quente lhe extrahê todo o seu aroma . O seu oleo volatil he estimulante , porém so não se accomoda ao estomago .

A Infusão da casca de Laranja he huma excellente preparação .

R. — Casca de Laranja	oítavas trez
Casca recente de Limão	oítavas duas
Gingibre raiz	oitava meia
Agua fervendo	onças oito.

Macere por duas horas , e a frio cõe.



R. — Do Heer coado                      onça huma e meia  
 Alcool de Hortelã pimenta                      a oitava  
 Tintura de Alface composta                      meia  
 Misture, e forme bebida para duas ou trez vezes  
 no dia.

### Da Hortelã pimenta

*Mentha Piperita Linn. Perenne.*

A sua acção he cordíaca, antispasmodica, he util  
 na dyspepsia, flatulencia, &c

O seu Alcool e Oleo o mesmo.

A dose da Agua he d'ũa onça até trez; do seu  
 Alcool até huma oitava até duas; do seu Oleo de  
 huma gotta até trez

R. — Agua de Hortelã pimenta                      onça huma.  
 Tintura d' Alface composta                      onça meia.  
 Xarope de Gingibre                      oitayva duas  
 Saponato de Ammoniac                      gottas seis

Misture-se para huma dose, a qual se deve tomar  
 na occasião em que estiver a chegar o paroxismo hysterico.

### Da Hortelã vulgar.

*Mentha Crispa Linn. Didynam. Gymnosperm.*

As virtudes desta sao meiores.

### Da Gingibre Branca. Raiz.

*Amomum Zingiber Linn Monandr. Monog.*

Esta raiz he esumubine, he util na colica flatu-

lento

R. — Raiz de Gingibre a mais recente                      onça meia  
 Agua fervendo                      libra huma

Infunda-se por huma hora, e cre-se para tomar de  
 duas onças até quatro, segundo convenha.

R.	Reubarbo em pó	}	a	oitava	meia.
	Giugibe em pó				
	Xarope simples		q.	b.	

Misture, e forme pillulas N<sup>o</sup> trinta, para tomar duas até quatro por duas ou trez vezes no dia. Veja-se a Ordem I.

*Da Herva doce.*

*Pimpinella Anisum* Linn. *Pentand Digyn.*

A semente he hum excellentissimo carminativo.

A dose do seu oleo he de gottas duas até quatro.

R.	Oleo volatil de Aniz	gottas dez.
	Assucar	oitava huma,
	Tritura e muito bem, depois junte-se-lhe.	
	Tintura de Gencibre	oitavas duas.
	Agua de Hortelã pimenta	onças seis

Misture para tomar de huma a trez colheres, segundo for conveniente.

*Do Cardamomo Menor.*

*Amomum Cardamomum* Linn. *Monandr. Monogyn Ex. tica*

Esta semente só deve tirar-se do casulo na occasião em que della se houver de usar, por que estando fóra delle por algum tempo padece bastante perda de seu sabor.

A tintura desta semente he muito proveitosa na debilidadade do estomago, na colica flatulenta, etc.

R.	Tintura de Cardamomo composta	onça huma.
	Agua de Capella	onças cinco.

Misture para tomar até trez colheres huma vez por outra.

A geração do ar no estomago he corrigida por tonicos geraes, e carminativos.

Nesta Ordem se comprehendem igualmente as Sementes de Endros, Graos do Paraizo, Carvi, Cominhos, Coentro, Funcho, etc.

## ORDEN VIII.

Dos Remedios que no seu modo de obrar se dirigem á membrana mucosa do pelvis, dos rins e bexiga, e devem considerar-se como ténicos para esses mesmos orgãos, comprehendendo tambem os lithontripticos, ou aquelles remedios em que se julgaõ forças para dissolver as pedras nas vias urt-narias.

### *Da Uva. Ursi.*

*Arbutus Uva ursi Linn. Decandr. Monogyn.*

Ha muito que he celebre como lithontriptico, mas he virtude esta, que eila não possui, he hum tónico brando, especial mente sobre os rins, e bexiga; e he util nas ulcerações chronicas desses orgãos, cujos symptomas muitas vezes se tem confundido com os da pedra. He proveitosa em todos os casos de relaxação dos ditos orgãos, na estranguria, dysuria, e ischuria. U-a se na dose de hum escropulo por trez vezes no dia; em doses grandes he narcotica, accelera a circulação.

### *Do Balsamo de Cupaiba.*

Vejão-se diureticos.

### *Da Agua de Cal.*

Tem sido muito elogiada nas molestias de arêas. Dã-se na dose de quatro ate seis onças, por duas ou trez vezes no dia.

### *Do Sabão.*

Alguns lhe attribuem virtude lithontriptica.

Pode dar-se na dose de meia oitava até oitava e mais, por duas ou trez vezes no dia, dissolvido em leite.

### *Da Lexiria Caustica Potassa liquida.*

He talvez o resolvente mais poderoso que conhecemos, dando-se na dose de gotas dez até vinte e quatro por trez vezes no dia, e ha observações de homens fidedignos que mostram ter freq. n'este facto expellir pedras de consideravel gravidade, e livrar os enfermos.

Muitas substancias se tem proposto em differentes occaõs como capazes de dissolver a pedra na bexiga, em razão d' que se creyellas obrão depois de extrahidas, mas he sabido que estas substancias tomadas pela bocca se diluem tanto com a agua quanto pela circulação antes de chegar ao assento d' pedra que ficou quasi, ou totalmente inertes, e nem o mais potente he tem descoberto até hoje que possa ser empregado na bexiga, sem que materialmente lhe offenda a sua organização.

## ORDEN VI

*Dos Remedios estimulantes que obrando sobre os vasos spermaticos, augmenta a secreção do fluido seminal.*

### *Dos Aphrodisiacos*

A Secreção do fluido seminal pôde ser diminuida:

1.<sup>o</sup> Por debilidade geral em maior ou menor idade avançada, ou por causas d' bilhantes como excessos venereos, onanismo, hemorragia, e febril e obstrucção. A anaphrodisia muitas vezes procede da i agitação.

2.<sup>o</sup> Por hum a necção parcial dos orgãos: A anaphrodisia muitas vezes procede de originaria má conformação, v. g. quando os intestinos são demasiadamente pequenos.

Relativamente ao que temos dito podemos reduzir os aphrodisiacos a duas classes:

1.<sup>o</sup> Tonicos em geral, estimulantes, nutrientes, dieta generosa, vinho, Quina, Calumba, banhos frios, exercicio, frições, pequenas commoções electricas aos testiculos.

2.<sup>o</sup> Remedios estimulantes que tem hum propriedade particular de se dirigirem aos vasos que secretão o fluido seminal.

Destes ha só que vamos a tratar neste lugar.

### *Das Cantharidas.*

Vejão-se os Diureticos.

### *Dos Aromaticos.*

O Cravo da India, Veja-se Ordem I.

Estes são os aphrodisiacos mais poderosos, particularmente sendo combinados com pequenas doses de Opio.

A impotencia he de todas as molestias, aquella em que as cantharidas são mais convenientes, mas com especialidade naquella que he induzida pelo onanismo, e abuso do Mercurio, quando ha torpor dos orgaos genitales sem debilidade geral. Combinadas com pequenas doses de Opio augmentão em virtude como acima dizemos

<b>R.</b>	Opio puro	grão meio.
	Cantharidas de hum	grão a quarta parte.
	Mucilagem de Gomma arabia	q. b.

Misture, e forme pillula para tomar duas ou tres vezes no dia.

Quando a aphrodisia procede de debilidade geral combinada com mero torpor dos vasos seminaes, o doctore pôde melhorar, quando elle se possa confiar de si mesmo. O oleo volatil de Cravo, e o Opio he remedio sem perigo, e excellentes.

<b>R.</b>	Oleo volatil de Cravo	gottas cinco
	atq.	gottas oitô.



Opio puro  
Mucilagem de Gomma arabia

grão meio.  
q. b.

Misture., e forme pillula para tomar ao recolher. O Doutor Marriot deu as Cantharidas na dose de grão hum e meio com hum grão de Opio., mas parece demasiado; com tudo a Tintura de Cantharidas na dose de gottas trinta até quarenta, pôde tomar-se por huma dose.

Estes estimulantes são improprios em pessoas destruidas por desordens de vida, por febres, paralysisa, e idade avançada, porque assim as porião na mais excessiva debilidade.

## CLASSE II.

*Dos Remedios Atonicos, ou dos Remedios que induzem atonia.*

Debalxo deste titulo de atonicos podem comprehender-se os meios e remedios seguintes:

Sangria local e geral.

Ulceração purulenta artificial, v. g. sedanhos, fôcetes, vesicatorios.

Nauseantes.

Gazes.

Catharticos

Abstinencia.

A sangria pôde considerar-se como atonico o mais poderoso. Ella he principalmente necessaria nas phlegmasias e sthenias, e tambem em algumas molestias espasmodicas, como na asthma em pessoas robustas, quando he combinada com o catharro, e congestão pulmonar. O sangue coalhado nem he razão para sangrar, sendo visivel, nem para deixar de sangrar sendo invisivel; pois se os symptomas forem urgentes sempre devemos sangrar, v. g. quando ha pleurodyne, oppressão, plethora, tosse, pulso forte, e duro, olhos afoguetados, etc, e vice versa. A investidura do sangue coalhado serve com outros symptomas para regular o nosso juizo.

A constituição ainda a mais fraca, pôde supportar

evacuações de sangue as maiores, quando os symptomas são urgentes: na inflammation pulmonica muitas vezes sangramos ainda com o risco de induzir a maior debilidadade; ha casos em que se tem tirado 360 onças de sangue em menos de trez semanas. O Doutor Pearson menciona hum caso em que dentro de poucos dias se perderão por epistaxis vinte e duas libras de sangue.

A sangria, como acima dissemos, he indicada em toda a phlegmasia, e algumas vezes no principio das febres; aqui po em devemos ser acoutellados no uso da lanceta. Na inflammation a sangria he o unico remedio, como a Quina e o Antimonio o he nas febres.

O estado do pulso, do sangue, etc., devem servir-nos de guia; se bem que o pulso não he muito seguro, em razão de que na enterites elle he pequeno e vagaroso, e com a sangria se faz mais forte; é na pleuritis varia mais que em outra qualquer inflammation, e talvez em nenhuma outra molestia seja mais indicada.

Todas as vezes que o pulso sobe depois de se ter tirado hum pequena quantidade de sangue em qualquer molestia, podemos animar-nos a continuar. Na apoplexia he necessaria sangria profusa, porém o abrir a vèa jugular parece improprio em razão de que pôe vir a ser necessaria hum ligadura em redor do pescoço para suspender o sangue, e porque frequentemente sobrevem espasmos dos musculos do pescoço.

Em muitos casos hum pessoa depois de sangrada pôde mais facilmente ser estimulata. A sangria usa-se com o intento de induzir ou pôr hum equilibrio entre os fluidos circulantes, e os vasos que os contem. Quando ha hum molesto augmento de circulação não he a pressa do pulso, mas sim a augmentada força da acção a que indica a sangria. Nas hemorragias he indicada a sangria, quando ha disproporção entre a força dos vasos, e os fluidos que dentro delles circulão, tambem frequentemente se recommenaa na menorragia, e nas convulções puerperaes, igualmente em alguns casos de meninheia, bem que seja molestia de debilidade; pois que os fluidos algumas vezes estão em maior proporção que os solidos.

A sangria nunca he propria nas erysipelas ou na-gotta.

A sangria local he executada por scarificação, sangrias, e bixas. Este modo de minorar a força do sangue, muitas vezes he especialmente util nas crianças em peripneumonia, tosse convulsa, e outras molestias. Nos adultos he hum dos melhores remedios na inflammação topica, dores de cabeça por plethora, rheumatismo agudo, e em todas as inflammações locais. As bixas quando se applicão devem ser em número sufficiente; na phleimonia dos testiculos ou hernia humoral, pelo menos devem ser doze, cujos bons effeitos depressa serão visíveis; tambem nas dores de cabeça e ophthalmia pelo menos devem applicar-se seis a cada fonte, a mesma quantia deverá ter lugar no phleimão, e rheumatismo agudo na junta do joelho.

As Fontes e Sedanhos já não estão tanto em uso, são convenientes na ophthalmia serophulosa chronica, na tendencia para erupções cutaneas, quando estas alternão com molestias internas, ou com ellas alivião, e na cephalalgia nervosa. Os sedanhos tambem são usados em feridas, e ulceras fistulosas como estimulo das partes calendas para que fação abrolhar granulações. Com os sedanhos algumas vezes se tem curado a hydrocele. Fontes grandes tem sido uteis frequentemente na espinha torcida, fazendo-se hum de cada lado da curvatura, e conservando-as abertas por algum tempo. Veja-se Pott.

Os Nauseantes obrão como hum pederoso atonico, quando muitas vezes se não pode recorrer á sangria com segurança; ou elles ajudão materialmente os catharticos e sangria, diminuindo a força e celeridade da acção arterial. Com tudo deve haver cuidado em que não se effectue o vomito, o que requer delicadeza e hum administração de doses muito gradual.

Os Catharticos logo apôz a sangria são os meios mais apropriados para diminuir a força e celeridade da acção arterial, e são indicados no principio de todas as febres afim de expellir as materias irritantes pelo seu volume ou qualidade; para remover o impedimento do ventre, para minorar a acção do coração e arterias, augmentando a secreção do canal intestinal, e determinando

maior corrente de sangue para os intestinos. Também são indicadores em quasi todas as inflammções pelo motivos acima dltos, e em todas as molestias sthenicas.

O uso dos Gazes quasi se acha limitado á thísica pulmonar, quando a acção de todo o systema arterial se acha augmentada, e assim mesmo ha nos boffes inflammção suppurativa.

O Doutor Reddoes diz que a etiguidade procede de hum demasiado e excessivo estado oxygenado do sangue. e os factes em que se funda esta theoria são:

1. O estado de prenhez faz parar o progresso da etiguidade, o que faz suppor que huma parte do oxygeneo he subtrahida para o feto.

2. Todos os doentes de etiguidade, particularmente os de huma compleição florida, e pelle quente, empiorão quando respirão huma atmosphaera pura, o que parece depender da maior quantidade de oxygeneo.

3. Muitas pessoas tem melhorado unicamente por se haverem mudado para sitios apaulados em razão de que nelles ha menos oxygeneo.

4. Dizem que os thísicos tem melhorado vivendo entre o gado vacum, e respirando o ar que assim se acha com menos quantidade do oxygeneo, e maior porção de hydrogneo carbonatado.

5. Os que trabalham em fazer cordas de tripa, bem que vivão em huma atmosphaera impregnada de effluvia animaes que ja passarão pela decomposição não padecem etiguidade. He para admirar o facto de que a decomposição da materia animal raras vezes produza doença, quando a dos vegetaes quasi sempre a faz.

A Abstinencia he hum dos atonicos dos mais poderosos: quando a sangria e catharticos são indicados, também a abstinencia se deve juntar como auxilio poderoso. Em todas as pyrexias e phlegmasias he necessaria huma rigida observancia do regime antiphlogistico, isto he, abstinencia de toda a qualidade de comida, de bebidas que tenham propriedades estimulantes.



# CLASSE III.

*Dos remedios vermifugos, ou dos remedios que matão, e expellem as lombrigas do corpo humano.*

Muitos dos remedios vermifugos pertencem a outras Classes, norem poucos são exclusivamente vermifugos: muitos dellles são tónicos, e muitos purgantes drásticos. A acção dos vermifugos he diversa, alguns obrão mechanicamente, alguns como veneno para as lombrigas, e outros para pôr toda a construcção, e particularmente os intestinos em estado opposto à geração das lombrigas.

Quasi não ha parte alguma do corpo em que se não tenham achado lombrigas ou pequenos animaes, v.g. nas sinuses frontaes, ventriculos do cerebro, do abdomeo, do pelvis dos rins, da bexiga, e outras partes. O canal intestinal he o mais perseguido dellas, onde causão muito damno, e que pode ser conjecturado pela violencia dos symptomas, que muitas vezes produzem rigores e teníveis effeitos no que respeita à saude do enfermo.

As lombrigas são de quatro especies:

1.<sup>a</sup> Ascaride, que são as mais pequenas, brancas, e semelhantes a huma linha de cozer na grossura. Encontrão-se principalmente no recto.

2.<sup>a</sup> As chamadas propriamente lombrigas, são muito semelhantes em feitio as minhocas, bem que de cor branca e mais compridas. Ellas se encontrão em todo o canal intestinal e frequentemente sobem do estomago pelo esophago, e sahem pela bocca.

3.<sup>a</sup> A Tenia que se divide em larga e solitaria: estas são as mais cruels e mais difficéis de curar.

4.<sup>a</sup> A Trichuris, esta especie foi descuberta por Ruëderer de Gottingen, em 1762. São de meia pollegada a 2.<sup>as</sup> hũa de comprimento, e seu feitio he quasi triangular. De ordinario estão encerradas no recto e intestinos grandes.

Todas as pessoas que padecem de lombrigas devem evitar os vegetaes especialmente crus por que este alimento as nutre mais que o alimento animal. Porisso



os alkalis são proveitosos, pois destroem a acidez das primeiras vias, a qual sustenta as lombrigas.

### Da Semente de Alexandria.

*Artemisia Contra Linn. Syngen. Polygam. superfl.*

Esta semente reduzida a pó não he poderoso anthelmintico. A sua dose he de grãos dez até hum escropulo, por trez vezes no dia. O seu cosimento he util na cholica verminosa em forma de eneina, elle subitamente faz parar a dôr, e frequentemente expelle as lombrigas.

R. .... Semente de Alexandria      onça huma.  
                  Agua                                        libra huma e meia.

Ferva-se até ficar em libra huma.

### Do Feto Maxo. Raiz

*Polypodium Filix mas Linn. Cryptog Filix.*

He hum remedio muito excellente, e quasi infalivel na tenia. A sua dose he de duas até trez oitavas, em jejum, depois hum purgante drastico.

R.—— Jalapa em pó                                        escropulo hum.  
                  Calomelanos                                        grãos seis.

Misture-se para huma dose,

Esta raiz pôde dar-se em doses de huma oitava de quatro a quatro horas, e depois de seis ou de sete doses, dar o purgante acima.

Destes pós podemos dar huma oitava ás crianças.

Se a lombriga não sahir inteira, não devemos repetir o purgante senão passado algum tempo, e quando os symptomas sobrevierem até certo grão porque debelica muito: mas se houver sahido inteira, podemos estar seguros da cura.

### Da *Spigelia* Raiz.

*Spigelia Marilandica* Linn. *Pentlandr. Monogyn.*

A raiz em pô dá se como vermifugo na dose de meia oitava até huma por trez vezes no dia. Ou

R. — — Raiz de <i>Spigelia</i>	onça huma e meia.
Agua	libra huma e meia

Faça cozimento até libra huma para tomar huma onça até onça huma e meia.

### Da *Nox vomica*.

Vejão-se os Tonicos.

He hum poderoso anthelmintico, e em casos obstinados de lombrigas he o melhor remedio conhecido.

A sua dose he de grãos dois até grãos cinco,

### Da *Senne*. Folhas.

Vejão-se Catharticos.

Obra como veneno nas lombrigas, mas não para as ascarides, ou tenia.

R. — — Infusão de <i>Senne</i>	onças duas,
Tintura de <i>Senne</i>	oitavas duas.

Misture para tomar no dia seguinte pela manhã

### Do *Estanho*.

Tem ha muito tempo merecido grandes elogios como poderoso anthelmintico. A sua limalha muito fina he preferivel ao seu pô, na dose de hum escropulo até meia oitava. Todos os Catharticos são anthelminticos, e são proveitosos se as forças lhes correspondem, v. g. *Muriato de Mercurio doce*, *Jalapa*, *Escamonea*, *Gomma Cat-ta*, etc.

R.— Muriato de Mercurio doce grãos seis  
Ao receber.

R.— Oleo de Ricino                      onça huma até  
                                onça huma e meia.  
Para tomar no dia seguinte pela manhã.

*Da Electricidade.*

Ha poucos annos tem-se recommendado em casos de tenia obstinada applicando choques vigorosos ao ventre.

*Do Mercurio,*

Ainda que alguns o tem recommendado fazendo-o ferver em agua, he totalmente inerte.

*Do Muriato de Barytes.*

Tem sido util em casos de lombrigas obstinados dando gottas trez por trez vezes no dia, e passados trez ou quatro dias hum purgante.

### *Dos Tonicos.*

Todos os tónicos são excellentes anthelminticos, particularmente o ferro; e de todas as preparações a melhor, he a limalha muito fina.

R.— Limalha de ferro                      oitavas duas.  
 Conserva de casca de Laranja      onça huma e meia

Misture, e forme electuario para tomar huma colherinha por trez vezes no dia, dando ao mesmo tempo Calomelanos, e oleo de Ricino de dias a dias.

## CLASSE IV.

*Dos Antacidos , remedios que corrigem os acidos nas primeiras vias.*

Quando o estomago se acha em estado de torpor, não se digestão os vegetaes, mas passam a decompor-se, formando hum acido que causa cardialgia, e arrotos acidos. Tambem se pôde inferir que o acido he formado ou secretado pelo estomago, quando o doente só tem vivido de alimento animal e agua. Porem devemos distinguir estes dois casos: primeiro, quando em consequencia de dyspepsia se gera hum acido pelo alimento mal digestado, e este acido he facil de curar em proporção do outro, o qual exige se remova immediatamente a cardialgia por meio de antacidos, e que se den os tonicos, isto he, Carbonato calcareo, Sabao alkalino, Esponja queimada, amargos e aloeticos; segundo, quando o acido he produzido pelo mesmo estomago, então os cretaceos não podem dar mais que hum alivio momentaneo, e se fazem necessarios os sulfuretos alkalinos, juntos a algum vegetal narcotico particularmente a Clcuta.

*Da Agua de Cal.*

He ha muito tempo recommendada na dyspepsia, particularmente na acidez do estomago.

*Do Carbonato Calcareo.*

Usa-se para corrigir os acidos do estomago e intestinos, ou para suspender a diarrhea. As crianças de peito sempre padecem acidez de primeiras vias, o que só lhes he nocivo, quando seja com excesso, as fezes são coaguladas, tem hum cheiro azedo, ou constão de materia mucosa combinada com leite coagulado, e algumas vezes são sanguinosas, então o Carbonato calcareo he o melhor remedio: Com tudo elle nada convem para curar mera cardialgia no estomago, a nao ser combinado com a

Magnezia alba, e pós aromaticos, porem he o melhor remedio para curar a acidez nos intestinos, pois esticula os absorventes dos intestinos, e tem effeitos de astringente. Se a diarrhea for rigorosa nas crianças deve juntar-se-lhe xarope de papoulas brancas, e nos adultos tintura de Opio.

A mistura cretacea com Rhuibarbo he excellente para a diarrhea nas crianças.

### *Do Carbonato de Magnezia.*

He o melhor remedio na Cardealgia á excepção da ammonia, pois combinada com o acido do estomago, fórma hum sal purgante em quanto o Carbonato calcareo fórma hum sal indessolúvel, e destroe o appetite em poucas horas.

R. — Magnesia Alba. . . . . oitavas duas.  
Carbonato calcareo com Opio oitavas huma.  
Mucilagem de Gomma Arabia oitavas duas.  
Agua pura . . . . . onças cinco e meia.

Misture para tomar duas colheres, segundo as circumstancias.

### *Da Magnezia. Calcinada.*

He impropria, quando no estomago não encontra acidos, pois produz hum effeito caustico, absorve o acido carbonico do estomago, e frequentemente destroe o appetite, sendo por muito tempo continuada. Se houver dureza de ventre junte se-lhe Rhuibarbo.

### *Da Ponta de Veados.*

O cosimento das raspas he excellente na diarrhea, quando a não queremos fazer parar de repente.

### *Dos Alkalis.*

O Alkali vegetal e mineral, ambos são proveitosos na acidez do estomago; sendo sobre saturados de



Acido carbonico são proveitosos na acidez habitual. Porém de todos os Alkalis, o volatil he melhor; pois que corrige a acidez estimula o estomago, v. g. licor volatil de ponta de veado, Espirito de ammonia composto.

R. — Agua de kali puro gottas cinco.  
 Infusão de Genciana }  
 Agua destillada } a oitavas seis  
 Tintura de Card. comp. oitava huma.  
 Misture, e forme bebida para beber por trez vezes no dia.

### Do Sabão.

He recommendado na acidez de primeiras vias. Nas crianças elle tende a destruir o appetite, e funcções do estomago. Quando houver de dar-se, necessita ser combinado com Rhuibarbo, e brandos amargos.

### Da Espenja Calcínada.

Raras vezes se usa como simples antacido, tem bastante uso na broconcelle.

R. — Esponja calcínada escropulo hum.  
 até oitava meia.  
 Xarope simples q. b.

Misture, e forme hum bolo para metter debaixo da lingua ao recolher, a fim de que pela noite adiante se vá derretendo.

### Do Azebre.

He muito bom, quando a acidez de primeiras vias he acompanhada de dureza de ventre.

### Do Opio.

O Opio corrige a secreção habitual dos acidos na dose da quarta parte de hum grão por trez vezes no

dia, ou depois de comer. Elle produz dureza de ventre a qual se deve evitar com o Azebre.

### *Do Ferro.*

A limalha de ferro he excellente com outros remedios.

Os banhos frios são com especialidade proveitosos em atonia do estomago, porém nunca devem usar-se quando se julgue haverem affecções organicas do estomago. As fricções tambem são muito boas.

## DOS REMEDIOS TOPICOS.

### *Dos Sternutatorios*

Os Remedios sternutatorios são os que applicados à membrana mucosa do nariz, lhe augmentão a descarga ou fazem espirrar. São varios, e a maior parte delles usada para outros intentos.

São recommendados na cura da ophthalmia chronica, cephalaea nervosa, e falta de vista por torpencia dos nervos opticos. Os sternutatorios não devem ter lugar, quando se considere que a dôr de cabeça provém de repleção de sangue, ou de tumor na cabeça. Em casos hystericos hão de produzir hum paroxismo hysterico, assim como outras irritações. Os pós de Asaro compostos são a melhor preparação. Os seguintes igualmente podem contar-se como poderosos errhinos: *Asaro europeo*, *Calendula officinal*, *Convallaria*, *Oregãos*, *Mangerona*, *Mostarda*, *Eleboro branco e negro*, *Salva*, *Sulfato de Mercurio amarello*, *Tabaco* etc. Muitas destas substancias foram ja descriptas, e as outras são muito triviaes para as descrevermos aqui.

### *Dos Rubefacientes.*

São os remedios que applicados à pelle excitão uma leve inflammacão com tal ou qual vermelhidão. Elles são estimulantes directos para os vasos da pelle.

### *Da Fricção.*

Pode executar-se a fricção com a palma da mão, com o dorso da mão, ou com uma escova. A fricção com a mão é talvez a melhor ainda que desprezala. A fricção é particularmente recommendavel na arthropn-osis iniciada e na rachitis.

Os effeitos da fricção s. de todos os rubefacientes s.ão: 1.<sup>o</sup> Determinar o sangue para a pelle 2.<sup>o</sup> Aliviar a dô: do torpor. 3.<sup>o</sup> Para dar tom e força ao systema. 4.<sup>o</sup> Para excitar os absorventes a maior acção.

Ella he proveitosa em molestias do peito, disposição para a colica; arthrodynia; gotta quando não ha in-convalesc. erupções, debilidade geral; e em quasi todas as neurosis. He hum dos meliores preservativos.

### *Das Cantharidas.*

As Cantharidas quidas ao emplasto de Meliloto na dose de meia oitava para meia onça de emplasto operão como rubefacientes.

R.	Linimento de Sabão	onça huma.
	Tintura de Cantharidas	onça meia.
	Ammoniaco	oitavas trez.
	Misture-se.	

### *Do Linimento de Ammoniaco.*

He proveitoso na arthrodynia.

### *Do Unguento de Tartrito de Potassa Antimoniado, ou Solução de Antimonio Tartarizado.*

He proprio para mitigar as dores por torpencia, v. g. na sciatica, e arthrodynia, e inflammções internas, determinando o movimento do sangue externamente, como na synanche tracheal e toussillar, gastrites e enterites; para mitigar as dores chamadas finas, as dores nervosas, hemiparalia, cravo hysterico. Ob.a como antipasmodico na colica, asthma, e tosse convulsa.



o applicado a cada lado do nariz tem curado a aphonía por paralyia.

### *Do Borato de Soda.*

He util nas affecções, ulcêras da bocca, e cutaneas que alastrão. Em tôra de gargarejo ou de banho he util no pyalismo, excitado pelo Mercúrio.

R. — Borato de Soda oitavas trez.  
Xaropé, ou Mel rosado onça humia.  
Misture.

### *Do Banho frio.*

O Banho frio he hum poderoso tónico, porém sujeito ao abuzo e damno, como os outros remédios desta natureza. A primeira acção do frio he produzir huma repentina contractura nos vasos da pelle, e determinar a massa do sangue das partes externas para as internas; por isso se a pessoa tem disposição para hemorrbagias internas, como hemoptisis e hematemesis ou apoplexia, a primeira applicação de frio á pelle pôde verificar estas molestias. Por conseguinte os Banhos frios nada convem na tísica pulmonar, ou por tuberculos, ou na hemoptisis, pois que assim precipitam a molestia. As pessoas debilitadas a certo ponto por molestia não podem supportar a continuação dos banhos frios: a sua utilidade provem do seu modo de obrar secundario, elles augmentão a irritabilidade dos vasos da pelle, e são estimulados a obrar com maior força, o equilibrio do sangue he restaurado na superficie externa, e ali se conserva, segue-se-lhe hum certo grão de calor. Da mesma sorte não convem o banho frio ás pessoas dispostas a affecções gtozas.

Por banho frio entendemos aquelle, cuja temperatura he abaixo de 85, o qual em seu modo de obrar, sempre prova de mais ou menos tónicos. Em muitos casos em que o doente não pôde, por sua muita debilidade, supportar hum banho no grão de 40, experimentará optimos effeitos no banho a 65: por isso o rheumatismo alcança beneficio em tudo o que fortalece o systema, e particularmente a pelle.



O Banho de 90. ate 100, he hum banho tepido, e que não estimula muito os vasos da pelle, mas o sangue he determinado para ella. He proveitoso na inflamação chronica das partes internas, no rheumatismo agudo, na gotta em quanto dura o paroxismo, nos catarrhos antigos, na enterites, e sobre tudo, na hysteria, hypochondria, e em muitas molestias paoricas.

Cada gráo acima de 100 he banho quente, elle se n-pre estimula a pelle ao principio, mas depois causa estado de relaxação, e profuso suor. He proveitoso na nephritis, gastrites, enteritos, peritonites, e outras phlegmasias.

Applicados particularmente, v. g., aos pes são proveitosos na gotta em quanto existe o paroxismo; para determinar da cabeça nas dores da mesma, nas constipações, nas inflamações por aperto da cabeça, v. g. synanche tonsillar; e para induzir a catamenia suspendida.

### *Dos Alimentos.*

Alimentos são as substancias que admitidas no estomago, se convertem nos solidos, e liquidos necessarios a nossa existencia por meio de hum processo chamado Assimilação, reparando assim a continua perda que padece o corpo humano pela acção que as partes executão, humas sobre outras, por declinação, ou por decomposição. Os alimentos para serem assimilados devem padeecer certas alterações, entrando no estomago; sobre elles obra a força muscular desta viscera, e igualmente o succo gastrico, e he o que se chama Primeira Digestão. Executada esta, o alimento he impellido pelo pyloro para o duodeno, onde se mistura com a billa, e succo pancreatico, e por estes meios que se chamão Segunda Digestão, elle se converte em huma substancia que se denomina Chymo. Este he então impellido para diante pelo movimento peristaltico dos intestinos. Na superficie interior dos intestinos, especialmente do duodeno, jejunum, e ilio, ha huma fileira de vasos chamados lacteos, cujos orificios absorvem as partes nutrientes do alimento assim

preparado, e as conduzem a hum receptaculo commum, e he ultimamente levado pelo ducto thoracico para o sangue, no angulo entre a jugular interna, e veia subclavia. na esquerda, completando assim a assimilação; em quanto às partes inuteis obrando sobre ellas o movimento peristaltico são finalmente expellidas pelo anus com o nome de fezes.

Os alimentos são extrahidos do reino animal e vegetal; elles em quanto a quantidade de nutrição nellas contida, e em quanto ao número de suas propriedades estimulantes differem muito.

O alimento animal contem mais propriedades estimulantes que o vegetal, nelle se comprehendem os animaes, passaros, e peixes de carne vermelha ou escura, ovos, leite, e animaes de carne branca, taes como peixes, e amphibios. A carne negra ou vermelha he a mais nutriente, e estimulante, logo depois devemos contar o marisco, e peixe de pelle, e sem escama, a carne de animaes novos, como vitella, cordeiro, etc.

Os vegetaes por maceração, reduzem-se a amido ou gomma, a materia glutinosa, ou vegeto-animal, em mucilagem ou muco, atêm da parenchyma que depois fica. Suppozeraõ alguns que a proporção do nutrimento de materia farinacea era conforme à quantidade do gluten vegeto-animal; outros conforme a quantidade de gomma a qual he a base desta materia, e he insolúvel em agua fria. mas fórma huma especie de mucilagem em agua quente. Nenhuma materia vegetal produz tanto gluten como o trigo.

A cevada, segundo pensão muitos, he alimento melhor que o trigo, por que ella consolida maior porção de agua fervendo-se por largo tempo: havendo-se estabelecido como regra geral que a substancia que consolida maior porção de agua he a mais nutriente, e que tanto mais saborosa he, tanto mais he nutritiva.

Os vegetaes cozidos são mais nutrientes que em crus, igualmente são mais proveitosos comendo-se quentes do que frios. A farinha de milho contem mais aasucar e menos gomma que o trigo, e mais gluten que out. o qual quer grão excepto o trigo.

As Batatas são o alimento mais precioso abaixo do trigo, aveia, e cevada. A Cinoura branca ou amarella he mais nutriente que a mesma batata. O Assucar he de todos os vegetaes o mais nutriente, entrando nesta classe o Mel, e o Manná; este porém não pôde usar-se como alimento em razão de sua qualidade purgante, e do sabor particular que tem. Todas as substancias que podem fazer-se doces, ficam mais nutrientes que dantes erão.

Os Adubos causão certos estímulos de que o homem muito gosta, e deseja repetir, e de certo são muito uteis sendo em seus justos limites. Entre estes tem o primeiro lugar o sal, a elle se costumão as crianças facilmente, e usando-se moderadamente he muito saudavel, bem que não seja nutriente, e a maior parte del- le sabe fóra pela urina. Elle estimula o estomago e promove a secreção do suco gastrico, e o estomago hu- ma vez a elle costumado, não pôde fazer a digestão sem elle, como tambem pelo que pertence aos mais adu- bos. Nos climas quentes, onde se faz mais uso do ali- mento vegetal tambem se usão mais os adubos que na Europa.

O Vinagre ou Acido acetico tambem he muito usa- do, elle contem algumas particulas nutritivas, mas serve especialmente para excitar o appetite, para refres- car o alimento, e fazê-lo mais gostoso. Os Aromaticos, como cravo, canella, etc; certas sementes como car- vi, alcarabia, herba doce, etc. As raizes acres, co- mo rabano de cavalo, cebolas clalotas, etc-, todas es- tas augmentão a secreção da saliva e suco gastrico, im- pedem a flatulencia, aquecem o estomago, e o fortalecem.

Usamos de outras substancias como estimulantes pa- ra o estomago, ainda que propriamente não pos-ão cha- mar-se adubos. 1.<sup>o</sup> O Assucar he usado como ali- mento e remedio, e como substancia preservativa da putre- facção. Elle he offensivo aos dentes porque demorando- se sobre elles combina-se com o oxygenio, e forma a- cido oxalico, o qual tem grande affinidade com os dentes. 2.<sup>o</sup> Licores vinhosos, cujo uso faz digerir maior quantidade de alimento estimulando o estomago.

que por isso tem acção mais poderosa. Dizem alguns que elles endurecem o alimento e o coagulam, e se isto he assim, resta a dũvida, se o alimento coagulado he de mais difficil digestão! Elles estimulam o systema sanguineo e chyliifero, e quando seu uso he immoderado fazem-se damnosos exaurindo a irritabilidade. Vejaõ-se Estimulantes Ordem I.

3.º O Alkool segundo as substancias de que he extrahido, ou os adjuntos que se lhe unem differe em sabor, e se observa com os diversos nomes de aguardente, cachaça, genebra, etc. Elle he mais violento que o vinho, e produz todos os seus máos effeitos com mais rapidez: sendo bem diluido, e usado com moderação pôde ser util. Vejaõ-se Estimulantes Ordem. 1.

O Xà, o Caffè, e o Chocolate, são bebidas innocentes, recreantes, e muito uteis sendo moderadas.

Tambem concorre para a boa digestão conservar o corpo em reponso depois da comida, isto nos ensinaõ os animaes, os quaes se deitão depois de haverem comido. O exercicio deve fazer-se antes de jantar. A posição mais propria para a boa digestão he o estar sentado em assento comodo. He impropria a situação horizontal pois que de algum modo impede a descida do alimento, causa oppressão e largo somno.

Quando o estomago se acha debilitado usão-se outros meios para o corroborar, e facilitar a digestão, v. g. os amargos, os alkalis, a agua impregnada de gaz acido carbonico, etc., depois da comida, como tambem usando de especiarias, diluindo a comida, ou reduzindo-a a pequenas particulas. Tambem ajuda muito a boa digestão o tomar pequenas quantidades de alimento de cada vez, o que nunca exaure a excitabilidade do estomago e que especialmente se faz necessario a estomagos fracos e debeis. O meio menos conveniente he o estimular o estomago com licores destillados, ou fèrmentados, pois ainda que ao presente mostrem seu proveito, com tudo passados tempos produzem effeitos pessimos, e que muito damnão o estomago.



Tam sido questão interessante sobre qual seja a parte em que resida a matéria nutriente do alimento. O Conde Rumford assesta que a agua he a unica materia alimentar, mas parece coisa fóra de razão, o crer que a agua seja a unica materia assimilada. He certo que nella encontramos o oxygenio e o hydrogenio, porém não encontramos o carboneo, ou azote que se acha nas outras. Por ventura a agua; especialmente sendo destilada não he assimilada em parte realmente! Prova isto mesmo a observação de que as substancias que consolidão maior porção de agua, são as mais nutrientes como Arroz, etc.

Dizem outros que as particulas nutrientes residem na parte saccharinã, e isto parece ser mais provavel, pois he bem notório quam nutriente seja o assucar, para o que cõcorro sabermos que o chylo e o sangue são doces. O mesmo se observa na cevada e feno, que passando por hum certo grão de fermentação, desenvolve a parte saccharina, e então se achão ser mais nutrientes para os animaes. O Azeite tambem he muito nutritivo. He sabido pela experiencia que huma pessoa pôde sustentar-se mais tempo com o óleo ou gordura dos animaes que com outra qualquer substancia. Mas ainda que seja muito conveniente conhecer qual seja a parte realmente nutritiva do alimento, não temos os conhecimentos necessarios para decidir a questão.

Na pyrexia a anorexia que a acompanha indica ser proprio o alimento animal. Em todas as molestias agudas não se deve dar alimento algum até que a lingua se ache limpa, o pulso natural, e torne a vir o appetite ou vontade de comer. Com tudo, na febre escarlatina pôde dár-se sustento animal desde o principio depois de haver-se dado hum emetico, e os doentes que assim o tomarem hão de melhorar mais depressa. Nas phlegmasias asthenicas ou hemorragias que são meramente passivas, e sem que as acompanhe febre, o alimento que augmenta as forças ha de tender a diminuir a molestia e por isso he proprio o alimento animal. Em molestias chronicas, cachexia, neurosis, e molestias espasmódicas he permitido o alimento animal, não sendo muito



adubado, e em quantidade demasiada. Por isso na hysteria e chorea, o doente pôde usar de alimento animal, mas não deve fartar a vontade, e bade conservar o ventre liberto. Quando no estomago haja acidez, dyspepsia com cardialgia, o doente deve usar só de alimento animal; hum pouco de pão muitas vezes causa violenta cardialgia.

O sustento vegetal só he proprio no principio das molestias agudas. He recommendado na gotta e thísica pulmonar, mas só he proprio em alguns casos. Podemos conhecer se o sustento vegetal se conforma com o doente gottoso; aquelle que tem grandes forças de digestão, e não padece dyspepsia, antes do paroxismo deve sustentar-se de leite e vegetaes, e não beber liquidos espirituosos; porem o que se achar debilitado, e padeça cardialgia, tendo-lhe sobrevindo gotta, com excesso etc., o sustento vegetal lhe fará sobrevir a gotta retrograda. No principio da thísica pulmonar a dieta de leite e vegetaes com igual temperatura muitas vezes impede a suppuração dos tuberculos.

# TABOAS

DA

## MATERIA MEDICA,

METHEODICAMENTE SEGUIDAS

DE

SELECTAS, ORIGINAES, E COPIOSAS FORMULAS.

— \* —

### CLASSE 1.<sup>a</sup>

#### *Emeticos.*

##### 1. *Animaes.*

1. Muriato de Ammonia-Edinburgense.  
Sal ammoniaco Londinense Dublinense.
- a Agua de Carbonato de Ammonia- E.      } dose
- Agua de Ammonia L.      } oit- 1.
- Licor de Alkali volatil aquoso brando D.      } até 2,

##### 2. *Vegetaes.*

2. Macella. Antemis nobilis E.  
Chamomilla L. D. E. Flores.  
Para infusão de oitavas 2 até 4 para meia libra de  
agua.
3. Asaro- E L D. Folhas.  
Seus pös de oitava meia até 1.
4. Cardo Santo. L. Folhas.  
Para infusão ou coziemento.
5. Ipecacuanba L. E. D. Raiz.  
Seus pös de grãos 15 até 25.
- a Seu vinho de onça 1 até 2.
- 6 Nicotiana Tabaco- E. L. Folhas.  
Fumo cataplasma.

- 6 Oliveira. E. L. D.  
O oleo expresso do fructo,  
Contraveneno.
- 8 Scilla maritima, Cebola alba E. L. D. Raiz,  
Seus pós de grãos 4 até 10.
- a Do seu Vinagre. E. L. D. de onça meia até onça 1  
Sua tintura. L. de oitava 1 até 2.
- 9 Mostarda E. L. D. Semente.  
Seus pós misturados em agua até oitava 1.

### 3 Mineraes.

- 10 Sulfato de Cobre E.  
Cobre vitriolado. L. D. Solução de grãos 2. até 3.
- 11 Sulfureto de Antimonio. E.  
Antimonio em. L. D.
- a Oxyda de Antimonio com Euxofre vitrificado. E.  
Antimonio vitrificado. L.
- b Vinho de Antimonio. L.
- c Tartrito de Antimonio E.  
Antimonio tartarizado. L. } de grão 1 até 4 para  
Tartrato subido. D. } doses repetidas.
- d. Vinho de tartrito de Antimonio. E de onça meia  
até onça 1 e meia.  
d. de Antimonio tartarizado. L.  
d. de Tartrato subido. D. oitavas 2 até 6.
- 13 Zinco. E.
- a Sulfato de Zinco E. } de grãos 10  
Zinco vitriolado. L. D. } a e 30.

### FORMULAS.

#### 1. Pós de Ipecacuanha com Antimonio tartarizado

R. — Ipecacuanha em 16 esecropulo hum.  
Antimonio tartarizado grão hum.

Misture, e forme pós para se tomarem de tarde, ou

perto do paroxysmo da febre.

Nas Febres, Catarrho, Dysenteria, Escarlatina anginosa, Narcotismo, Dyspepsia.

**2. Vinho de Ipecacuanha com Antimonio tartarizado.**

R.— Vinho de Ipecacuanha  
Vinho de Antimonio tartarizado

onça huma.  
oitavas duas.

Misture, e forme bebida.

**3. Pos de Asaro compostos.**

R.— Pds de Asaro compostos escropulos dois  
Antimonio tartarizado

grão meio.

Misture como acima.

**4. Cataplasma de Tabaco.**

R.— Folhas de Tabaco.  
Agua fervendo

onça huma.  
q. b.

Pize-se para cataplasma; a qual se ha de pôr sobre o estomago nos casos em que pela bocca se não podem dar os emeticos.

**5. Bolo de Scilla.**

R.— Pds de Scilla maritima  
Xarope commun

grãos seis  
q. b.

Forme Bolo para se tomar pela manhã ua Hydropsia.

**6. Solução de Antimonio tartarizado.**

R.— Antimonio tartarizado  
Agua destillada

grãos quatro.  
onças duas.

Misture, e forme solução para tomar huma colher

de meza de quarto a quarto de hora até promover o vômito

Nas Febres, Catarrho, Dysenteria, Tosse convulsa.

7 Bolo de Sulfato de Zinco.

<b>R.....</b>	Sulfato de Zinco	escropulo hum
	Conserva de Rosas	q. b

Forme bolo para se tomar imediatamente como  
contraveneno.

### 8. Infusão de Ipecacuanha.

R..... Ipecacuanha contusa	oitava huma e meia.
Tartrito de Potassa	oitava huma.
Agua servendo	onças quatro.

Macere se por huma hora, e' depois coe-se para se dar huma colher de meza, ou onça meia de meia a meia hora, até haver vomito.

## CLASSE II.

## Expectorantes

### 1. *Vegetues.*

- 5 Ipecacuanha.  $\frac{1}{2}$  de grão - 1 de trez, ou de quatro a quatro horas.  
Na Peripneumonia notha, Asthma.  
6 Nicotiana Tabaco. Fumo.  
8 Scilla maritima  
a Vinagre de Scilla de oitavas 2 até 4.  
b Seu Xarope. E.  
c Seu Oxy-mel. L. D.  
d Sua Timura. L. de gottas 10 até oitava 1.  
e Suas pillulas. L. D. } de grãos 10 até 15,  
ditas E.  
f Sua Conserva, L. de grãos 30 até 40.  
13 Alhos.



Da raiz recente de oitava 1. até 2.

a Seu Xarope. L. para tomar huma colher logo depois de feito.

14 Ammoniaco. Gomma resina.

Suas pillulas - de grãos 10. até 20 para se repetir a dose.

a Seu Leite ou Emulção . L. de onça 1 até 2. para se repetir a dose.

15 Jarro. Raiz recente.

a Sua Conserva, L. de oitava meia até 1.

16 Colchico. Raiz recente.

a Seu Xarope . E. de oitavas 2 até onça 1.

b Seu Oxymel L. o mesmo.

17 Assafetida. Gomma resina.

Suas Pillulas de grãos 10 até 15 para repetir a dose

a Sua Emulção L. de onça 1 até 2.

Para repetir a dose.

18, Hysopo Off. Herva.

19 Marroios vulgares. Folhas.

20 Myrra. Gomina resina.

Suas Pillulas de grãos 10 até oitava meia.

21. Herva doce. Semente.

a. Seu Oleo volatil-E. L. de gottas 2 até 6.

22. Poligula Senega. E. L. D. Raiz.

a Seu cozimento. E. de onça 1 até 1 e meia.

Na Synanche tracheal , Pneumonia.

23 Beijoim.

a Acido benjoico-E.

Sal do Beijoim D. } de grão 1 até 2 dose

Flores de Beijoim L. } repetida.

b Tintura de Beijoim composta. L. de gottas 15 até 30.

24. Alcool.

Espinto de vinho rectificado L. D.

a Ether sulfurico. E.

d.º vitriolico L. D. em fórma de vapor na As-  
thma.

## 2. Mineraes.

### 11. Sulfureto de Antimonio.

c Tartrito de Antimonio - de hum terço de grão até grão meio gradualmente.

d Seu vinho. E. de oitava 1 até 2.

d.º de Antimonio de tartaro L. D. de gottas 30 até oitava 1.

e Sulfureto de Antimonio precipitado E.

Sulfur. de Antimon. precipit. L. } de grãos 3  
d.º de Antimonio vermelho. D. } até 5.

### 35. Enxofre sublimado E.

Flor de Enxofre. L. D.

a Enxofre sublimado lavado. E.

Flor de Enxofre lavado - L. D. de grãos 15 até oitava meia.

b Oleo de Enxofre L. D. E. de gottas 10 até 20.

c Petroleo sulfurado. L.

d Trociscos de Enxofre L.

Na Asthmá.

## FORMULAS.

### 9. Pós de Ipecacuanha.

R, Ipecacuanha em pó  
Assucar

grão hum.  
oitava meia.

Misture-se para tomar de duas a duas, ou de trez a trez horas.

Na Peripneumonia notha, Asthma.

### 10. Pós de Scylla.

R. Scylla maritima em pó  
Assucar purificado

grãos oito.  
oitava huma.

Misture, e divida em 3 ou 4 papeis para tomar por 2 ou 3 vezes no dia.

### 11 Pós de Scylla com Camphora.

R. Scylla desecada  
Camphora

grãos oito.  
escrop. hum.

Açúcar purificado

oitav. huma.

Triture-se, e se reduza a pó dividindo-se em quatro papéis, para tomar por duas ou três vezes no dia, em cozimento de coveda ou de avea.

12. *Emulção de Gomma Ammoniaco composta.*

R.	Gomma resina Ammoniaco . . . . .	oitava huma e meia até duas
	Agua destillada de Poejos	onças seis.
Dissolva, e junte	Xarope balsamico	onça huma.
	Tiptura de Scilla	} anã oitav. trez.
	d. <sup>a</sup> de Opio camphorado	

Para se tomarem trez colheres de sopa de quatro a quatro horas.

Na Peripneumonia, Pneumonia, e Asthma.

13. *A mesma Formula com Asafetida em lugar de Ammonia.*

14. *Pó de Myrrha.*

R.	Myrrha em pó	oitava huma.
	Açúcar purificado	onça meia.

Misture para tomar por trez vezes no dia. Na thisica pulmonar.

15. *Mistura de Beijoim composta.*

R.	Tintura de Beijoim composta	oitavas duas
	Mel despumado	onça meia.
Ou quando este não convenha :	Xarope balsamico.	onça huma.
Triture-se tudo, e junto-se-lhe	Vinho de Antimonio tartarizado	onça meia.
	Agua de Canella	onças seis.

Misture-se para tomar trez colheres de meza de quatro a quatro horas.

No Catarrho.

16 *Pós de Oxyda d' Antimonio hydro sulfurado rubro fusco com greda.*

R. ——— Oxyda de Antimonio hydro sulfurado  
Carbonato de Cal grãos seis.  
escrop. meio.

Formem-se pós para duas doses.  
Na Asthma..

17. *Pillulas de Opio compostas.*

R. ——— Opio grãos quatro  
Ipecacuanha em pó grãos doze  
Ou Tártrito de Antimonio grãos quatro.

Misture para formar massa para doze pillulas de que se devem tomar trez vezes no dia, e humna à noite, quando haja insomnia, ou a tosse seja muito importuna.

18 *Pillulas de Tabaco.*

R. ——— Extracto de Tabaco, Necotiana grãos doze.  
Alcaçuz em pó escrop. hum.  
Xarope commun q. b.

Para formar pillulas N<sup>o</sup> 20, de que se hão de tomar de uma até trez no dia.

Na Tísica pulmonar.

19 *Pillulas de Meimendro com Ipecacuanha.*

R. Como espesso de Meimendro negro  
Ipecacuanha em pó aná grãos doze.

Misture, e forme massa para dividir em doze pillulas como acima.

20 *Lambedor de Oxydel de Scylla.*

R. Oxydel de Scylla }  
 Xarope de Althea } anã grãos de sebo  
 Mucil. de Gôm. Arab.

Para tomar huma colherinha por vezes no dia.

21. *Mistura de Scylla com Antimonio tartarizado.*

R. Antimonio tartarizado } grãos dois.  
 Agua destillada de Poejos } onças seta.  
 Oxydel de Scylla } onça huma

Misture para tomar a oitava parte de quatro a quatro horas.

22. *Mistura de Scylla com Nitrato de Potassa.*

R. Oxydel de Scylla } oitavas seis  
 Cozimento de cevada composto } onças sete.  
 Nitrato de Potassa } oitava meia.

Misture para tomar trez colheres de meza por varias vezes no fim da Peripneumonia.

23. *Gottas de Tintura de Opio com vinho de Antimonio.*

R. Tintura de Opio } gotas trez.  
 Vinho de Antimonio tartarizado } gotas seis.

Misture para tomar gottas 30 por duas ou trez vezes no dia.

N. B. Na Classe dos Expectorantes devem igualmente contar-se Gaz oxigenio.

Ar vital de libras 3 ate 4 no dia, com 20 ate 40 libras de ar atmospherico.

Na Asthma.



Gaz hydrogenio.  
Ar inflammavel.  
Comaeacima.

CLASSE III.

Dos Diaphoreticos brandos.

Animaes.

- Alb. Moriato de Ammonia.
- Alca Carbonato de Ammonia liquido. gottas 50.
- Alca Carbonato de Ammoniac E. } de graos 5
- Ammonia preparada L. } até 10
- Alkali volatil brando D. }
- Alcool Ammoniacal E. }
- Espirito de Ammonia. L. } de gottas 30 até
- Alkali volatil D. } oitava. l.

2. Vegetaes.

- Macella.
- Infusão quente.
- Cardosanto.
- 12. Myrba. Pós.
- 23. Alhos
- 26. Acido acetozo. Vinagre. L. D.
- Soro de Leite coithado com Vinagre.
- No Rheumatismo.
- Acido acetozo destillado. E. D.
- Vinagre destillado. L. D.
- Acetato de Ammoniac liquido. E.
- Alkali volatil acetado L. } de oitavas 3 até 6.
- Espuuto de Mindereri. }
- Agua d' Ammonia acetada }
- 27. Bagaia. Raiz
- Seu Cozimento
- 28. Abrutano. Folhas
- Sua Infusão
- 29. Serpentaria. Raiz E. L. D.

Seus Pós - de grãos 20 até 30 , para tomar de seis a seis horas.

- a* Sua Tintura de oitavas 3 até 6 E.
- 30 Mezerião. Casca da Raiz E. L. D.  
Seus Pós - grão 1.
- a* Seu cozimento de onça 1 até 2 E.  
Nas molestias syphiliticas, e cutaneas.
- 31 Contra herva. Raiz. E. L. D.  
Seus Pós de grãos 30 até 40  
Para Cosimento na Synanche maligna.
- a* Seus Pós compostos de grãos 30 até 40 , de quatro a quatro horas.
- 32 Fumarja. Herva. D.  
Sua Infusão ad libitum.
- 33 Sasafráz. Raiz E. L. D.  
Sua Infusão.
- 34 Salva. Folhas. Infusão. E.
- 35 Sabugueiro. Bagas. E L D.  
*a* Como ginspeçado. L.
- 36 Salsa parrilha. Raiz E L D.  
*a* Seu Cozimento libra 1 por dia. E.
- b* d.º composto - o mesmo L. D.  
Nas molestias cutaneas.
- 37 Dulcamara. Hastes. E.  
Seu Cozimento.
- 38 Tartrito acidulo de Potassa. E.  
Cremor de Tartaro L. D.  
Dos Pós dissolvidos - escropulo 1 até 3 por vezes no dia.

### *Diaphoreticos fortes.*

#### *I. Animaes.*

- 39 Almiscar. E L, D.  
Em bebida de grãos 10 até 20.
- a* Sua Mistura de onça 1 até 2.

2 *Vegetaes.*

- 40 Aconito. Folhas. L. E. D.   
 Seus Pó de meio grão até 2.   
 a Seu Cmo espesso de grão meio até 2. E.   
 No 'Rheumatismo', Gotta, Paralysis.   
 41 Guaiaco. Gômina resina. E.   
 Seus Pó em Pillulas e emulção de grãos 10 até 30.   
 a Seu Cozimento composto E. libra meia até 1 por dia, nas molestias cutaneas.   
 b Sua Tintura de oitavas 2 até 4.   
 c d.<sup>a</sup> Volatil, ou Ammoniacal de oitava 1 até 3 E. L. D.   
 No Rheumatismo.   
 42 Camphora E. L. D.   
 Em holo ou mistura de grãos 5 até 20.   
 a Mistura camphorada de onças 2 até 4.   
 b Emulção camphorada de onça 1 até 3 E.   
 43 Papoulas somniferas. E. L. D.   
 Opio.   
 Succo espesso das capsulas em pillulas de grãos 1 até 2.   
 a Sua Tintura L. E, D. de gottas 25 até 50.   
 b d.<sup>a</sup> Camphorada, L. de oitavas 2 até 6.   
 c d.<sup>a</sup> Ammoniatada. E. de oitavas 1 até 1 meia.   
 d Pó de Ipecacuanha e Opio. E. | de grãos 10 ditos Compostos L. D. | até 20.

3 *Mineraes.*

- 11 Sulfureto d' Antimonio   
 c Tartrato d' Antimonio - grão meio de seis a seis horas.   
 d Seu Vinho - E. de oitavas 2.   
 Antimonio tartarizado L. oitava 1   
 e Sulfureto d' Antimonio preparado de grão 1 até 2   
 f Sulfur de Antimonio fusco. D. de grão 1 até 1 meio.   
 g Oxyda de Antimonio com Phosphato de cal. E. de grãos 4 até 6 de quatro, ou de 6 a 6 libras.

- P6a Antimonias L. Dito mesmo.**
- h* Antimonio calcinado L. de grãos 10 até 15.
- i* Oxyda de Antimonio precipitado D.  
 Nas Febres, Synanche, Pneumonia, Rheumatismo,  
 Botygas, Sarapico, Catarrho, Dysenteria, Ecz  
 carlatina, etc.
- 25 Enxofre sublimado.**
- a* Flor de Enxofre lavada. E. } de grãos 12 até 30.  
*b* d.<sup>a</sup> precipitada. I.
- 45 Mercurio L. E. D.**
- a* d.<sup>o</sup> purificado. L. E. D.
- b* Muriato de Mercurio por sublimação L.  
 Calomelanos L. | grão 1 todas as  
 Muriato de Mercurio doce. D. | noites.  
 No Rheumatismo.

## FORMULAS.

### 20 Bolo de Carbonato de Ammoniacò com Camphora.

R. — Carbonato de Ammoniacò } ana grãos dez  
 Camphora  
 Conserva de Rosas q. b.

Forme bolos, para tomar ao recolher bebendo em  
 abundancia sorò acetado ou vinhoso, para promover a  
 transpiração.  
 No Rheumatismo.

### 21 Mistura de Acetato de Ammoniacò com Tintura de Opio Camphorada.

R. — Acetato de Ammoniacò liquido } onças duas.  
 Tintura d' Opio camphorada } ana onça meia.  
 Xarope de Assafrão  
 Vinho de Antimonio tartarisado oitavas duas.  
 Agua de Canella onças quatro,

Forme mistura para tomar três ou quatro colheres de meza de seis a seis horas.

No Rheumatismo.

## 22 Bolo de Almiscar com Nitrato de Potassa e Camphora.

R. — Almiscar 5 grãos, quinq.  
Nitrato de Potassa 1 onça, dez.  
Camphora 1 grão, cinco.

Triture-se tudo junto, e se lhe ajunta

Conserva de Rosas.

Forme bolos, para tomar hum de seis a seis horas, bebendo-lhe em cima três ou quatro colheres da seguinte Mistura.

## 23 Bebida de Ammonia liquida Citrada.

R. — Carbonato de Ammoniac 4 escrupulos, quatro.  
Cumo de limão recente 2 onças duas.  
Alcool de Canella } anã onça meia.  
Xarope commum }  
Água commum } onças cinco.

Misture, e forme bebida.

Nas febres, etc. He hum excellente Julepo diaphoretico, brando, que pôde dar-se, conveniente mente depois de applicados sudorificos mais poderosos; ou pôde tomar-se livremente per si só, quando convenha conservar hum suave transpiração.

## 24 Pós de Extracto de Aconito.

R. — Suco espesso de Aconito 1 grão hum.  
Tartrito acidulo de potassa 1 escrup. hum.

Misture-se, e triture-se tudo, para se tomar de quatro, ou de seis a seis horas, em hum pouco de chá quente.

Rheumatismo, Gotta.



*Mistura de Gomma de Guaiaco com Tartrito de Potassa.*

Resina de Guaiaco	escrop. hum.
Tartrito acidulo de Potassa	oitava meia.

Triture, e triture para se tomar ao recolher em  
d p

Rheumatismo chronico.

*Mistura de Guaiaco.*

Gomma resina de Guaiaco	oitava huma.
Mucilagem de Gomma Arabia.	onça huma.
Assucar	aná onça meia.
Essencia de Guaiaco	} onças seis.
Agua de Hortela pimenta	

Misture-se para se tomarem trez colheres de meza,  
dois a tres ou quatro vezes no dia.

Rheumatismo chronico; Arthritis; etc.

*Mistura de Camphora com Tintura de Opio.*

Mistura de Camphora	onça huma.
Tintura de Opio	gotas trinta.
Vinco de Tartrito de Antimonio.	E oitava huma
Xarope commum	oitavas duas.

Misture-se para se tomar esta dose ao recolher.

Rheumatismo Catarrho.

*Mistura de Opio com Tartrito de Potassa.  
antimoniado.*

Opio	grãos seis.
Tartrito de Potassa antimoniado	grãos trez.
Extracto brando de Alcaçuz	q. h.

Faz-se massa para pillulas N.º 6, para se tomar

uma cada noite ao recolher, ou uma pela manhã outra ao recolher.

29 *Pilulas de Ipecacuanha com Opio.*

R. — Pó de Ipecacuanha e Opio      grãos quinze.  
Electuario aromatico. E.      q. b.

Forme pillulas N.º 4 para tomar ao recolher por uma dose, repetindo-se algumas horas depois na dose de duas até uma.

30 *Pós de Oxyda de Antimonio com Tartrito acidulo de Potassa.*

R. — Oxyda de Antimonio      } aná grãos doze.  
Tartrito acidulo de Potassa. }  
Flor de Macella em pó      escropulo hum.

Misture-se, e forme pós para tomar de seis a seis horas, por dois ou tres dias.

Nas Febres intermittentes.

31 *Pós de Aconito com Antimonio.*

R. — Folhas seccas de Aconito      } aná grão hum,  
Oxyda de Antimonio alaranjado. }  
Carbonato de Magnezia      grãos doze.

Misture, e forme pós,

No Rheumatismo, e Arthrites.

32 *Bolo de Oxyda de Antimonio com Phosphato de Cal.*

R. — Oxyda de Antimonio com Phosphato de Cal  
de grãos seis até dez.  
Electuario de Opio      q. b.

Forme bolos N. 2 para tomar ao recolher, ou para tomar hum só de seis a seis horas.

Nas Febres.

### 33 *Solução de Tartrito de Antimonio.*

R.—— Tartrito de Antimonio                      grãos dez.  
           Agua rosada                                      ouç. huma

Forme solução para esfregar as mãos junto ao lume, até que se haja seccado, nos casos em que os diaphoreticos pela bocca não sejam convenientes.

### 34 *Pillulas de Antimonio tartarizado com Opio.*

R.—— Antimonio tartarizado                      grãos seis.  
           Opio purificado                                grãos nove.  
           Conserva de Rcsas                            q. b.

Para formar pillulas N. 24 de que se deve tomar huma pillula ao recolher.  
 Nas Febres.

### 35 *Bolo de Guaiaco com Tartrito de Potassa antimoniado.*

R.—— Gomma resina Guaiaco                      escrop. hum.  
           Tartrito de Potassa antimoniado . . .  
           Opio purificado                                aná grão hum.  
           Xarope commun                                q. b.

Forme bolo para tomar por duas vezes no dia.  
 No Rheumatismo, e Hydropesia.

### 36 *Pillulas de Guaiaco com Opio e Ipecacuanha.*

R.        Guaiaco-resina                                grãos doze.  
           P'ds de Ipecacuanha e Opio. E.        grãos cinco.  
           Xarope commun                                q. b.

Para formar pillulas N. 3. para huma dose.  
 No Rheumatismo.

### 37. *Mistura antimonial com Tintura de Opio.*

R.—— Mistura de Camphora                      ouç. huma e meia

Acetato de Ammoniacco                      onça meia.  
 Vinho de Antimonio tartarizado            gottas quarenta.  
 Tintura de Opio                                    gottas vinte.  
 Misture para tomar ao recolher.  
 No Rheumatismo agudo.

### 38. *Mistura de Arrobe de Sabugo*

R. — Arrobe de Sabugo                      onça huma.  
       Nitrato de Potassa                      oitava huma.  
       Agua fervendo                            libra huma.

Misture para se dar na dose de trez colheres de hora a hora.

### 39. *Mistura de Oxymel,*

R. — Mel optimo                                onça huma.  
       Acido acetico destillado                onça huma.  
       Agoa fervendo                            onças quatorze.

Tome-se morno na dose de hum copo de trez ao quartilho

Nas Febres.

N. B. Nesta classe devem comprehender se Aguas mineraes sulfureas, Banhos de agua quente, Banhos de vapor, Banhos seccos, de ar quente, Aguas thermaes, Banhos de agoa quente natural, Fricções com a mão ou escova, uso de camiza de flanela,

## CLASSE IV.

### *Diureticos.*

#### 1 *Animaes*

#### 46 *Cantharidas.*

Em pó de grão meio até 1 de quatro ou de seis a seis horas

a Sua Tintura E. L. gott. 10 até 21.

Na Ischuria, e Hydropesia.  
47 Millepedes.

2. *Vegetales*

- 3 Asaro. Raiz  
Em Cozimento na Hydropesia.
- 6 Nicotiana Tabaco. Folhas  
Para infusão de onça 1 para huma libra de agua na  
dose de gottas 60 até 80.  
Na Hydropesia, Disuria.
- 8 Scylla maritima.  
Seus pós de grão 1 até 2 por duas ou trez vezes  
no dia.
- a Sua tintura de gottas 20 até 30.  
Na hydropesia
- 13 Alhos.
- 14 Alhos pòrrros. Raiz.  
Seu Cozimento *ad libitum*  
Na Hydropesia.
- 16 Colchico.
- |   |                 |                                                      |
|---|-----------------|------------------------------------------------------|
| a | Seu Xarope. E.  | } de oitava 1 até 4 por duas ou trez<br>vezes no dia |
| b | Seu Oxy mel. L. |                                                      |
| c | Seu Vinagre     |                                                      |
- Na Hydropesia.
- 22 Poligula Seneca.  
a Seu Cozimento de onça 1 até 1 e meia.
- 26 Acido acetozo
- |   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| a | Acetito de Potassa E.  | } de escropulo 1 até 4 |
|   | Kali acetado L.        |                        |
|   | Alkali vegetal acetado |                        |
- Na hydropesia, e Ictericia.
- 30 Mezerião.  
a Seu Cozimento de onça 1 até 2.
- 36 Salsa parrilha.  
a Seu Cozimento composto *ad libitum*.
- 37 Dulcamara.  
Seu Cozimento.
- 38 Tartrato ácido de Potassa  
Solução de onça meia por dia.



- Na Hydropesia.
- 48 Parreira brava L. D.  
Seu Cozimento de onças 4 até 8.
- 50 Rabano rustico. L. D.  
Da Raiz recente infusão.
- 51 Balsamo de Cupaiba.  
Gottas, e Emulção.  
De gottas 20 até 60.
- 52 Cincura. Folhas.  
Suco espesso de meia onça até 1 por duas vezes  
no dia.
- Na Hydropesia.
- 53 Digitalis purpurea.  
Pós das folhas grão meio até 1 por duas ve-  
zes no dia.
- Na Hydropesia.
- 45 Junipero. Bagas.  
De escropulo 1 até oitava meia.  
Infusão das sumidades *ad libitum*.
- a Alcool de Junipero commun.  
Commun-E. L. D. onça meia até 1 diluido.
- b Oleo volatil - L. D. gottas 3 até 6.
- 55 Tarraxação. Raiz
- 56 Terebentina vulgar. Resina. Oleo volatil.  
Gottas. Clyster. Pillulas.  
De grãos 15 até 20.
- a Oleo volatil rectificado gottas 20 até 30.
- 57 Giesta. Semente, e Sumidades.  
Cozimento *ad libitum*.
- 58 Olmo campestre. Casca interna: Cozimento.
- a Cozimento de Olmo - L. onças 4 até 8 por varias  
vezes no dia.
- Nas molestias cutaneas.

### 3 Mineraes.

- 45 Mercurio
- c Muriato de Mercurio. E. } de 18.<sup>o</sup> de grão  
Mercurio Muriato. L. } até 4.<sup>o</sup> de grão,  
Merc. Muriato. corrosivo. D. }

Nas indicatias psoricas.

81 Nitrato de Potassa.

Seis pps de grãos 5 até 15

Acido nitroso L. E. D. oitava 1 até 2 diluido em  
agua libra 1 no dia.

Alcool nitroso.

Espirito de Ether nitroso L. E. D. de gottas 30  
até 60 por vezes no dia.

## FORMULAS.

### 40 Bolo de Cantharidas com Camphora.

R. —	Cantharidas em pó	grão hum
	Camphora.	grãos cinco.
	Sabão de Hesp-nha	grãos dez
	Xarope commum	q. b.

Para formar bolo, para tomar duas ou trez vezes  
no dia, bebendo-lhe em cima huma chavena de chá  
de infusão de semente de Linhaça.

### 14. Pillulas de Scylla com Muriato de Mercurio doce.

R.	Scylla em pó	escropulo hum.
	Muriato de Mercurio doce	oitava meia.
	Xarope de Gengibre	q. b.

Forme massa para dividir em pillulas N.º 10 para  
se tomarem por duas ou trez vezes no dia, bebendo-lhe  
de cada vez hum copo de ponche de Genebra.

Na Hydropsia.

### 24. Pbs de Scylla com Nitrato de Potassa.

R.	Scylla em pó	grão hum até dois.
	Nitrato de Potassa	grãos dez.
	Canella	grãos cinco.

Misture, e forme pòs para se tomarem todas as noites e manhãs.  
Na Hydropesia.

43. *Mistura Salina Camphorada.*

R. — Carbonato de Potassa	escropulo hum.
Cumo de Limão	onça meia.
Tintura de Scylla	gottas quarenta.
Dita de Opio	gottas vinte.
Xarope de Casca de Laranja	onça meia.
Mistura camphorada	onça huma.

Misture para se tomar todas as noites ao recolher.  
Em lugar da Mistura de Camphora pòde juntar-se a mesma dose de Agua de Canella.

44. *Solução de Tartrito acidulo de Potassa com Alcool de Junipero composto.*

R. — Borax tartarizado.	onça huma
Alcool de Junipero composto	onças trez.
Agua	libra huma e meia
Xarope colchico	onça huma.

Misture-se para se tomar pelo dia adiante.  
Na Hydropesia.

45. *Pòs de Tartrito acidulo de Potassa compostos.*

R. — Tartrito acidulo de Potassa.	onças duas
Antimonio tartarizado	grão hum e meio.
Pòs de Scylla	grãos dezoito.
Oxyda de Ferro negro	oitavas duas.

Misture, e divida em 12. papeis, para tomar hum de quatro a quatro horas.  
Na Hydropesia.

46. *Pós de Digitalis com Tartrato acidulo de Potassa.*

R. Pós de Digitalis grãos seis.  
Tartrato acidulo de Potassa oitav. duas.

Triture-se tudo, e divida-se em papeis N.º 6. para se tomarem dois papeis no dia.

47. *Infusão de Digitalis composta.*

R. Folhas seccoas de Digitalis oitava huma.  
Agua fervendo libra huma.

Infundase por quatro horas, e coando-se, lbe junte Alcool de Noz muscada.

Xarope de casca de Laranja anã onça huma.

Para-se tomarem duas ou trez colheres de meza no dia.

48. *Tintura de Digitalis.*

R. Folhas seccoas de Digitalis em pô grosso  
onças duas.

Infunda em  
Alcool  
Agua destillada } anã onças quatro.

Digita-se a calor brando, mexendo-se varias vezes por vinte e quatro horas, depois coe-se por papel pardo.

Na Hydroterax, Anasarca, Hemoptisis na dose de gottis 30 em huma onça de Agua de Hortelã pimenta por duas ou trez vezes no dia, augmentando-se gradualmente até excitar nausea.

49. *Tintura de Scylla.*

R. Scylla secca recentemente onças duas.  
Alcool a 20 grãos libra huma.

Macere-se por oito dias, decante-se; dose de gotas doze até meia oitava pouco a pouco, e com cautella, e talvez ainda mais conforme as circumstancias.

**50. Pillulas de Carbonato de Soda.**

R.	Carbonato de Soda secco	oitava huma.
	Sabão duro	escropulos quatro.
	Xarope de Gengibre	q. b.

Forme pillulas N.º 30. para tomar trez por trez vezes no dia.

Na pedra dos rins e bexiga.

**51 Bolo de Sabão com oleo volatil de Junipero.**

R.	Sabão duro	escropulos dois.
	Oleo volatil de Junipero	gotas seis.

Misture.  
Ut supra.

**52. Bebida com Oxymel de Scylla.**

R.	Oxymel de Scylla	oitava huma e meia.
	Agua de Canella	onça huma.
	Alkool de Alfazema composto	
	Xarope de casca de Laranja	aná oitava huma.

Misture para bebida que se deve tomar ao recolher.

Na Hydropesia.

**45. Bebida com Oxymel Colchico.**

R.	Acetito de Potassa	oitava huma.
	Oxymel colchico	oitavas duas.
	Agua	onça huma,
	Alkool de Junipero composto	onça meia.



Espirito de Nitro doce gottas trinta.

Forme bebida para tomar por duas vezes no dia.

Na Hydropesia.

46 *Mistura de Ammoniaco com Scylla.*

R.	Mistura de Ammoniaco	onças seis.
	Nitrato de Potassa	oitav. huma.
	Vinagre Scyllitico	oitavas seis.
	Alcool de Rabano rustico composto . .	onça meia,

Dem-se duas ou trez colheres de meza de quatro a quatro horas.

47. *Infusão de Junipero.*

R.	Bagas de Junipero contusas	onças duas
	Semente de berva doce	oitav. duas.
	Agua fervendo	onças deseseis.
Macere se por duas ou trez horas , depois coe se e se lhe junte		
	Acetito de Potassa	onça huma.
	Oxymel scyllitico	onça huma

Misture para tomar huma onça até onça huma e meia, de trez , ou de quatro a quatro horas

48. *Linimento Terebentinado.*

R. —	Oleo volatil de Terebentina	oitava huma.
	Oleo commun	onças duas.

Misture-se para com elle fomentar o abdomen por duas ou tres vezes no dia.

49 *Enema Terebentinado.*

R. —	Terebentina	onça meia.
------	-------------	------------

Mucilage de gomma arabia	q. b.
Triture-se tudo, e junte-se-lhe	
Nitrato de Potassa	oitavas duas.
Infusão de bagas de Junipero	libra huma.
Forme Enema.	

### 50 Pommada de Scylla.

R. — Scylla em pó sutil	escropulo hum.
Succo gastrico	oitava huma.
Dissolva-se a Scylla no Succo gastrico, e depois jun-	
te se lhe de	
Banha	oitavas duas.

Misture-se para trez fricções no dia,

Na Hydropesia

### 51. Pommada de Digitalis.

R. — Digitalis em pó	grãos vinte.
Saliva	oitava huma.

Macere-se por vinte e quatro horas, e junte-se lhe.	
Banha	oitava huma.

Misture-se para duas doses como acima.

### 52. Solução de Gomma Ammoniaco com Vinagre Scillitico.

R. — Gomma resina Ammoniaco	oitavas duas.
Vinagre de Scylla	onças duas.

Faça solução para esfregar o ventre à noite, e pela manhã

Na Hydropesia do ovario.

### 53 Pommada Mercurial.

Na dose de huma oitava todas as noites, como acima.

N. B. Nesta classe se comprehendem tambem Agua commun. Aguas mineraes salines, Aguas Ferras, Aguas saturadas de Gaz acido carbonico, Aguas saturadas de gaz hydro sulfurado, ou Aguas mineraes sulfureas.

## CLASSE V

### *Catharticos brandos.*

#### 1. *Animaes.*

26 Mel.

#### 2. *Vegetaes.*

2 Macella.

a Seu cozimento para clyster.

7 Oleo commun.

Para enema

88 Cremor de tartaro, Tartrito acidulo de Potassa -de oitavas 2 até 4

a Tartrito de Potassa E. } de oitavas 2 até 6  
Kali tartarizado L

Alkali vegetal tartarizado. D.

b Tartrito de Potassa e Soda E.

Natrão tartarizado L.

Sal Rupelense,

Soda tartarizada. FJ.

Tartaro natronado. B.

Nas Febres, Phlegmacias, Hemorrhagias, Comas Colicas. Cholera, Hydropesias, Ictericia.

63 Cana fistula.

Sua polpa *ad libitum*.

a Seu electuario. L. E. de onça meia até onça 1

64 Senne.

Suas folhas em pó para infusão.

a Pó de Senne compostos. L. de oitava meia até oitava 1.

Nas Febres.

b Electuario de Senne E.

- de Senne L. D.

} de oitavas 2 até 6.

- c Infusão de Senne simpl. L. }  
 — de Senne. D. } de onça 1 até onças 3.  
 d — tartarizada. L. }  
 e Infusão de Tamarindos com Senne. E. onça 1  
 até 3  
 f Tintura de Senne comp. E.  
 — de Senne. L. D. de onça meia até 1 e meia.  
 Na Colica.  
 65 Mannâ, de huma onça até 2  
 66 Figos. Fructo.  
 67 Ameixas. Fructo.  
 68 Rosas Damascenas  
 a Agua rosada  
 b Xarope de rosas.  
 69 Assucar  
 70 Tamarindos. Fructo.  
 Da sua polpa de onça 1 até 2.

### 3. *Mineraes*

- 25 Enxofre sublimado  
 a Enxofre sublimado lavado de oitava 1 até 2.  
 Nas Hemorrhagias, molestias cutaneas, constipação.  
 72 Sabão. Pillulas, Clyster.  
 Na Ictericia.

### *Catharticos fortes.*

#### 1. *Animaes.*

- 73 Raspas de corno de Veado  
 Phosphato de cal.  
 a ————— de Soda. E. de onça 1 até 2

#### 2. *Vegetaes.*

- 6 Nicotiana Tabaco. Fumo. Infusão para enema.  
 Na Colica, e Constipação.  
 35 Sanguieiro negro.  
 Entrecasca onça 1 para huma libra de cozimento para

hum dia.

Na Hydropesia

55 Pinheiro bravo  
Terebentina para clyster.

74 Azebar.

a ——— Secotrina.

b A Hepatico.

c A. Cablino. L. E. D.

Gomma resina, pillulas de 10 até 20.

a Pós de Azebar com Canella. L. de grãos 8 até 20

b Pillulas de Azebar E. D.  
— de Azebar compost. L. de grãos 10 até 20

———— com Coloquintidas L. de grãos 10 até 20

d Vinho de Azebar. E. de onça huma até 2

—— de Azebar L. D. de onça meia até 1.

e Tintura de Azebar. E. L. de onça meia até onça  
1 e meia.

Na Dispepsia, Chlorosis, Hypochondria, Consti-  
pação.

75 Bionia Raiz. Cozimento.

Seus pós de escropulo 1 até 2

Na Mania Hydropesia.

76 Jalapa. Raiz. Pós. Bolos.

De grãos 15 até 30.

a Pós de Jalapa compostos. E. de oitava meia até  
oitava 1.

b Extracto de Jalapa. E. L. de grãos 5 até grãos 12.

c Tintura de Jalapa. E. de oitavas 3 até 6. de L. D.  
de oitavas 3 até 4.

77 Escamonea resina. Pós. Bolo. Pillulas de grãos 5  
até 15

a Pós de Escamonea compostos L. de grãos 8 até  
16,

Ditos E. de grãos 10 até 30.

b Ditos com Azebar. L. de grãos 5 até 12.

c Electuario d' Escamonea. L. D. de grãos 15 até 30  
Na Hydropesia. Loubrigas.

78 Coloquintidas. Fructo, Medulla Pillulas. Bolo de  
grãos 2 até 5.

a Seu extracto composto, L. de grãos 5 até 15.



- 79 Gratiola. Herva, Raiz. Cozimento. Pós de grãos  
15 até 30.
- 80 Eleboro negro. Raiz. Pós, Pillulas.  
a Seu extracto E. grãos 3. até 6.  
Na Hydropesia.
- 83 Linbo cathartico. Infusão. Pós oitava 1.
- 84 Elaterio. Fructo recente.  
a Seu succo espesso E. L. grão 1 até 3.
- 85 Rhano cathartico, Spina Cervina. Baga succo es-  
presso.  
a Seu Xarope E L. de oitavas 6 até 12.  
Na Hydropesia.
- 86 Rhuibarbo Raiz Pós, B los, Pillulas. de grãos  
10 até 40  
a Sua infusão E. de onça 1 até 3  
b Vinho de Rhuibarbo E de oitavas 3 até 6. L. de  
onça 1 até 2.  
c Sua tinctura. E L. de meia onça até onça 1 e meia.  
d Dita composta L. onça 1.  
e Dita com Azucar. de oitavas 4 até 6.  
f Dita com Geacina. E de oitavas 4 até 6  
Nas Febres, Dysenteria, Dispepsia, Hypocoadria,  
Ictericia
- 87 Canapatos. Mamona Ricino commun.  
Semente. Oleo espesso.  
De oitavas 3 até onça 1.
- 88 Gomma Guta. Gambogina, Gomma resina de grã-  
os 3 até 15.

### 3. Mineraes

- 11 Sulfureto de Antimonio.  
Tarrito de Antimonio hum quario de grão de qua-  
tro a quatro horas.  
Na Dysenteria.
45. Mercurio B.  
b Muriato de Mercurio de grão 1 até 4.  
c d.<sup>o</sup> d.<sup>o</sup> precipitado E. }  
d.<sup>o</sup> d.<sup>o</sup> doce. L. } de grãos 3 até 10.  
d.<sup>a</sup> d.<sup>o</sup> d.<sup>o</sup> precipitado D. }

- d Pillulas de Mercurio E D. L.  
Na Phlegmasia, Córpa, Colica, Ictericia, e Constipação.
- 61 Nitrato de Potassa.
- c Sulfato de Potassa. E  
Kali vitriolado. L. } de oitava 1. até 2.  
Alkali vegetal vitriolado D. }  
Kali sulfurico. D.
- 89 Muriato de Soda. E.  
Natão Muriatico. L.  
Alkali fossil muriatico D. Solução onça meia até 1 para enema.
- e Sulfato de Soda. E.  
Natão vitriolado. L.  
Alkali fossil vitriolado. D. de onça 1 até 2.
- 90 Sulfato de Magnesia. E.  
Magnesia vitriolada. L. D. Solução Enema onça meia até 1 e meia.  
Na Dysenteria.

# FORMULAS.

## 54 Pó de Enxofre com Tartrito acidulo de Potassa.

R. — Enxofre sublimado e lavado  
Tartrito acidulo de Potassa                      anã onça huma.  
Misture e fôrme pós, para tomar huma ou duas colheres pequenas em agua ao recolher.

## 55. Pó de Rhuibarbo com Magnezia.

R — Rhuibarbo em pó                      oitava meia.  
Magnezia                      escropulo meio.  
Oleo d' Hortelã pimenta                      gotta huma.

Misture para huma dose na Acidez do estomago.

56 *Pós de Rhuibarbo com Sulfato de Magnezia.*

B. — Rhuibarbo em pó	oitava huma.
Sulfato de Magnezia	oitavas trez.

Misture para duas ou trez doses.

57 *Pós de Rhuibarbo com Potassa tartarizada.*

R. — Rhuibarbo em pó	oitava huma.
Potassa tartarizada	oitavas duas.
Amarello de casca de Laranja em pó . .	escropulos dois.

Misture , e forme pó para trez doses.

58. *Pós de Rhuibarbo com Tartrito acidulo de Potassa.*

R. — Rhuibarbo em pó	oitava huma.
Tartrito acidulo de Potassa	oitava huma
	até huma e meia.

Misture para duas ou trez doses.

59 *Bolo de Rhuibarbo com Muriato de Mercurio doce.*

R. — Rhuibarbo em pó	oitava meia.
Muriato de Mercurio doce	grãos trez.
	até quatro.
Oleo volatil de Cravo	gott. duas.
Xarope commum	q. h.

Para formar hum bolo para se tomar pela manhã cedo.

60. *Pillulas de Rhuibarbo com Muriato de Mercurio doce.*

R. — Rhuibarbo em pó	escropulos dois.
Muriato de Mercurio doce	grãos seis.
Canella em pó	grãos dez.
Xarope de Gualibee	q. h.

Forme massa para dividir em pillulas N. 18. Par

se tomarem trez de cinco, ou de seis a seis horas na Ictericia.

61. *Mistura de Rhuibarbo composta.*

R. .... Rhuibarbo em pó	grãos vinte e cinco.
Tartrito de Potassa	oitavas duas.
Tintura de Senne composta	oitavas trez.
Agua de Hortelã pimenta	onça huma e meia.
Misture se para se tomar pela maubã.	

62. *Clyster Terebentinado.*

R. .... Terebentina de Veneza.	onça meia.
Mucilage de Gomma Arabia	q. b.
Cozimento saturado de cevada	onças oito.

Misture, e forme Clyster. Em lugar do Cozimento de cevada pode juntar-se infusão de Linhaça, e em lugar da Gomma Arabia gemma de Ovo.

63. *Clyster de Muriato de Soda.*

R. .... Muriato de Soda	onça huma.
Agua quente	onças desaseis.
Dissolva para hum Clyster.	
Algumas vezes convém juntar-lhe	
Oleo commun	onça huma.

64. *Clyster de Sulfato de Magnesia.*

Como acima

65. *Clyster de Sulfato de Soda com Electuario de Senne.*

R. .... Sulfato de Soda	onça huma.
Electuario de Senne	onças duas.
Agua fervendo	libras duas.

Dissolva. Algumas vezes convem juntar-lhe em lugar de agua infusão de Macella.

66. *Clyster de Coloquintidas.*

R. — Extracto de Coloquintidas                      oitava huma.  
       Agua quente.                                      onças dezeséis.  
 Forme Clyster. Na Apoplexia, e Lethargo.

67. *Clyster de Tabaco.*

R. — Folhas de Tabaco                                      oitava huma.  
       Agua fervendo.                                      onças dezeséis.

Macere se por huma hora em vazo mal tapado, e depois coe-se

68. *Pós de Jalapa com Muriato de Mercurio doce.*

R. — Jalapa em pó                                      grãos dez,  
       Muriato de Mercurio doce                      grãos trez -  
       até                                                              gr. cinco.

Misture para se tomar pela manhã cedo.

69. *Pós de Gomma Guta.*

R. — Gomma resina Guta                                      grãos trez.  
       Assucar purificado                                      escrop. hum.

Forme pós para tomar de trez ou de quatro em quatro horas

Na Hydropesia.

70. *Pillulas de Extracto de Coloquintidas com Opio.*

R. — Extracto de Coloquintidas composto - - -  
       escropulo hum.  
       Opio puro                                                      grão hum.

Misture, e forme pillulas N. 4 para huma dose, e passe-as algumas deas se duas colheres de infusão de Senne juntando-lhe a quarta parte de Tintura de Senne,



todas as horas, ou de duas a duas, até que as dissecções pareçam suficientes.

No Volvo.

### 71. *Píllulas de Gomma Guta com Muriato de Mercurio doce.*

R. — Gômma Guta grãos seis.  
Muriato de Mercurio doce grãos quatro.  
Extracção de Colloquintidas composto L. . .  
Oleo volatil de herva doce grãos quinze.  
Xarope commun gotas duas.  
q. b.

Forme píllulas N.º 8. para duas doses.

Na Hydropesia.

### 72. *Electuario de Tamarindas com Rhuibarbo.*

R. — Polpa de Tamarindos onça huma e meia.  
Rhuibarbo em pó oitava huma.  
Tartarito acidulo de Potassa oitavas duas.  
Xarope commun q. b.

Forme Electuario para tomar huma ou duas colheres segundo convenha.

### 73. *Electuario de Enxofre.*

R. .... Enxofre sublimado e lavado onça meia.  
Tartarito acidulo de Potassa oitavas duas.  
Electuario de Senne cu  
Polpa de Tamarindos onça huma e meia.

Misture-se, para tomar huma colher pequena à noite, e pela manhã

Nas Hemorroides.

### 74. *Solução de Sulfato de Soda.*

R. .... Sulfato de Soda oitavas seis.

Agua destillada                      onças trez.  
Dissolva.

**75. Solução de Sulfato de Magnezia.**

R.... Sulfato de Magnezia                      onça huma.  
Agua destillada                      onças oito.

Dissolva-se para tomar duas colheres de meia a meia hora, até que o ventre corresponda.  
No Volvo.

**76. Solução de Soda tartarisada.**

R..... Soda tartarisada                      oitavas seis.  
Agua destillada                      onças seis.  
Dissolva para tomar por duas vezes,

**77. Infusão de Senne com Sulfato de Magnezia.**

R..... Infusão de Senne                      onça huma.  
Sulfato de Magnezia                      oitavas duas.

Forme solução para tomar de duas a duas horas até que o ventre se solte.  
Na colica dos pintores ou de chumbo.

**78. Mistura de Oleo de Ricino com Tintura de Opio.**

R..... Oleo de Ricino                      onça meia.  
Gemma de ovo                      q. b.  
Agua de Hortela pimenta                      onça huma.  
Xarope de Papoulas                      oitavas duas.  
Tintura de Opio                      gotas tres ou quatro.

Misture para beber de trez ou de quatro a quatro horas.  
Na Colica.

79 *Emulção de Oleo de Ricino com Tintura de Senne.*

R.....	Oleo de Ricino espresso	onças duas,
	Mucilage de Gomma Arabia	onça huma.
	Triture-se muito bem, e junte se-lhe	
	Tintura de Senne composta	} aná onça meia.
	Xarope de Rhuibarbo	
	Agua	onças quatro.

Forme Emulção para tomar trez ou quatro colheres de meza de duas em duas horas até que faça effeito.  
Na Colica.

80. *Mistura Gambogina.*

R.....	Gomma Gambogina	grãos cinco.
	Triture-se muito bem com	
	Xarope de Rhamno Cathartico	oitavas trez.
	E junte-se-lhe	
	Agua de Funcho	onça huma.
	Misture-se,	
	Na Hydropesia, Tenia, etc.	

N. E. Nesta Classe tambem se comprehende Agua do mar, Aguas Salinas neutras semelhantes ás de Seydchut de Sedlitz, de Epson, etc.

CLASSE VI.

*Dos Emenagogos.*

1. *Animaes.*

1. Muriato de Ammoniaco
- b. Carbonato de Ammoniaco.
91. Castorio.
  - Seus Pó's e Pillulas de grãos 10 até 20.
  - Para clyster de escropulos 2 até oitava 1.
  - a Sua Tintura. L. E. D. gottas 20 até oitava 1.

b Sua Tintura composta. E. o mesmo.

## 2. Vegetaes.

2 Macella.

Seus pós Infusão.

a Seu Extracto. E. } de grãos 15 até 30  
d.<sup>o</sup> L. D. }

14 Ammoniaco.

Suas pillulas de grãos 10 até escrópulo 1.

17 Assafetida.

Suas pillulas de grãos 10 até 20.

b Ditas compostas. E de grãos 15 até 30.

c Sua Tintura. L. E. D. de oitava I até oitavas 2.

d Alcool Ammoniaco fetido. E.

Espirito d'Ammoniaco fetido } de gottas 30 até

Alkali volatil fetido. D. } oitava I

19 Marrocos vulgares.

Infusão.

20 Myrrha.

a Pós de Myrrha compostos. L. de grãos 15 até 20

74 Azebar.

Pillulas de grão 1 por trez vezes no dia.

f Pós com Myrrha. L. de grãos 15 até 30

g Pillulas com Myrrha. L. grãos 8 até 15.

d.<sup>a</sup> E. de grãos 5 até 12.

h d.<sup>a</sup> com Assafetida. E. grãos 10 por duas vezes no dia.

i Sua Tintura composta. L. até onça 1.

d.<sup>a</sup> com Myrrha de oitavas 2 até 4.

80 Eleboro negro.

b Sua Tintura. E. de oitava I por duas vezes no dia

86 Rhuibarbo.

De grãos 5 até 10 por duas vezes no dia.

g Pillulas compostas de escrópulo 1 até oitava meia

22 Arnica montana. Flores.

Infusão de escrópulo 1 até 2 por dia.

- 93 Galbano Gomma resina.  
De grãos 10 até 20.
- a Sua Tintura. L. até oitava 1
- b Suas pillulas compostas de grãos 15 até 30.
- 94 Sabina. Folhas.  
Sens pds de grãos 10 até 15 por duas vezes no dia.
- a Extracto de Sabina composto. L. D.  
De grãos 5 até 10 por duas vezes no dia.
- b Sua Tintura L. de gottas 40 até 60.
- 95 Opoponaco.  
Suas pillulas
- 96 Sagapeno. Gomma resina.  
Suas pillulas.
- 97 Ruzza de Tintureiros. Raiz.  
Sens pds de oitava meia até huma por trez vezes no dia.

### 3. Mineraes.

- 45 Mercurio.
- b Muriato de Mercurio de grãos 3 até 5.
- c d<sup>o</sup> precipitado de grãos 5 até 10.
- d Pillulas de Mercurio de 10 até 20.
- 100 Ferro.
- a Carbonato de Ferro E | de escropulo 1 até oi-  
Ferrugem de Ferro. L D. | tava 1.  
Para tomar duas vezes no dia.
- b Carbonato de Ferro precipitado. E.  
De grão 5 até 15.
- e Agua terrea carbonizada. D.  
De libra meia até 1 por dia.
- d Sulfato de Ferro. E.  
Ferro vitriolado. L D. de grãos 1 até 5 por duas vezes no dia.
- e Vinho de Ferro L. de oitavas 2 até 4
- f Tintura de Ferro muriatica. E. L. D. de gottas  
10 ate 20 por duas ou trez vezes no dia.



# FORMULAS.

## 81 *Tintura de Castorio com Alkool Ammoniacal fetido.*

R. — Tintura de Castorio . . . . .  
Alkool Ammoniatado fetido anã onça meia.

Misture para tomar huma colher de chá por trez vezes em huma ciavena de chá de Macella.

## 82 *Pillulas de Assafetida com Extracto de Macella.*

R. . . . . Assafetida oitava huma e meia  
Extracto de Macella oitava meia.  
Xarope commum q. b.  
Misture, e forme massa para pillulas N.º 36.

## 83 *Pós de Sabina com Sulfato de Potassa.*

R . . . . . Sabina em pó: } anã grãos doze  
Gengibre branca. }  
Sulfato de Potassa grãos trinta e seis.

Forme pós pata tomar duas vezes no dia.

## 84 *Clyster de Macella com Sabina.*

R. . . . . Infusão de Macella libra huma.  
Extracto de Sabina oitava huma

Dissolva para Clyster que se hade tomar por duas vezes no dia.

CLASSE VII.

*Errrhinos.*

1 *Vegetaes.*

- 3 Asaro Europeo. Pós.  
 a Sopa pós compostos E L.  
 6 Nicotiana. Tabaco. Pós  
 104 Maun Herva. Pós  
 105 Elabero branco. Raiz. Pós.

2 *Mineraes*

- 45 Mercurio.  
 f Sulfato de Mercurio amarello. } grão 1 duas ve;  
 Mercurio vitriolado. L. O. } zes no dia.

FÓRMULA

85 *Pós de Sulfato de Mercurio amarello  
 com Asaro.*

R. — Sulfato de Mercurio amarello grãos dez.  
 Pós de Azaro compostos, oitava huma.

Misture , forme pós para tomar huma pequena pi-  
 tada de vez em quando.

Na Gotta serena , Coma , Cegueira , &c.

CLASSE VIII

*Silagogos.*

1 *Vegetaes.*

- 31 Mezerião. Raiz. Mastigada.  
 Na Odontalgia. Paralytia.  
 106 Gengibre. Raiz. Mastigada  
 Infusão.  
 Na Odontalgia.

- 107 Piretro. Raiz. Mastigada.  
108 Almecega, Resina. Mastigada.

2 *Mineraes.*

45. *Mercurio.*

- a Mercurio purificado.  
b Muriato de Mercurio doce grão 1 até 2 por duas vezes no dia.  
c Muriato de Mercurio oxygenado oitavo de grão até hum quarto de grão por duas ou trez vezes no dia.  
d Muriato de Mercurio precipitado grãos 2 por duas vezes no dia.  
e Pillulas mercuriaes de grãos 6 até 8 por duas vezes no dia.  
g Oxyda cinerea de Mercurio. E. D.  
De grão 1 até 2 por duas vezes no dia.  
h Unguento mercurial. E.  
Escopelos 4. } Para todas as noites, ou  
d.<sup>o</sup> forte L. D. escrop. 2. } de dous a dous dias.  
i d.<sup>o</sup> brande L. D.  
Mercurio calcinado L. grão meio por duas vezes no dia.  
k Acetito de Mercurio. E.  
Mercurio acetado. L. D. grãos dois.  
l Mercurio sulfurado rubro. L. no externo.  
m Sulfureto de Mercurio negro.  
Mercurio com Enxofre. L.  
Mercurio sulfurado negro. D.  
Nas Febres, Febre amarella, Phrenites. Hydrocephalus.  
Iea. Ophthalmia, Synanche tracheal, Hepatites chronica,  
Coma, Tetano, Hydrophobia, Hydropsia, Chlorosis,  
Siphilites, Lepra, Ictericia, Sarna, Lombrigas.

FORMULAS.

86. *Pillulas de Oxyda vermelha de Mercurio.*

R. .... Mercurio oxydado rubro ou calcinado  
grão hum.

Opio puro  
Oleo volatil de Cravo de grão a terça parte.  
gotta huma.

Forme huma pillula para tomar ao recolher por; hu-  
ma semana.

**87. Pillulas de Oxyda de Mercurio cinerea.**

R. .... Oxyda cinerea de Mercurio grãos quinze.  
Mioio de pão oitava huma.  
Mel q. b.

Para formar pillulas N 30

Para tomar huma ou duas , por trez vezes no dia.

**88. Pillulas de Muriato de Mercurio doce.**

R. — Muriato de Mercurio doce oitava huma  
Mioio de pão q. b.

Forme massa , e della pillulas N<sup>o</sup> 30 para tomar  
huma por duas vezes no dia para excitar hum modera-  
do ptyalismo.

Nas ulceras venereas

**89 Pillulas de Muriato de Mercurio  
Oxygenado.**

R. — Muriato de Mercurio oxygenado.  
Muriato de Ammoniao anã grãos cinco.  
Agua destillada oitava meia.  
Póo do Alcaçuz escrop. quatro  
Mel oitava meia

Forme massa para pillulas N.<sup>o</sup> 40 para tomar huma por  
trez ou quatro vezes no dia.

**90 Solução de Muriato de Mercurio Corrosivo**

R. — Muriato de Mercurio corrosivo grão hum  
Alcool diluido ouças duas.

Faça dissolução para tomar humia colherinha á noite, e outra pela manhã em humia chavena de infusão de Linhaça.

91 *Gargarejo Mercurial.*

R. .... Muriato de Mercurio corrosivo.

Cozimento de cevada	grãos trez
Xarope balsamico	libra humia.
Misture, e faça gargarejo.	onça humia.

92 *Gargarejo Mercurial com Borato de Soda.*

R. .... Muriato de Mercurio oxygenado

Borato de Soda	grãos deseseis.
Agua destillada.	onça humia.
Mel rosado	libras duas.
Nas ulçeras venereas.	onças duas.

93 *Pommada Mercurial com Acetato de Chumbo,*

R. .... Pommada Mercurial } partes iguaes  
 Acetato de Chumbo }  
 Misture para uso nos Cancros venereos

94 *Linionada Nitrica*

R. — Acido nitrico	oitava humia.
Agua destillada	onças vinte e quatro
Assucar	onças duas.

Para tomar em diversas doses dentro em 24 horas. Algumas vezes convem augmentar a dose do acido até oitavas trez.



95 *Sulfureto de Potassa com Açúcar.*

R. .... Sulfureto de Potassa  
 Açúcar purificado                      anã oitava huma.  
 Triture-se tudo, e divida-se em seis papéis para  
 tomar hum diluido, em pequena porção de agua por duas  
 ou trez vezes no dia.

96 *Cumo de Limaõ com Tintura de Opio.*

R. .... Cumo de Limaõ                      onça huma  
 Tintura de Opio                      onça meia.  
 Água rosada                      onça huma e meia  
 Misture para lavar a boca por trez ou quatro vezes  
 no dia.  
 No ptialismo.

N. B. Estes dois ultimos remédios são tentados para  
 suspender a excessiva salivação ou mitigar seus ef-  
 feitos.

CLASSE IX.

*Emolientes.*

1 *Animaes.*

- 109 Gomma de peixe.  
 Seu cozimento *ad libitum*.  
 110 Sebo de Carneiro.  
 Unguento Linimento, Ceroto.  
 111 Spermaceti. Como o antecedente.  
 112 Banha de Porco. Unguento.  
 a Linimento simples E.  
 b Unguento de Banha. L.  
 c ——— simp. E.  
 d ——— de Spermaceti. L. D.  
 113 Cêra. Amarella e Branca.  
 Emulção, Unguento, etc.  
 Na Diarrhea, dysenteria, Ulceras.  
 7 Oleo commun. Linimento, etc., e no interno.

- 114 Althea. Raiz para cozimento *ad libitum*.  
*a* Xarope de Althea,  
 115 Amendoas doces, e amargas, Fructo, e Oleo es-  
 presso.  
*a* Emulção de Amendoas. E.  
 Leite de Amendoas. L. D. *ad libit*.  
 Nas Febres, Pneumonia, Catarrho, etc.  
*b* Oleo de Amendoas commum.  
 116. Alcatira Gomma. Pós. Solução *ad libit*.  
*a* Mucilagem de Alcatira. E L. D.  
*b* Pós de Alcatira compostos. L. de oitava 1 ate 4.  
 117. Aven. Semente para infusão *ad libitum*.  
 Nas Febres, Pneumonia, Dysenteria, Catarrho, Diar-  
 rhea.  
 118. Alcaçuz. Raiz. Pós, Cozimento,  
 Succo espesso.  
*a* Trociscos de Alcaçuz E. L. D. *ad libit*.  
 No Catarrho, etc.  
 119. Cevada- Semente. Cozimento *ad libit*.  
 120. Linhaça. Semente. Cataplasma, Infusão.  
 Oleo espesso.  
*a* Oleo de Linhaça recente. E. L. D. de onça 1 ate 3.  
 Na Pneumonia, Dysenteria, Neuphritis, Hemoptisia.  
 121. Malvas. Folhas para Cozimento.  
 122. Gomma Arabia. Pós, Solução. *ad libit*.  
*a* Mucilagem de Gomma Arabia. E. L. D. *ad libitum*.  
*b* Emulção de Gomma Arabia. L. D. *ad libit*.  
*c* Trociscos gommozos. E.  
 No Catarrho, Pneumonia, Diarrhea, Blenorrrhea.  
 123. Trigo. Semente.  
*a* Mucilagem de Gomma de Trigo. E. D. *ad libitum*.  
*b* Trociscos de Gomma de Trigo. L. *ad libit*.  
 124. Selepo. Raiz.  
 125. Sagú.  
 126. Musgo Islandico.  
 127. Uvas passadas. Cozimento, *ad libit*.

FORMULAS.

97. *Emulção de Oleo de Amendoas.*

R..... Oleo de Amendoas                      onça huma.  
           Gomma Arabia                              onça meia.  
           Agua                                              onças oito,  
 Misture-se por trituração, e junte se-lhe  
           Agua de Ammoniacco                      gottas quinze.  
           Tintura de Opio                              gottas vinte e quatro.  
           Xarope Balsamico                              onça meia.  
 Misture para tomar huma colher de meza por trez  
 ou quatro vezes no dia.

Ne Catarrho. Pneumonia.

98. *Pós de Gomma Arabia com Gomma de Trigo.*

R..... Pós de Gomma Arabia                      oitava meia.  
           Gomma de Trigo                              grãos dez.  
           Assucar                                              escrupulo hum.

Misture, e forme pós para se dar com frequencia às  
 crianças.

99. *Mistura de Cera.*

R..... Cera branca ou amarella                      oitavas trez,  
           Sabão duro                                      oitava huma.  
           Agua commun                                      onça huma.  
 Deite-se a fogo brando em varo de ferro mexendo-se  
 com espátula de pão, depois deite-se em hum gral, e  
 junte-se-lhe pouco a pouco.

Agua commun                                              libras duas.  
 Xaropo de Althea                                      }  
 Alcool de Canella                                      } anã onça huma.

Misture triturando muito bem para se dar depois aos  
 copos de onças trez até quatro.

100. *Mistura de Spermacete.*

R.....	Spermacete	oitavas trez
	Mucilagem de Gomma Arabia	onça huma.
	Triture-se tudo muito bem, e se lhe junte	
	Agua	onças quatro.
	Xarope de Papoulas somniferas	onça meia.

Para tomar huma colher de meza por trez ou quatro vezes no dia.

No Catarrho, Pneumonia, Hemoptisis.

101. *Electuario de Rosas com Actido Sulfurico.*

R. —	Conserva de Rosas	onça huma.
	Acido Sulfurico	gotas dez.
	Oleo de Amendoas	} anã onça huma.
	Xarope de Dormideiras	

Misture forme electnario.

Para tomar huma colherinha com frequencia mormente, quando a tosse for importuna.

102. *Gelea de Salepo.*

*Ad libit.*

103. *Cozimento de Musgo Islandico.*

De onças trez.  
Sua gelea de onça huma até duas.

104. *Clyster de infusão de Linhaça com Tintura de Opio.*

R.....	Infusão de Linhaça	onças dez.
	Tintura de Opio.	got. trinta.

Misture para Clyster.

Algumas vezes convem juntar-lhe Oleo de Amendoas doces onça meia até huma.

Para se dar de 6 - 8 horas.

105. *Clyster de Leite com Opio.*

<b>R.</b> —	Leite morno	onças seis.
	Opio puro	grãos dois.
	Mucilagem de Gomma Arabia	onça meia.
	Forme Clyster.	
	Nas Hemorrhoides, Tenesmo, etc.	

106. *Cataplasma de Linhaça.*

<b>R.</b> .....	Farinha de Linhaça	onças trez.
	Banha de porco	onça huma.
	Agua fervendo	q. b.
	Forme cataplasma.	

CLASSE X.

*Refrigerantes.*

1. *Animaes.*

26. Acido acetoso. Diluido.

Nó externo. *ad libit.*

*a* Acetito de Potassa oitavas duas.

Para huma libra de agua no dia.

*b* Acetato de Ammoniacó liquido onça meia frequente-  
mente.

Nas Febres. Flegmacias.

38 Tartrito acidulo de Potassa.

Dissolvido *ad libit.*

70. Tamarindos. Fructo. *ad libit.*

Nas Febres.

131. Limão. Fructo, Succo recente.

*a* Xarope de Limão. L. D.

Nas Febres.

132. Laranja. Succo recente.

133. Cochlearia. E. D. C. L. Herva, e Succo recente.

*a* Succo de Cochlearia composta E. L. *ad libit.*



No scorbuto.

135. Amoras de Silva. Fruto.

a Seu Xarepe L.

136. Azedas. Herva Succo.

a Sua Conserva. D. L.

137. Cynosbato.

a Conserva. L. E.

138. Azedas. Folhas.

139. Nastruços. Herva.

No scorbuto.

## 2. Mineraes.

12. Zinco.

a Sulfato de Zinco. Para banho no externo.

61. Nitrato de Potassa.

a Acido nitroso de oitava 1 até 2 diluido em agua  
libra 1 por dia

Nas Febres. etc.

b Alcool nitrico de gottas 30 até oitava 1.

c Trociscos de Nitrato de Potassa. E. L.

Nas Febres, Phlegmacia. Hemorrhagia. Mania.

89. Murato de Soda.

a Acido muriatico de gottas 20 ate 40 diluido.

Nas Febres.

144. Acido Sulfurico.

a Acido Sulfurico diluido. E. L. D. como acima.

Nas Febres, Hemorrhagia.

145. Chumbo.

a Acetito de Chumbo. E. } no interno mas com  
Aliviado acetado L. D. } toda a cautella.

b Agua de Lithargirio acetada. } no externo.  
Lleor de Lithargirio acetado. }

c Agua de Lithargirio acetada composta. L.

d Unguento de Acetito de Chumbo E.

e Ceroto de Lithargirio acetado composto. D.

Nas Phlegmacias, etc.

# FORMULAS.

## 107. *Colirio de Acetito de Chumbo.*

R. — Acetito de Chumbo grãos quatro.  
 Agua rosada onças quatro  
 Misture.  
 Na Ophtalmia inflammatoria.

## 108. *Colirio de Acetito de Ammoniac.*

R..... Acetito de Ammoniac  
 Agua rosada ana onças duas.  
 Para se usar na Ophtalmia.

## 109. *Pós de Nitrato de Potassa com Tartrito acidulo de Potassa.*

R. .... Nitrato de Potassa grãos dez.  
 Tartrito acidulo de Potassa. escropulo hum.

Dose que deve tomar-se tres ou quatro vezes no dia.  
 Na Phlegmacia. Hemorrhoides. Ardor dasouri-

nas.

## 110. *Mistura de Acido Muriatico.*

R. .... Acido muriatico oitava huma.  
 Xarope de Limão ou de Amoras  
 Agua destillada onça huma.  
 onças sete.

Misture para se tomarem trez ou quatro colheres  
 de quatro ou de cinco a cinco horas.

## 111. *Mistura salina ou effervescente.*

R. — Carbonato de Potassa escropulo hum.  
 Agua onça huma.  
 Dissolva-se, deixe-se assentar, e coe-se.

R, ..... Cumo de Limão recente onça meia.

Xarope commum  
 Agua

} anã oitavas duas.

Misture-se, e tomada primeiro a solução do Carbonato de Potassa deverá logo dar-se a sobredita limonada.

112. *Epitema de Muriato de Ammoniaco.*

R. .... Muriato de Ammoniaco em p6 onça huma.  
 Acido acetico onças duas.  
 Agua onças doze.  
 Misture.

113. *Cataplasma de Chumbo Acetada.*

R. .... Cataplasma de miolo de pão libra huma.  
 Acetato de Chumbo onça huma.  
 Misture.

114. *Colirio de Sulfato de Zinco, e de Alluminia.*

Vejão-se Astringentes.

N. B Nesta Classe tamhem se comprehendem, Agõa fria, Ar frio, Sangrias, Sarjas, Bixas, Catharticos.

CLASSE XI.

*Astringentes.*

1. *Vegetaes.*

146 Pão Campeche. Para cozimento.

a Seu extracto L. D. E. de grãos 10 até 30.

147 Kino. Pds. Solução.

De grãos 15 até 30.

Sua tintura E. D. oitavas 1 até 2.

148 Catho.

Extracto. Pds. Solução de escropulo 1 até oitava meia.

- a Sua Infusão. E de onça meia até 1 e meia.
- b Sua Tintora E. L. oitava 1 até 3.
- c Seu Electuario. E. composto D. de escropulos 2 até 4
- Na Diarrhea, Dysenteria.
- 149 Bistorta. Raiz  
Pós de oitava meia até 1
- 150 Sangue de Drago. Resina.
- 151 Balaustrias. Cozimento para gargarejo.
- 152 Galba. Pós, Infusão, Unguento.
- 153 Carvalho. Casca. Cozimento para o externo.  
Na Escarlatina, Angina, Relaxação da Uvula.
- 154 Rosas vermelhas. Infusão, Conserva *ad libitum*.  
Seu Xarope.  
Mel.  
Nas Hemorrhagias, Cinanche.
- 155 Tormetilla. Raiz para Cozimento de onça meia até 1.

## 2. Mineraes

- 10 Sulfato de Cobre de grão meio até 1 por duas ou trez vezes no dia.  
Nas Febres intermittentes.  
Para Injecções, Banhos, Colirios.
- a Solução de Sulfato de Cobre. E.
- b Licor de Cobre ammoniacal. D.  
Agua de Cobre ammoniacal.  
Na Ophthalmia. Gonorrhea.
- 12 Zinco.
- a Sulfato de Zinco grãos 2 até 5, por duas ou trez vezes no dia.  
Nas Febres intermittentes.
- b Solução de Acetito de Zinco. Colirio, Injecção.
- c Agua de Zinco vitriolada com Camphora L.  
Na Ophthalmia, Gonorrhea, Blenorragia.
- 100 Ferro.
- Tintura de Ferro muriatica gottas 10. até 20 por trez vezes no dia.
- Na Menorrhagia por debilidade.
- 145. Chumbo.

- a* Acetato de Chumbo.  
**159.** Sulfato de Alumina, E. L. D.  
 Pós, Solução de grãos 5 até 15.  
 No externo para Gargarejo, Banho,  
*a* Sulfato de Alumina calcinado.  
*b* Pós de Sulfato de Alumina compostos E. de grãos  
 16 até 30.  
*c* Cataplasma aluminosa. L.  
 Na Ophthalmia.  
*d* Agua aluminosa composta. L. para banho.

### FORMULAS,

#### 115 Pós de Casca de Carvalho com Macella.

R..... Casca de Carvalho em pó	oitava meia.
Flor de Macella em pó	escrop. hum.

Misture, e forme pós para tomar de duas, ou de  
 trez a trez horas, em quanto dura a Pyrexia.  
 Nas Febres intermittentes.

#### 116. Pillulas de Extracto de Pão Campeche com Rhuibarbo.

R..... Extracto de Campeche	oitava huma.
Rhuibarbo em pó	oitava huma.
Opio puro	grãos trez.
Xarope	q. q.

Para formar pillulas mediocres de que se haverão de  
 tomar trez ou quatro por duas ou trez vezes no dia.

#### 117. Mistura de Gomma Kino.

R..... Kino	oitavas duas.
Gomma Arabia	oitava huma,
Xarope de Papoulas somniferas	onça huma e meia

Misture para se tomar huma colherinha por duas ou  
 trez vezes no dia.



118. *Mistura de Greda com Tintura de Catho.*

R..... Mistura de Greda	onças sete.
Tintura de Catho	onça huma.

Mistura para se tomarem trez colheres de quatro a quatro horas, e huma depois de cada jacto, vascolejando primeiro a garrata.

117. *Electuario de Catho com Magnezia.*

R. — Catho em pó	oitava huma.
Magnezia	oitavas duas.
Conserva de Rosas	} aná ouça huma.
— de casca de Laranja.	

Misture, e forme electuario para tomar huma colher de chá de trez ou de quatro a quatro horas.

Na Diarrhea com debilidade de intestinos.

120. *Gargurejo Galhozo.*

R. — Pós de Galha	oitava meia.
Agua fervendo	noças oito.

Infunda-se por huma hora, coe-se, e á coadura junte.

Mel despumado	onça meia.
Vinho optimo do Porto	onça huma.

Para gargarejar trez ou quatro vezes no dia.

Na relaxação da Uvula.

121. *Cozimento de Casca de Carvalho com Sulphato de Alumina.*

R. — Casca de Carvalho	onça huma.
Agua	q. b.

Para fazer cozimento para libra huma.

Sulfato de Alumina oitava meia.  
 Alcool brando onças duas.  
 Algumas vezes convem juntar-lhe em lugar de Al.  
 Kool:

Tintura de Catho onça huma.  
 Para se applicar frio à parte affecta por trez ou quatro  
 vezes no dia.

Na Menorrhagia, Hemorrhoides. Como gargarejo he  
 applicada nas inchações attonicas da Uvula e Amigdalas.

122. *Infusão de Rosas acidula com Tintura de  
 Kino.*

R.— Infusão de Rosas onças sete.  
 Acido sulfurico alkoolizado oitava meia.  
 Tintura de Kino - - - - -  
 Xarope de Papoulas somniferas anã onça meia.  
 Misture para tomar trez colheres de quatro a quatro  
 horas.

123. *Pillulas de Acetato de Chumbo.*

R.— Acetato de Chumbo grão meio.  
 Miolo de pão grãos quatro.  
 Tintura de Oplo gottas duas.

Misturê forme pillulas para tomar de quatro a quatro  
 horas.

Na Hemorrhagia do bofe, utero, e nariz.

124. *Solução de Sulfato de Zinco.*

R.— Sulfato de Zinco grãos doze.  
 Agua destillada onças trez.

Para tomar huma terça parte por trez vezes no dia,  
 augmentando a dose se o caso o pedir. e se o ventriculo  
 o supportar.

126. *Soro de Leite Aluminoso.*

Na dose de duas até trez onças.  
Na Diabetes.

125. *Unguento de Sulfato de Zinco.*

R.— Sulfato de Zinco                      escrop. hum.  
Banha                                      oitavas duas.

Misture-se, e com hum pincel se applique ao olho affecto á noite e pela manhã.

126. *Injecção de Acetato de Chumbo.*

R..... Acetato de Chumbo                      escrop. hum.  
Agua destillada                      onças oito.  
Na Gonorrhœa.

127. *Injecção de Sulfato de Zinco, e de Alumina.*  
Como acima.

128. *Colirio de Sulfato de Zinco com Camphora.*

R..... Sulfato de Zinco                      escrop. hum.  
Alcool Camphorado                      oitava hum.  
Agua destillada.                      onças oito.  
Misture.

129. *Colirio de Acetato do Chumbo, de Sulfato de Alumina.*

CLASSE XII.

*Tônicos.*

2. Macella de grãos 10 até escroptulo 1.

Flores de infusão onça meia para libra 1.

4. Cardo Santo. Infusão.

19. Marroios vulgares para Infusão.

20. Myrrha. Pós, Pillulas de grãos 10 até 20.

21. Pós compostos de grãos 20 até 30.

31. Contra herba.

Seus pds compostos. E. de grãos 20 até 30.

130. Vinho optimo do Porto

160. Castanheiro da India. Casca.

Seus pds de oitava meia até escrupulos 2.

Para cosimento de onça 1 para libra huma.

161. Angostura. Casca.

Seus pds de grãos 15 até oitava meia.

162. Centaurea menor. Sumidades.

Infusão.

163. Gençiana Branca.

Seus pds de oitava meia até escrupulos 2.

Sua infusão de onças 3 até 4.

164. Salgueiro. Casca.

Pds de oitava meia até escrupulos 2.

Para tomar de quatro a quatro horas.

Nas febres intermitentes.

165. Quina. Casca.

Pds de oitava meia até 2.

Eleuario. Enema de oitava 1 até 3

a Infusão. E. de onças 2 até 4.

b Cozimento de onças 3 até 6.

c Tinctura E. L. D. de oitava meia até 1.

d Dita composta L. D. de oitavas 3 até 6.

e Dita alta Ammoniatada de oitava meia até 1.

f Extracto E. L. E. de grãos 10 até 20.

Nas Febres, Rheumatismo, Odontalgia, Catarrho febril, Bienorrhœa, Dysenteria, Erysipela, Scarlatina, Hemoptisis, Menorrhagia, Dyspepsia, Hypochondria, Asthenia, Spasmos, Hydropsia.

N. B. Para fazer menos ingrato o sabor da Quina, a que algumas pessôas tem aversão invencivel, tem sido recommendados muitos liquidos mucilaginosos doces, como da raiz de Alcaçuz recommendada por Lewis, mas a pratica descobriu que o leite corresponde melhor, como diz o Doutor Lind. Para o que misturados os pds da Quina com o leite devem no mesmo instante ser engulidos para que aliás não communicem o sabor ao leite. Outros porém mandão tomar os pds em Caffe fino, e adocado com assucar, o que não só lhe disfarça o gosto mas deixa que os pds assentem no es-  
tomago com maior brevidade.



Em casos urgentes, especialmente quando pela qualidade das intermittentes, taes como tercenas quotidianas ou doubles, os intervallos entre os paroxysmos são curtos, podem ter lugar doses maiores como oitenta e meia, ou duas de hora a hora. O estomago neste caso será o melhor guia, o mais seguro será dar tanta quantidade, quanta elle possa supportar, tipets segundo Torti, e outros quanto maiores, e mais frequentes forem as doses, tanto maior será a força do remedio em suspender o paroxysmo e tanto menor será a quantidade que da mesma Quina tomará o doente para melhorar, sendo alias certo que tomadas aos pòs em doses pequenas pela diuturnidade da molestia vem a formar quantidade muito superior, sem produzir o effeito desejado.

A quantidade necessaria para suspender os paroxysmos, differença, segundo a qualidade da intermittente; segundo o periodo da molestia em que he applicada; e segundo a qualidade do mesmo remedio que nem sempre he igualmente bom, de ordinario são necessarias duas onças, e mais.

Os Practicos de melhor nota concordão em que nestas febres vale muito anticipar a administração do remedio, e não perder tempo como se fazia antigamente no uso de remedios preparatorios, esperando até que a molestia tenha passado por diversos periodos. Todas as preparações agora necessarias, consistem na limpeza de primeiras vias, por meio de hum emetico e purgante; e logo recorre-se à Casca Peruviana, ou quando muito notando-se superabundancia de bile com apparencias de obstrucção no fígado são usadas pequenas doses de Calomelanos, e algumas vezes se continuão até produzir branda salivação; porém quando os doentes sejam muito fracos, e os paroxysmos muito violentos, como acontece nos climas quentes, nem a amarellez da pelle, nem a obstrucção do fígado devem intimidar o practico para que immediatamente não receite a Quina, como judiciosamente notou o Doutor Cleghorn; este remedio ainda meizo em taes circumstancias he do maior proveito, porque livre da molestia subita, e ganha tempo para que outros remedios de mistura com elle venhão a completar a curação; e como o mesmo author affirma, peiores consequencias podem



seguir-se de administrar a Quina tarde, do que cedo. No estado em que o doente não pôde soffrer os evacuantes por si só, e apesar disso os symptomas particulares lhe indicão o proveito, elles podem ser administrados juntamente com a Quina, de cujas receitas adiante daremos copia

Ainda que muitos practicos se aventurem nos casos de maior urgencia, a dar a Quina no estado da febre, com tudo concordão geralmente em que o tempo proprio he o da intermissão, ainda que se apartão huus de outros pensando os primeiros ser melhor administra-la immediatamente no fim do paroxysmo da febre, os segundos quando está proximo ao paroxysmo frio. Cullen ainda que se administre a Quina em doses grandes o mais proximo que seja possivel ao tempo do accesso; o mesmo seguiu Torti. Alguns escriptores modernos como Wërthoff, Home e Baumes corroborando o que havia ensinado Morton acharão que a Quina correspondia melhor empregando-a immediatamente, que termina o paroxysmo da febre, e continuando-lhe o uso por todo o tempo da intermissão até chegar o paroxysmo do frio. Desta maneira pôde o doente tomar porção muito mais avantejada, e assim parece que mais provavelmente poderá embraçar-se a recencia dos paroxysmos, e particularmente a recabida. Seja qual for o methodo que se adopte, sera, fallando em geral, muito conveniente continuar no uso do mesmo remedio, se bem que em doses menores, e por intervallos mais largos, e isto por algum tempo depois de extirpados os paroxysmos, afim de obstar à recabida. Para que a Quina não seja logo expellida pelo curso, e se demore mais no estomago, será muitas vezes necessario juntar-lhe aromaticos, e opiatos, e estas em muitos casos hão de contribuir não pouco para o bom effeito da Quina, e adiante se verão, quando tratarmos dos Narcoticos.

165. Calumba. Raz.

Pós de grãos 5 até 20.

Inusão oitavas 3 para libra 1.

166. Cascarrilha. Casca.

Pós de eserepulo 1 até oitava 1.

a Sua Infusão L. D. de oitavas 2 até 6.

- b Extracto L. D. de grãos 10 até 20.  
 167. Genciana. Raiz.  
 a Infusão composta. E. de onça meia até 1.  
 d. D. de oitavas 6 até 12.  
 d. L. de onças 2 até 4.  
 b Tintura composta E, L. de oitavas 2 até 6.  
 c Vinho composto E. onça 1 até 2.  
 d Extracto L. D. de grãos 10 até 30.  
 168. Trifolio Fibrino.  
 Infusão de onça meia para libra 1.  
 169. Quacia. Lenho. Casca. Raiz.  
 Infusão de oitava meia até 2 para libra 1.  
 170. Simarouba Casca.  
 Para Cozimento oitavas 2 para libra 1.  
 171. Tanacet. Folhas. Flores.  
 Infusão.  
 Nas lombrigas.

## 2. Mineraes.

10. Sulfato de Cobre de grão 1 até 3.  
 Nas Febres intermitentes.  
 o Cobre Ammoniacal L. grão meio por duas ou tres  
 vezes no dia.  
 d Pillulas de Cobre Ammoniacal E. N.º 1.  
 Na Epilepsia.  
 12. Zinco.  
 a Sulfato de Zinco de grãos 2 até 5 por duas ou tres  
 vezes no dia.  
 Nas Febres intermitentes na Epilepsia.  
 b Solução de Sulfato de Zinco E. no externo.  
 c Oxyda de Zinco E. grão 1 por duas ou tres vezes  
 no dia.  
 Na Epilepsia.  
 61. Nitrato de Potassa.  
 Acido nitrico de gottas 30 até 40.  
 90. Sulfato de Magnezia.  
 Solução de oitavas 2 por duas vezes no dia.  
 100. Ferro.  
 a Carbonato de Ferro de escropulo 1 até oitava huma.

- b** Precipitado de grãos 5 até 15.  
**c** Aguas minerais ferruginezas libra meia, duas ou tres vezes no dia.  
**d** Sulfato de ferro de grão 1. até 6.  
**e** Vinho de Ferro de oitavas 2 até 6 por duas vezes no dia.  
**f** Tintura de Ferro muríatica de gottas 10. até 30. duas vezes no dia.  
**g** Sulfato de ferro dessecado E.  
**h** Oxyda de ferro E.  
**i** Emplasto oxydado de ferro rubro E.  
**k** Limalha de ferro purificado E.  
**l** Oxyda de ferro negro purificado E.  
**m** Muriato de Ammonia e ferro E.  $\left. \begin{array}{l} 2 \text{ de grãos } 3 \\ \text{até } 10. \end{array} \right\}$   
 Ferro ammoniacal L.  
**n** Tintura de ferro ammoniacal L. de gotas 10 até 30.  
**o** Tartrito de ferro, e de Potassa E.  $\left. \begin{array}{l} 2 \text{ de gr. } 10 \\ \text{até } 30. \end{array} \right\}$   
 Ferro tartarizado L.  
**p** Tintura de Ferro acetada D. de gottas 20 até 40.  
 Na Dispepsia, Hypochondria, Asthenia Hydropesia, Chlorosis, Tisica, Lombrigas.  
 144. Acido sulfurico.  
**a** Acido sulfurico diluido de gottas 20 até 40.  
**b** Acido sulfurico aromatico E. de gottas 10 até 20 por duas ou tres vezes no dia.  
 Na Dyspepsia, etc.  
 175 Prata.  
**a** Nitrato de Prata E.  
 Prata nitrada. L D. da oitava parte de hum grão até hum quarto de grão, por duas vezes no dia.  
 176. Arsenico.  
 Oxyda branca, ou Acido arsenical.  
 Para solução.  
 177. Carbonato de Barita. Veja-se Sulfato de Barita.  
 178. Carbonato de Cal.  
 Solução de Muriato de Cal E. de gottas 30 até 60 por duas ou tres vezes no dia.  
 Nas Scrofulas, Scirrho, etc.  
 179. Sulfato de Barita.

Terra ponderosa.

a Muriato de Barita. E.

b Solução de Muriato de Barita. E.

De gotas 5 até 10 por duas ou trez vezes no dia.

Nas Scrofulas, Scirrho. &c.

## FORMULAS.

### 130 Pó de Quina com Sulfato de Magnezia

R. — Quina em pó sutil.

onça meia.  
oitavas seis.

Sulfato de Magnezia.

Triturem-se tudo, e reduzido a pó divide-se em quatro partes iguaes para tomar huma de duas a duas horas.

Nas Febres intermitentes.

### 131 Pó de Quina com Cravo Aromatico.

R. — Quina em pó sutil

Tartrito acidulo de Potassa

Cravo da India N.º trinta

} aná onça hu-  
ma.

Misture, e forme pó de que se dará oitava e meia de trez a trez horas.

### 132 Pó de Quina com Cascarrilha.

R. — Quina em pó

Cascarrilha

escropulos dois.  
grãos dez.

Misture para tomar por huma dose, e esta repetida de duas, de trez, ou de quatro a quatro horas em leite.

133. *Pós de Casca de Castanheiro com Gengibre.*

R. — Casca de Castanheiro da India . . .  
oitava meia.  
Gengibre em pó . . . grãos cinco.

Misture para huma dose que se deve repetir trez  
vezes no dia.

134 *Póis de Ferro Ammoniacal com Rhuibardo.*

R. —	Ferro ammoniacal	grãos cinco.
	Rhuibarho em pó	grãos seis.
	até	grãos trez.

Forme pó para tomar todos os dias em algum veu-  
culo adequado.

### Na Rachitis.

135 *Pés de Macella com Myrrha.*

R. — Macella em pó } anã escropulo hum.  
Myrrha }  
Carbonato de Potassa grãos doze.

Misture, e forme pões para tomar de seis a seis horas.

## Nas Febres intermittentes.

136 *Pillulas de Quina com Ferro.*

R.	.....	Extracto de Quina	oitava huma.
		Carbonato de Ferro precipitado	oitava meia.
		Oleo volatil de Noz muscada	gottas seis
		Xarope commun	q. b.

Para formar pillulas N.º 24 para se tomarem tres ou quatro por duas vezes no dia.

**Na Dyspepsia, &c.**



137. *Infusão de Quina composta.*

R. ....	Quina em pô grosso	onça huma.
	Agua de Canella simples	libra huma.

Vascoleje muito bem por huma hora, coe-se, e junte

Tintura de Quina composta onça huma.

Misture-se para tomar hum côpo de trez ao quartilho de trez ou de quatro a quatro horas.

138 *Infusão de Quina vinhosa composta.*

R. ....	Quina amarella em pô grosso	onças duas.
	Galbas	oitavas duas.
	Cravo da India	oitava meia.

Infunda por dois dias em vinho do Porto, libra huma; e depois em Agua destillada libra huma por huma hora, e coe-se para tomar hum côpo de trez ao quartilho, por t rez vezes no dia.

129 *Cozimento de Casca de Salgueiro composto.*

R. ....	Casca de Salgueiro	oitavas seis.
	Casca de Carvalho	oitavas duas.

Coza-se em Agua q. b., até ficar em onças dez, coe-se. A dose como acima.

140. *Clyster Quinado.*

R. —	Quina em pô tutil	oitavas duas.
	Tintura de Opio	gottas dez.
	Oleo commum	oitavas trez.
	Agua	onças seis.

Misture forme Clyster para se tomar por huma dose, e repetir-se por trez ou quatro vezes no dia, em casos

em que o estomago não soffre a Quina.

Em muitas occasiões será mais conveniente juntar em lugar do Oleo commun, huma ou duas colheres de gomma, usando antecedentemente de hum outro clyster cathartico.

o Nas Febres intermittentes.

141. *Pós de Casca de Salgueiro com Quina.*

R.---	Casca de Salgueiro em pó	escropulos dois.
	Quina amarella em pó	escropulo hum.

Misture para huma dose, e esta ser repetida de quatro a quatro horas, em quanto não sobrevem o accesso da febre.

Nas febres intermittentes.

142. *Infusão de Quacia com Tintura de Quina.*

R.---	Infusão de Quacia amarga	onças sete.
	Tintura de Quina compost.	onça huma.

Misture para se tomarem trez colheres de meza por trez vezes no dia.

Na Diapesia.

143. *Mistura de Quina com Guaiaco.*

R.....	Cozimento de Quina saturado	onças duas.
	Tintura de Guaiaco ammoniacal	oitava huma.

Misture para tomar de seis a seis horas.

No Rheumatismo chronico.

144 *Pós de Calumba com Carbonato de Ferro.*

R.....	Calumba em pó	escropulo hum.
	Carbonato de Ferro precipitado.	E. - - -
		grãos trez.
	Canella em pó	gr. cinco.

Misture forme pós para se tomarem por duas ou trez vezes no dia.

145. *Pillulas de Myrrha com Carbonato de Ferro.*

R.....	Gomma resina Myrrha	oitava huma.
	Carbonato de Ferro	oitava meia.
	Extracto de Genciana	escrop. dois.
	Oleo volatil de Noz muscada	gottas seis.

Misture, e forme pillulas N.º 24 para se tomarem duas até quatro por trez vezes no dia, bebendo em cima de cada dose huma chavena de chá de Macella.

146. *Mistura de Myrrha com Carbonato de Ferro.*

R.....	Myrrha em pó	oitava huma.
	Carbonato de Ferro precipitado	oitava meia.
	Tintura de Quina composta	onça huma.
	Agua de Hortelã pimenta	onças seis.

Misture para tomar duas ou trez colheres - de : meza por duas ou trez vezes no dia.

147. *Electuario de Quina com Carbonato de Ferro.*

R.....	Quina em pó sutil	onça huma.
	Carbonato de Ferro	onça meia.
	Conserva de casca de Laranja	oitavas seis.
	Xarope de Gengibre	q. b.

Para formar Electuario, de que se tomarà huma colherinha por quatro vezes no dia.

148. *Electuario de Quina com Macella.*

R, ...-	Quina em pó	} anã onça huma.
	Macella	
	Gengibre em pó	
	Xarope	

Para formar Electuario, de que se tomarà huma

colherinha ou duas, por trez ou quatro vezes no dia

149. *Pillulas de Oxyda de Zinco com Sulfato de Cobre Ammoniacal.*

R. —	Oxyda de Zinco	escropulo hum,
	Sulfato de Cobre ammoniacal	grãos dez.
	Extracto de Genciana	q. b.

Para formar massa que se divida em pillulas N.<sup>o</sup> 20 para tomar hum por duas vezes no dia.  
Na Epilepsia.

150. *Pillulas de Sulfato de Cobre.*

R. —	Sulfato de Cobre	grãos quatro,
	Extracto de Quina	oitava hum.
	Xarope commum	q. b.

Para formar pillulas N.<sup>o</sup> 16, de que se ha de tomar hum quatro vezes no dia.  
Nas Febres intermittentes.

151. *Pós de Sulfato de Zinco com Angustura.*

R. —	Sulfato de Zinco	grãos doze.
	Casca de Angustura em pó	oitav. duas.

Misture, e divida em papéis N.<sup>o</sup> 6, para tomar hum por trez ou quatro vezes no dia.  
Nas Febres intermittentes.

152. *Tintura de Muriato de Ferro e de Calumba.*

R. —	Tintura de Ferro Muriatica	oitav. duas.
	Tintura de Calumba	onça meia.

Misture para tomar hum colherinha por trez vezes no dia, bebendo-lhe em cima hum chavena de cha de Macella.

153. *Bolo de Carbonato de Ferro,*

R. — — Carbonato de Ferro	grãos oito.
Raiz de Gengibre	grãos seis.
Xarope	q. b.
Para formar hum bolo	

154. *Solução Arsenical.*

R..... Solução Arsenical de Swediaur gottas quatro.

Em hum copo de agua subindo gradualmente até gottas dez por trez vezes no dia.

Nas Febres intermittentes, Cephalalgia periodica, Rheumatismo chronico.

155. *Limonada Nítrica.*

R..... Acido Nitrico diluido	oitavas duas.
Agua destillada	libras duas.
Assucar	onças duas.
Misture para tomar onças quatro.	

156. *Limonada Muriatica.*

R..... Acido Muriatico	oitava huma.
Agua	onças quatorze.
Assucar	onça huma e meia.

Misture para tomar quatro colheres por seis vezes no dia.

Nos Típhos, e Escarlatina anginosa.

157. *Limonada Sulfurica.*

R..... Acido Sulfurico diluido E.	onça huma.
Agua destillada	onças vinte e quatro.
Assucar	onças duas.

Misture para tomar onças duas por vezes no dia.

N. B. O Acido Sulfurico da Pharmac. de Edimb.



aqui receitado, consiste na mistura de huma parte de Acido, e sete partes de Agua.

## CLASSE XIII.

### *Estimulantes.*

#### 1. *Animaes.*

- 1 Muriato de Ammonia.
- a Agua de Ammoniaco. E. gottas 10 até 20.  
d.<sup>a</sup> pura L.  
Licor alkalino volatil caustico. D.
- b Alcool Ammoniatado. E. gottas 20 até 40.  
Espirito de Ammonia. L.  
Alkali volatil. D.
- c Carbonato de Ammonia E. grãos 5 até 10.  
Ammonia preparada. L.  
Alkali volatil brando. D.
- d Agua de Carbonato Ammoniacal, E. grãos 20 até oitava l  
Ammonia. L.  
Licor Alkalino volatil brando. D.
- e Licor volatil de ponta de Veado. L. gottas 20 até oitava l.
- f Sal de Corno de Veado. L. grãos 10 até 20.
- g Oleo Ammoniatado. E.  
Linimento ammoniatado forte. L.
- h Linimento Ammoniatado. L.
- i Linimento volatil. D.
- z Alcool Ammoniatado aromatico. E. gottas 20 até oitava huma.  
Espirito de Ammonia composto. L.  
Alcool volatil aromatico. D.
- 7 Espirito Ammoniacal Succinado. L.
- Na Asphyxia, Spasmos, Rheumatismo, etc.
- 39 Almiscar.  
Bolo, Mistura de grãos 10 até escropulo l.  
Mistura almiscarada onça l até 2.

**No Tipho, e Gangrena.**

**46. Cantharidas.**

Belo grão 1 até 3

a Tintura de gottas 10 até 30.

b Unguento. Infusão. E.

Cantharidas. L. D.

c Cantharidas em pò. E.

d Ceroto de Cantharidas. L.

e Emplasto vesicatorio E.

Cantharidas L. D. E.

**Na Synocha, Typho, Phrenites, Cinanche, Pneumonia, Gastrites, Enterites, Rheumatismo, Odontalgia, Bexigas, Scaflatina, Apoplexia, Paralysis, Asthma, Dispnea, Tosse convulsa, Colica, Hysterismo, Hydrophobia, Mania, Ictiricia, Cegueira, Amaurosis, Ischuria.**

**2 Vegetaes.**

**Mostarda.**

Semente, e seus pòs de oitava 1 até 4.

Cataplasma L. D.

**No Rheumatismo, e Paralysis.**

13. Alho. Raiz recente.

15. Marum maculado de grãos 10 até 20 por duas vezes no dia.

Sua Censerva. L. de oitava meia até 1.

**No Rheumatismo.**

21. Herva doce. Semente.

Seu Oleo volátil de gottas 2 até 6.

**Na Dyspepsia.**

23. Beijoim.

a Acido Benjoico de grão 1 até 3.

Sua Tintura composta L. de gottas 10 até 20.

24. Alcool

a Ether sulfurico oitava meia até 1.

Nas molestias espasmodicas.

b Ether sulfurico com Alcool E.

Espirito de Ether vitriolico. L.

Licor ethereo vitriolico D.

c Ether sulfurico com Alcool comp. E.

Espirito ethereo vitriolico comp. L.

} got.  
15.  
até  
30.

- d* Oleo de Vinho. L. gottas 10 até 20.
26. Vinagre.
- e* Acido acetoso. No externo pelo nariz na Asphyxia Syncope.
- d* Acido acetoso camphorado. E. ut supra.
- e* Vinagre aromatico. E. ut supra.
29. Serpentina. Raiz.
- Pós escropulo 1 até 2.
- Sua tintura de oitavas 2 até 6
- Nos Typhos, Dyspepsia.
30. Mezerião
- Seu Cozimento de onça 1 até 2 por vezes no dia.
- Nas moléstias cutâneas Syphillitis.
41. Guaiaco. Lenho. Cozimento de onça 1 para libra I.
- Resina; Pós, Emulsão grãos 10 até 20.
- No Rhenmatismo, Syphillites, Moléstias cutâneas.
- a* Cozimento de Guaiaco onças 4 até 8 por duas vezes no dia.
- b* Sua Tintura de oitavas 2 até 4.
- c* d.<sup>a</sup> Ammoniatada de oitava 1 até 3.
43. Papoulas somníferas.
- Opio de 1 quarto de grão até 1 por doses repetidas.
- a* Tintura de Opio L. de gottas 5 até 20 do mesmo modo.
- b* d.<sup>o</sup> Camphorada de oitava 1 até 4.
- c* d. d.<sup>a</sup> ammoniatada de oitava meia até 1.
- No Typho, Dyspepsia, Tetano.
50. Rabano rustico. Raiz recente.
- Infusão.
- Alcool de Rabano composto. L. de onça 1 até 2
- Na Paralyisa.
51. Balsamo de Cupaiba de gottas 15 até 30.
57. Pinheiro Bravo.
58. d.<sup>o</sup> Manso.
- a* Oleo volatil purissimo.
- b* Unguento de Resina amarella. L. D.
- c* Ceroto de Resina amarella. L.
- d* Emplastro de Cera. D.
- d.<sup>o</sup> composto. L.

- e Unguento de pez L. D.
- f Emplasto de Pez de Burgonha.
- 92 Arnica Montana. Raiz.  
Seus Póds de escrupulo 1 até 2.  
Nos Typhos , e Paralysis.
- 93 Galbano.  
a Pillulas de Galbano compostas de grãos 15 até 20.
- b Emplasto de Galbano composto. E. L.
- 94 Sabina.  
Seu oleo volatil de gotta 1 até 4.
- 95 Opoponaco.  
Sua pillulas de grãos 2 até 5.
- 105 Eleboro branco.  
a Unguento de Eleboro L.
- b Cozimento de Eleboro. L.  
Nas molestias cutaneas.
- 106. Gengibre. Raiz.  
Seus póds de grãos 5 até 20.  
Na Gotta retrocedida , Atonia , Paralysis , Dispepsia , etc.
- a Seu Xarope de onça meia até 1.
- b Sua Tintura E. de oitavas 2 até 4.
- 180 Calamo Aromatico. Raiz.  
Seus póds.
- 181 Cardamomo menor. Semente.  
a Tintura de Cardamomo menor. L. D. E. de oitavas 2 até 4.
- b d.ª composta. L. o mesmo.
- 183 Elemi. Resina.  
unguento de Resina Elemi.
- 184 Funcho. Semente.  
Para Cozimentos , Infusão , Enema:
- a Oleo volatil de Funcho doce. D.  
Agua de Funcho doce L, de onça 1 até 3.
- 185 Angelica. Semente
- 186 Camella branca. Casca
- 187 Pimenta da India.  
Seus póds de grãos 2 até 6.  
Sua Infusão.  
Nas Febres Scarlatina , e Anginosa.

188 Carvi. Semente

Infusão. Cozimento.

a Seu óleo volatil. L. de gotta 1 até 4.

b Seu Alkool. E. L. D. de onça meia até 2  
Na Dispepsia. Colica, etc.

189 Ladano. Resina.

a Emplasto de Ladano composto.

190 Laranja, Casca, Flores, Fructo.

Infusão.

a Óleo volatil de Laranja de gottas 2 até 6.

b Sua Agua de onça 1 até 3.

c Sua Tintura L. D. onça meia até 1 e meia.

d Xarope de Casca de Laranja.

e Conserva de Casca de Laranja

191 Assafrão.

a Seu Xarope. L.

b Tintura de Assafrão E. L. de oitavas 2. até 4

192 Cravo da India.

Seu óleo volatil de gotta 1 até 2.

193 Incenso Gomma resina. Pillulas

194 Zedoaria. Raiz. Pós.

195 Alfazema Flor.

a Seu óleo volatil.

b Seu Alkool.

c d<sup>o</sup> composto de meia oitava até 1.

196 Canella Casca.

Sens Pós de grãos 5 até 15.

a Seu óleo volatil L. }  
Essencia de Canella. D. } de gottas. 1 até 2

b Agua de Canella E. L. D. de onça 1 até 3.

c Seu Alkool. E. L. D. onça meia até 1 e meia.

d Sua Tintura. E. L. D. de oitavas 2 até 4.

e d.<sup>a</sup> composta. E. L. D. de oitava 1 até 2.

f Pós aromaticos. E. L. D. de grãos 10 até 20

g Electuario aromatico. E. D. de grãos 20 até 30  
Confeição aromatica L.

197. Loureiro. Folhas, Baga, e Oleo.

No externo

198. Lobelia Syphilitica. Pós.

Na Syphilis.



199. Hortelã vulgar. Herva. Infusão.  
 a Sen Oleo volatil. L. de gottas 2 até 6.  
 b Sua Agua L. D. de onças 2 até 6.  
 c Sen Alkool. L. onça 1 até 3.
200. Hortelã pimenta. Herva. Infusão.  
 a Sua Agua. E. de onça 1 até 4.  
 d Sen Oleo volatil. E. de gotta 1 até 3.  
 c Seu Alkool. E. L. D. de oitavas 2 até 6.
201. Poejos. Herva. Infusão.  
 a Sua Agua. L. D. E. de onças 2 até 4.  
 b Seu Oleo volatil. E L. D. gottá 1 até 3.  
 c Seu Alkool. L. onça 1 até 2.
202. Noz muschada. Pds. Oleo volatil, e expresso de got-  
 tas 1 até 3.
203. Balsamo Peruviano. de gottas 10 até 30.  
 Sua Tintura de oitava 1 até 2.
204. Pimenta de Jamaica. Baga.  
 a Sua Agua. E L. de onças 2 até 6.  
 b Sen Oleo volatil. E. de gotta 1 até 3.  
 c Seu Alkool. L. D. de onça 1 até 2.
205. Pimenta Negra. Branca. e Longa.
206. Storaque purificado.
207. Balsamo Toletano.  
 a Sua Tintura.  
 b Seu Xarope.

### Mineraes.

- 45 Mercurio. Vejao-se Sylagogos.
- n Unguento de Oxyda de Mercurio rubro. E.
- o d.º de Nitrato de Mercurio. E L.
- p d.º de Nitrato de Mercurio brando. E.
- 61 Nitrato de Potassa.  
 c Seu Acido nitroso. oitava 1 por dia.  
 d Pommada oxygenada.  
 e Unguento de Acido nitroso. E.  
 Nas molestias cutaneas.
- 72 Sabão.  
 a Sua Tintura. E.

- Linimento de Sabão composto. L.  
 d.<sup>o</sup> Saponaceo.  
 No Rheumatismo.
- b Sua Tintura com Opio. E.  
 c Ceroto de Sabão, L. D.  
 d Emplasto de Sabão. L.  
 d.<sup>o</sup> Saponaceo. E. D.
- 89 Muriato de Soda.  
 a d.<sup>o</sup> dessecado, decrepitado  
 No externo na Asphixia.
144. Acido Sulfurico  
 No externo em unguento nas molestias cutaneas.  
 No interno.
176. Oxyda de Arsenico.  
 No externo, no Carcinoma.
232. Petroleo  
 Seu Oleo
233. Borato de Soda. Pós, Zaragatoa.  
 Nas aphtas.
234. Acetito de cobre. Collyrio, Unguento.  
 a Seu Oxymel. L.  
 b Unguento de Acetito de Cobre. E.
235. Cal.  
 Seu Linimento. L.  
 Na Tinha, e Queimaduras.

N. B. Nesta Classe tambem se comprehendem Gaz oxygeneo, Banhos Thermaes quentes, Banhos de vapor, Electricidade, Galbanização, Diaphoreticos, Tonicos.

## FORMULAS.

### 158. *Mistura de Camphora composta.*

R —	Mistura de Camphora	onças sete.
	Alcool de Canella . . . . .	
	Xarope de Casca de Laranja	aná onça meia.
	Acetato de Ammoniac	onças duas.

Mistura para tomar duas, ou trez colheres de meza por trez ou quatro vezes no dia.

159. *Bolo de Cantharidas com Carbonato de Ammoniaco.*

R. — Cantharidas	grão hum.
Carbonato de Ammoniaco	escr. hum.
Electuario de Opio	q. b.

Para formar hum bolo, que se deve repetir de cinco, ou de seis a seis horas, bebendo-lhe em cima infusão de Linhaça.

Na Paralysisia.

160. *Unguento de Cantharidas.*

R. — Unguento de Cêra	onça huma.
Tintura de Cantharidas, saturada de . . . . .	oitavas duas até onça meia.

Depois de derretido o Unguento, e quasi frio, se lhe mistura a Tintura, para se esfregar com huma porção a parte affectada.

Na Paralysisia,

161. *Mistura de Balsamo de Cupaiba.*

R. — Balsamo de Cupaiba	onça meia.
Mucilagem de Gomma Arabia	ouça huma.
Xarope commun	} anã onça meia
Alkool de Canella.	
Agua de Flor de Laranja	onças seis.
Misture se.	

Para tomar tres colheres de meza por tres vezes no dia.

Na Blenorrrhea.

162. *Tintura de Camphora Terebentinada,*

R. .... Tintura de Camphora . . . . .	
Oleo volatil de Terebentina	anã onça huma.

Misture para esfregar com ella muito bem as partes affectadas, ou por-lhes em cima hum panno molhado na dita Tintura por varias vezes.

Nas Queimaduras.

### 163. *Clyster Opiado.*

R. — — Opio purificado . . . . . grãos dois até dez.  
 Agua fervendo . . . . . onças duas.  
 Dissolva, e junte  
 Mucilagem de Gomma Arabia . . . . . onças duas.  
 Misture para Clyster na Colica, Tetano, e Hysterismo.

### 164. *Tintura de Serpentaria com Alcool de Canella.*

R. — ... Tintura de Serpentaria - - - - -  
 Alcool de Canella . . . . . anna onça huma.

Misture para se tomarem duas ou trez colherinhas por duas ou trez vezes no dia, em hum copo de trez ao quartilho de Infusão de Quacua.

Na Dyspepsia

### 165 *Colirio de Acetito de Chumbo*

R..... Solução de Acetito de Chumbo .. ..  
 Mistura de Camphora simples anna onças duas.  
 Tintura de Opio . . . . . oitava huma.  
 Misture.  
 Na Ophtalmia asthenica.

### 166. *Pós de Arnica com Canella.*

R..... Pós de Arnica . . . . . oitavas duas.  
 Canella em pó . . . . . oitava huma.  
 Divida-se em 6 ou 8 papeis, para se tomar de 3 ou de 4 a 4 horas em huma chavena de Infusão de Linhaça.  
 Nos Tiphos.

**167. Gargarejo de Quina composto.**

R. — Cozimento de Quina saturado                      onças sete.  
 Pimenta de Caiena em pó                      .. .. ..  
                                                                                                  escropulo hum até dois,  
 Acido acetoso diluido                                              onça huma.  
 Misture-se.  
 Na Scarlatina anginosa.

**168. Fomentação de Cosimento de Macella com Dormideiras:**

R. — Macella                                              onça huma.  
 Cabeças de Dormideiras contusas                      .. onça meia.  
 Agua                                                                                              q. b.  
 Para. fazer Cozimento para libras duas e meia.  
 Depois de frio coe-se, e juuto-se.  
 Tintura de Camphora                                              onças quatro.  
 Misture para fomentar as partes affectadas por me-  
 ia hora.  
 Na Gangrena.

**169. Colirio de Sulfato de Cobre.**

R. — Sulfato de Cobre                                              oitava huma.  
                                                                                                  até huma e meia.  
 Tintura de Camphora                                              oitava huma.  
 Agua rosada                                                                                              onças oito.

Misture, e forme Colyrio, para se applicar ao olho  
 por tres ou quatro vezes no dia.

**170. Bolo de Ferro Ammoniacal.**

R. — Ferro Ammoniacal                                              }  
       Pás de Gengibre                                              } aná grãos dez.  
       Mucilago de Gomma Arabia.                                              q. b.



Forme bolo para tomar por duas vezes no dia.  
Na Debilidade ou languidez de estomago.

171. *Mistura de Valeriana com Ammoniaco.*

R. — Valeriana em pó escropulo hum.  
Carbonato de Ammoniaco grãos quitoze.  
Agua de Canella onças duas.

Misture, e forme bebida para tomar de quatro a quatro horas.

172. *Mistura Aromatica.*

R. — Pds de Canella compostos oitava huma.  
Agua de Hortela vulgar onças oito.  
Alcool de Alfazema composto oitavas trez.  
Assucar onça meia.

Misture para tomar duas colheres de meza por trez ou quatro vezes no dia.

173. *Unguento de Oxyda de Mercurio Rubra.  
ou Ophthalmico.*

R. — Oxyda de Mercurio rubro. . . . .  
por Acido nitrico . . . . . oitava huma  
Unguento rosado . . . . . onça huma.

Misture para esfregar as palpebras huma vez á noite, outra pela manhã

174. *Pds de Oxyda de Mercurio Vermelha  
per fogo.*

R. .... Oxyda vermelha pelo fogo . . . grãos trez  
Assucar de forma . . . . . oitav. huma  
Triture-se muito bem, e junte-se  
Euxofre precipitado . . . . . oitav. huma.

Misture, e divida em papeis N.º seis para se tomar  
 hora por duas vezes no dia, bebendo-lhe em cima cozi-  
 mento de Salsa parrilha composto, ou de casca de  
 Urno.

Nas molestias psoricas.

175 *Fomentação de Muriato de Mercurio*  
*Corrossivo.*

R. — Muriato de Mercurio grãos cinco.  
 Alcool de 20 grãos onça huma.

Dissolva para se banharem os tumores venereos  
 com huma parte desta fomentação huma vez á noite,  
 e outra pela manhã, pondo-lhes depois em cima hum  
 fio secco.

176 *Pillulas de Nitrato de Prata.*

R. .... Nitrato de Prata grãos dois.  
 até grãos trez.  
 Canella em pó grãos vinte e quatra.  
 Triture-se muito bem, e junte-se-lhe.  
 Extracto de Genciana q. b.

Para formar pillulas N.º 12, de que se devem to-  
 mar huma ou duas, por duas ou trez vezes no dia.  
 Na Epilepsia.

177. *Fomentação Antiparalytica.*

R. .... Phosphoro grãos cinco.  
 Oleo commum onças quatro.

Dissolva-se em calor d'arêa no grão de agua fer-  
 vendo, para esfregar as partes affectadas duas vezes  
 no dia.

Na Paralysis

CLASSE XIV.

*Antispasmodicos.*

1. *Animaes*

- 1 Muriato de Ammonia.  
*Feijão-se Estimulantes.*
- 39 Aludicar. Pôs. Bolo.  
 De escropulo i até oitava meia.
- 73 Coroa de veado  
 Oleo animal. L. } gottas 15 até  
 Coroa de veado rectificado. D } 30
- 91 Castorio Fibrino Pôs.
- a Sua Tinctura de gottas 30 até oitava 1
- b Dita composta de gottas 20 até 40.  
 No Hysterismo.

2. *Vegetaes.*

- 5 Ipecacuanha. Raiz.  
 Sers. Pôs de grãos 3 até 6
- 6 Necessiana. Tabaco. Fumo.  
 Na Colica
- 17 Assafetida  
 Pillulas de Assafetida de grãos 10 até escropulo  
 hum.
- b Alcool Ammoniatado fetido E. }  
 Espirito d'Ammonia fetido. L. } de gottas 15 até 30  
 Dito Alkalino volatil fetido. D }
- c Pillulas de Assafetida compostas E.
- d Emplasto de Assafetida E.  
 Na hysteria, etc.
- 24 Alcool.  
 Ether sulfurico oitava meia até 2.
- 42 Camphora
- a Emulção Camphorada onças 2 até 3.
- b Mistura Camphorada onças 2 até 3
- c Tintura Camphorada. E.  
 Espirito Camphorado. L. D.  
 No externo,

- d** Linimento Camphorado. L. D.
- 43** Papoula semnifera. L. D.  
Opio Pillulas Mistura grão 1  
Linimento Clyster.
- a** Tintura d' Opio
- b** Dita d.<sup>a</sup> camphorada. L. oitava 1 até 4'
- c** Dita d.<sup>a</sup> amoniatada. E. oitava 1.
- h** Electuario Opiado grãos 5.
- i** Pillulas de Opio. L.  
Ditas opiadas grãos 10.
- 93** Galbano.  
Pillulas.
- a** Sua Tintura. L. oitava 1. até 2.
- b** Pillulas de Galbano compostas grãos 15 até 40.  
Na Hysteria.
- 130.** Vinho tinto libra 1 por dia.  
No Tetano.
- 194.** Lorangeira. Folhas.  
Seus Pós oitava meia.  
Na Convulsões.
- 236.** Lorna vulgar. L.  
Sumidades. Oleo volátil
- 237.** Carbonato de Potassa. E.  
Cinzas olaveladas. L. D.
- a** Agua de Potassa. E.  
Kali puro. L.  
Lixiria de Alkali vegetal caustico. D.  
No externo em banho para o Tetano.
- 239** Cicuta. E. L. D. Folhas.  
Seus Pós grãos 1.
- a** O succo espesso. E.  
Extracto de Cicuta L. D.
- 240.** Ferrugem de pão queimado.  
No Hysterismo.
- 241.** Meimendro. Folhas. Sementes.  
**a** Seu succo espesso. E de grãos 3 até 4.
- 242.** Valeriana. Raiz.  
Seus pós de escropulo 1 ate oitava 1 por duas, ou

tres vezes no dia.

- a Sua Tintura. L. de oitavas 2 até 4  
 b Dita Ammoniaca. E. oitavas 2.  
 c Seu Extracto resinoso. D.  
 No Histerismo, e Epilepsia.

### 3. Mineraes.

15. Mercurio.

Veja-se. Silagogos.

232. Petroleo.

a Seu Oleo L.

243. Alambre.

a Seu Oleo. E.

b d.<sup>o</sup> purissimo, E. } de gottas 10 até 20.

d d.<sup>o</sup> rectificado. L, D. }

c Seu Sal.

d Espirito de Ammonia succinado. L. gottas 30.

## FORMULAS.

### 175. *Mistura Antihysterica.*

R. — Agua de Hortelã pimenta onça huma  
 Tintura de Alfazema composta  
 Agua d'Ammoniac, anã oitava meia  
 Xarope de Gengibre oitavas duas.

Misture para se tomar o mais proximo que possa  
 ser ao paroxysmo.

No Hysterismo, e Epilepsia.

### 179. *Bolo d'Almiscar.*

R. .... Almiscar grãos dez  
 Açucar purificado escropulo hum

Triture-se tudo junto, e se lhes una  
 Carbonato de Ammoniac secco. . . . .  
 grãos oito.

Xarope

q. b.

Para formar hum bolo, o qual se repetirá de trez  
 a trez horas.



180. *Bolo de Almiscar com Camphora.*

R. .... Almiscar ..... grãos quinze.  
 Camphora dissolvida em pequena porção de  
 Alkool ..... grãos cinco  
 Xarope ..... q. b.  
 Para formar hum bolo.

181. *Clyster de Tabaco.*

R. .... Folhas de Necociana ..... oitavas duas.  
 Agua fervendo ..... libra huma

Infunda-se por 10 minutos, coe-se para hum  
 Clyster  
 Na Colica.

182. *Bolo de Castorio.*

R. .... Castorio ..... escropulo huma  
 Carbonato d' Ammoniacco secco ..... grãos cinco  
 Xarope ..... q. b.  
 Para formar hum bolo.

183. *Mistura de Assafetida.*

R. .... Succo espesso de Assafetida ..... oitava huma  
 Agua de Hortela pimenta ..... onças sete  
 Xarope Balsamico .....  
 Ether sulfurico alkoolizado ..... anã onça meia.

Misture para tomar duas colheres de meza de trez  
 a trez horas.

184. *Bebida antihysterica.*

R. .... Tintura d'Opio ..... gottas trinta.  
 atè — cincoenta  
 Alkool de Canella ..... oitavas trez  
 Xarope simples ..... oitavas duas  
 Agua destillada ..... onça huma  
 Ether sulfurico ..... oitava meia

Misture, e forme bebida para se tomar, e repetir segundo convier.

Na Epilepsia, e Hysterismo.

185. *Oleo de Alcamfor com Tintura d'Opio.*

R. — Camphora oitavas duas  
Oleo cotto 181 onça huma  
Dissolva, e junte  
Tintura d'Opio onça huma.

Misture, e forme linimento para esfregar com todo, ou metade a parte affectada no decurso do dia.

No Tetano, e Hydrophobia.

Este linimento usado em menor quantidade ha de servir para todos os casos em que seja proveitosa a fricção opiada.

186. *Pós de Quina com Valeriana.*

R. — Quina em pó onça huma  
Raiz de Valeriana oitavas duas.

Misture-se, e divida em papeis N.º 10., para se tomar hum por trez vezes no dia.

187. *Pós de Valeriana.*

R. — Valeriana em pó escropulo hum.  
Oleo volatil de Noz muscada .. ..  
gottas duas

Misture, e forme pós para se tomarem por trez ou quatro vezes no dia.

188 *Mistura de Ipecacuanha com Carbonato de Sôda.*

R. —	Agua pura	onça huma
	Xarope commum	oitavas trez.
	Carbonato de Soda	grãos vinte e quatro.
	Vinho de Ipecacuanha	oitava huma.
	Tintura de Opio	gottas seis.

Misture para dar às crianças a sexta parte de quatro a quatro horas.

Na Tossa convulsa.

189 *Clyster de Assafetida.*

R. —	Assafetida	oitavas duas.
	Gemma de ovo	onça meia
	Infusão de Herva doce.	
	Ôu de Macella	libra huma.

Misture

Na Hysteria, e Colica flatulenta.

190 *Clyster de Almiscar.*

R. —	Almiscar	grãos doze.
	Assucar	escropulos dois.
	Gomma Arabia	escropulo hum.
	Triture-se todo, e se misture	
	Caldo de Galinha	onças quatro.

Misture, e forme clyster para se administrar de trez a trez horas.

Nas Convulsões das crianças.

N. B. Nesta Classe tambem se comprehende a Electricidade, Galvanismo, Epispasticos. Tonicos, e Narcoticos.

## CLASSE XV.

*Narcoticos.*

6 Necoçiana Tabaco.

Vinho de Tabaco E. gottas 30 até oitava 1 por  
duas vezes no dia.

40 Aconito.

Seu succo espesso grão meio até 2.

43 Papoulas somniferas.

a Tintura d'Opio gottas 25 até 30.

b d.<sup>a</sup> camphorada oitavas 2 até 6

c Xarope de Opio D.

f Extracto de Papoulas somniferas E.

g Pó's Opiados. L. E. grãos 10.

h Electuario Opiado E. grãos 43.

Confeição Opiada L. grãos 36.

i Pillulas d'Opio. E. grãos 5

d.<sup>a</sup> Opadas. E. grãos 10.

Nas Febres intermittentes, Typhos, Rheumatismo, Odontalgia, Catharro, Dysenteria, Ophthalmia, Enterites, E-carlaria, Bozixas, Sarampo, Hemoptisis, Menorrhagia, Tetano, Chorea, Epilepsia, Tosse convulsa, Asthmas, Hydrophobia, Angina de peito, Hysteria, Tisica, Ictilicia, Diabetes.

53 Digitalis purpurea.

Seus Pó's grão 1 até 2.

Sua Tintura gottas 10.

Na Synocha, Ph-enitis, Idiopathica, e Hydrocephalica, Pneumonia, Tisica.

92. Arnica montana. Flores.

Seus Pó's até grãos cinco.

Na Paralysis, Convulsões, Amaurosis.

239. Cicuta. Pillulas. Pó's.

Seu succo espesso grãos 2.

241. Meimendio negro.

a Seu succo inspessado grãos 2.

b Sua Tintura. E. até oitava 1.

244. Atropa Belladona. Folhas.  
Seus Pós. até grão 1.  
245. Aconito de grão meio até grãos 4.  
246. Tabaco de meio grão ate 4 grãos.  
247. Papulas. Petalas. Infusão.  
u Seu Xarope. L. onça 1 ate 1 e meia.  
42. Camphora.  
43. Opio.

## FORMULAS.

### 191. *Pillulus de Meimendro.*

R.— Extracto de Meimendro.      eseropulo meio.  
Alcaçuz.      eseropulo hum.  
Xarope      q. b.

Para formar pillulas N.º 10., de que se darão huma, ou duas pela manhã, e à noite.

Na Mania, Affecções spasmodicas, e nas molestias dolorosas.

### 192. *Mistura Anodina.*

R.— Tintura de Opio      gottas vinte.  
até — trinta  
Agua de Canella      onça huma.  
Misture para huma dose que se deve tomar ao recô-  
lher,

### 193. *Mistura de Ether com Tintura de Opio.*

R. .... Ether sulfurico.      gottas trinta.  
Tintura de Opio.      gottas quinze.  
Agua de Hortelã simples      onç. 1. e meia.

Misture para huma dose.

Nos Spasmos, Febre de qualidade typhosa.



### 194. *Mistura de Tintura de Opio com Cumo de Limão.*

R. — Tintura de Opio	gotas trinta.
Cumo de Limão recente	onça meia.
Xarope simples	oitavas duas.
Agua de Canlla	onça huma.

Misture para huma dose para doentes, a quem o opio for capaz de excitar dor de cabeça, ou nauzeamento.

### 195. *Tintura de Aconito.*

R. — Aconito folhas seccas	onça huma.
Alcoolâ dezotto grãos	onças oito

Digira-se por seis dias, e coe-se para se darem gotas trez até tilata.

Na Artrites Rheumatismo.

### 196. *Agua Ophthalmica.*

R... .. Opio purificado	grãos dois.
Agua de sulfato de Zinco com Camphora	onças duas.

Dissolva-se para usar na Ophthalmia dolorosa.

### 197. *Ceroto Antihemorrhoidal.*

R: ..... Ceroto de Spermacete	onça huma.
Tintura de Opio	onça meia
Derretido o Ceroto, e já quasi a frio junte-se-lhe a Tintura para formar o Ceroto. Algumas vezes convem juntar-lhe.	
Camphora	oitava meia.

Ou R. — Unguento Nutrito feito de fresco onça huma.

Ono puro	grãos doze.
Assatrao	oitava meia.
Camphora trituraada com Alcool	gr. dezasseis.

Nas hemorrhoides.

198. *Clyster Opiado.*

R..... Agua morna

**Tintura de Opio**

oncas seig.

ottava h. n. 2.

### Mixture.

Algumas vezes em lugar da agua morna, conven  
juntar-lhe infusão de Linhaça.

199. *Pillulas de Opio.*

**R. . . . Opio puro**

grão mejo.

até hum.

## Canela

gr. quatro.

Xarope cōm̃mum

g. h.

Para formar pillolas N.º 1.

N. B. Por humma pratica muito extensa achou o Doutor Lind, que o Opio dado no paroxysmo da calor das intermittentes, 1.<sup>o</sup> Encurta, e diminhe o paroxysmo. 2.<sup>o</sup> Em geral alivia a cabeça, applaca o calor ardente, e promove suor copioso acompanhado de humma agradável flicidez da pelle. 3.<sup>o</sup> Muitas vezes intuz hum suave, e benefico somno acompanhado de copioso suor, o que diminhe bastante a molestia. No longo uso que fez do Opio, raras vezes observou sobrevir a Hydropesia, ou a Ictericia. Se no paroxysmo o doente se achar delirante a opiata deverà demorar-se ate que recupere os sentidos. Quando o doente tinha o venre duro, e se lhe devia dar a Quina logo depois do paroxysmo, a opiata em geral era administrada em censa de duas onças de Vinho doctico. Quando se dà hum vomitorio pouco antes do paroxysmo, a administração da opiata depois d'elle, deve demorar-se até que o paroxysmo do calor tenha principiado.

Os grandes effeitos do Opio nas intermittentes e achão ainda melhor verificados por Frotter, Clark, e outros, alguns dos quaes ordenão, se tome logo antes da esperada repetição do paroxysmo na dose de quarenta gottas, e mais.

# CLASSE XVI.

## *Anthelminticos.*

### 1 *Animaes.*

1 Muriato de Ammoniaco.

a Agua de Carbonato Ammoniacal.

### 2 *Vegetaes.*

2 Macella. Pós de escropulo 1 até oitava meia por duas vezes no dia.

6 Necociana. Tabaco. Para Clyster.  
Nas Ascarides.

13 Alhos

17 Asafetida. Gomma resina. Clyster. De escropulo 1 até 2.

75 Jalapa Pós de grãos 10 até 30.

77 Escamonea. Pós de grãos 5 até escropulo 1.

a Pós compostos.

81. Eleboro de grãos 10 até 20.

86 Rhuibarbo. Pós de grãos 6 até 10, todas as noites

87 Oleo de Ricino de onça meia até 1.

Para Clyster de onça 1 até 2

88 Gomma Guta

Pillulas de grãos 5 até 15

Na Tenia

88 Arruda. Infusão. Clyster.

Oleo volatil d' Arruda gottas 3 até 6.

174 Tenaceto vulgar. Flores. Pós escropulo 1 até 2.

242 Valeriana. Officinal. Raiz.

Seus pós oitava 1

250 Artemiza. E. L. D. Semente.

Seus Pós de oitava meia até escropulos 2 por duas vezes no dia.

253 Polypodio. E. L. D. Raiz.

Seus Pós de oitavas 3 até 3

Na Tenia

284 Spigelia Marilandica. E. Raiz.

Seus Pós de grãos 10 até escropulos 2.

### 3 Mineraes.

46 Mercurio.

Amalgamado com Estanho.

Muriato de Mercurio de grãos 3 até 10

98 Muriato de Soda de oitava meia até onça 1,

100 Ferro.

a Carbonato de Ferro de grãos 10 até 30.

d Sulfato de Ferro de grãos 3 até 10.

k Limage de Ferro purificada de oitava meia até 1.

q Tarcito de Ferro e Potassa de grãos 10 até escropulo 1

255 Cal.

Agua de Cal. D. E. L. Clyster.

Nas Ascarides.

256 Estanho. Pós. L. de onça meia até 1

Na Tenia, e Lombrigas.

## FORMULAS.

200 Pós de Rhuibarbo com Mercurio doce

R. — Rhuibarbo em pó oitava meia  
Muriato de Mercurio doce grãos doze.

Forme pós para uma dose nas Lombrigas, e Febres biliosas.

201 Pós de Escamonea com Jalapa.

R. — Escamonea .. .. } ana grãos cinco  
Jalapa .. .. }  
Muriato de Mercurio grãos trez.  
Sulfato de Potassa grãos dez.

Triture-se, e reduza-se a pó para se tomar à noite, de trez ou de quatro a quatro dias, e repetir-se trez vezes.

### 203 Pó de Espigella.

R. — Raiz de Espigella Marilandica em pó  
Semente contra vermes até grãos quinze.  
Muriato de Mercúrio doce até escropulo hum grãos trez.

Misture para se tomar pela manhã de trez a trez dias.

### 203 Pó de Carbonato de Ferro com Canella.

R. — Carbonato de Ferro escropulo hum  
Canella em pó grãos dois

Misture e forme pó para se tomar todas as manhãs em jejum.

### 203 Bolo de Muriato de Mercurio doce.

R. — Muriato de Mercurio doce grãos oito.  
Oleo volatil de Arruda gottas duas.  
Opio. grão hum.  
Xarope. q. b.

Para formar bolo.

Para tomar ao recolher, e repetir-se segundo convenha.

### 204 Electuario de Estanho.

R. — Estanho em pó onças trez.  
Xarope commun q. b.

Forme Electuario para tomar huma ou duas colheres



de meza pela manhã.  
Na Tenia.

### 205 *Clyster Camphorada.*

R. — Camphera oitava, huma.  
Oleo commun onças duas.

Misture para tomar ao recolher de trez a trez dias, o que se repetirá por trez vezes : depois se repetirá de dois a dois dias, até quatro vezes, se tanto for necessario.

Nas Ascarides

## CLASSE XVII.

### *Chymicos*

#### 1. *Animaes.*

Murlato de Ammoniac

- a Agua de Ammonia gottas 10 até 15.
- c Carbonato de Ammonia grãos 5 até 15.
- d Agua de Carbonato de Ammonia gottas 20 até 40.
- f Sal de corno de veado grãos 5 até 12.

Na Cardealgia : e em certos venenos metalicos.

73. Corão de veado queimado. L.

Phosphato de Cal. E. de grãos 10 até 20.

Por duas vezes no dia.

225. Coral vermelho preparado oitava meia até 2.

229. Conchas de Ostras preparadas, o mesmo.

260. Olhos de Carangueijo preparados de oitava meia até 1.

Seus Pds compostos. L. de escropulo 1 até 2.

Na Diarrhea.

261. Esponja queimada o mesmo.

Nas Scrophulas.

2. *Vegetaes.*

237. Carbonato de Potassa impuro.

a Agua de Potassa.

b Potassa. E. No externo.

Kali puro. L.

Alkali vegetal caustico. D.

c Potassa com Cal. E.

Cal com Kali puro. L.

Caustico brando. D.

d Carbonato de Potassa. E. grãos 10.

Kali preparado. L.

Alkali vegetal brando. D.

e Carbonato de Potassa purissimo. E. grãos 10.

f Agua de Carbonato de Potassa gottas 30.

Dita de Kali. L.

Lexivia branda. D.

g Licor de Alkali vegetal muito brando. D. onças 4  
por vezes no dia.

Agua mephitica alkalina.

Na Cardialgia. Pedra na bexiga.

3. *Mineraes.*

10. Sulfato de Cobre. No externo.

Nas ulceras, etc.

11. Sulfureto de Antimonio.

k Muriato de Antimonio. E.

Antimonio Muriatado. L.

No externo como escarotico.

24. Enxofre sublimado.

a Sulfureto de Potassa. E.

Kali sulfurado. L.

Alkali vegetal sulfurado. D.

Contra os venenos metallicos.

b Hydrosulfureto de Ammonio. E. gottas 5. até 10.

Na Diabetes.

61. Nitrato de Potassa.

Acido nitroso.

72. Sabão de Hespanha Pillulas.

Na Pedra.

89. Muriato de Soda.

Acido muriatico.

Na Pedra.

90. Sulfato de Magnezia.

a Carbonato de Magnezia oitava meia.

Magnezia alba. L. D.

b Magnezia. E escropulo I até oitava I.

Magnezia calcinada. L. D.

c Trociscos de Magnezia. L. *ad libit.*

Na Cardialgia.

144. Acido Sulfurico.

d.<sup>o</sup> d.<sup>o</sup>. diluido.

150. Sulfato de Alumina, e Potassa calcinada.

No externo para as ulceras.

176. Oxyda de Arsenico. Pós.

No externo para o Carcinoma.

255. Cal

Sua Agua

Na Dyspepsia.

271. Carbonato de Cal.

a Carbonato de Cal preparado. E. de grãos 15 até oitava I.

Greda preparada. L. D.

b Carbonato de Cal.

Seus pos compostos. E. de grãos 15 até 30.

d.<sup>o</sup> de greda compostos. L.

c Trociscos de Carbonato de Greda. E. L. *ad libitum.*

d Mistura de Carbonato de Cal onças 2 até 3.

Mistura cretacea. L.

e Agua saturada de ar fixo libra meia até 1 no dia.

263. Carbonato de Soda impuro. E.

Natráo. L.

Alkali fossil brando. D.

a Carbonato de Soda. E. 2

Natráo preparado. L. 5 grãos 10 até 30.

b Agua de Carbonato de Soda. E. libra meia. até 1 por dia.

Na Pedra.

## FORMULAS.

206. *Pós de Magnezia com Rhuibarbo.*

R.——	Magnezia	grãos dez.
	Rhuibarbo	grãos oito.
	Gengibre	grãos trez.

Misture, e forme pós para se tomar esta dose duas vezes no dia antes de comer.

207. *Mistura de Magnezia.*

R.....	Magnezia.	oitava huma.
	Agua destillada	onças seis.
	Alkool de Canel'a	onça meia.
	Agua de Ammonia	oitav. huma.

Misture para tomar duas ou tres colheres de meza, segundo convenha, ou depois de comer.

Na Cardialgia Prenhez.

208. *Pillulas de Carbonato de Soda.*

R.——	Carbonato de Soda secco, e triturado com Sabão	aná oitava huma.
	Electuario arematico	q. b.

Para formar pillulas N.º 30, para se tomarem 3 ou 4 por trez vezes no dia.

## CLASSE XVIII.

Nesta Classe se comprehendem os Remedios, que não se podem reduzir a Classe alguma das antecedentes, sendo o seu modo de obrar obscuro, e não determinado.

### 1. *Animalia.*

264. Cochonilha.

### 2. *Vegetae.*

265. Agarico.

266 Virga aurea.

### 3. *Míneraes.*

267 Carbonato de Zinco impuro.

Seu Unguento Ceroto. E. L. D.

Colirio.

268 Oxyda de Chumbo branco.

Seu Unguento.

269. Oxyda de Chumbo vermelho,

270. Oxyda de Chumbo semivitrea.

Seu emplasto.

271. Oxyda de Zinco impuro. E.

Tutia L. D. E. Unguento, e Colyrto.

d.<sup>a</sup> d.<sup>o</sup> d.<sup>o</sup> preparada. E.

Tutia preparada L. D.

Unguento de Oxyda de Zinco impuro. E.

d.<sup>o</sup> de Tutia. L. D.

Preparações Diversas.

272 Agua destillada. E.

273 Xarope simples.

274 Unguento de Sabugueiro L. D.

275 ——— de Euxofre. L.

Nas molestias de pelle.



276 Unguento de Oxyda de Zinco. E.

FORMULAS.

209 *Clyster nutritivo.*

R. — Caldo de vaca                      onças oito  
Gomma de Lebec.                      onça meia.

Misture, e forme clyster para se dar de trez a trez horas. Se o clyster não poder reter se deve accrescentar-lhe.

Tintura de Opio                      oitava huma  
Na Dyspepsia.

201 *Pós Antidysentericos.*

R. — Carvão de madeira                      escropulo hum  
Acido citrico crystalizado                      grãos cinco.

Misture, e faça pós para se tomarem por duas ou trez vezes no dia, a fim de obviar as dejecções fetidas na Dysenteria.

211 *Pós Dentifricos.*

R. — Sangue de Drágo } anã oitavas trez.  
Carvão }  
Coral vermelho, } anã oitava huma.  
Myrrha }  
Quina. } oitavas duas.

Misture, e forme pós.

212 *Pós de Sulfato de Zinco com Assucar*

R. — Sulfato de Zinco } anã oitava huma.  
Assucar crystalizado. }

Misture, e forme pós muito finos para se applicarem à cornea por meio do cano de huma penna, ou

por mello de hum pincel de cabelo, por duas ou tres  
vezes no dia, na cegueira da cornea.

**213 Unguento Antipsorico.**

R. — Enxofre sublimado libra huma.  
Sulfureto de Mercurio rubro em pó  
subtilissimo onças quatro.  
Banha de porco }  
Sabão mole } Saná libra huma.  
Oleo de Alfazema oitavas duas

Derretida a banha e o sabão, junte-se-lhe o Enxofre, e o Sulfureto bem misturados, mexa-se muito bem até esfriar, e então se lhe junta o Oleo. A sua dose he de onças quatro para os adultos, devendo esfregar-se todo o corpo ao pé do lume.

## Outro.

R. — Banha de porco onças trez  
Oxyda branca de Mercurio oitava humas  
Muriato de Mercurio corrosivo  
grãos dez.

Triture-se tudo muito bem, e forme unguento.  
para se estregar o corpo todas as noites com duas.  
onças.

## APENDIX.

*Sobre as Aguas Mineraes.*

Havendo a Chymica chegado a imitar o trabalho da natureza, na composição das Aguas Mineraes, he muito conveniente applicar os descobrimentos que nesta parte se fizerão em beneficio dos pobres, pois que só os ricos tem a commodidade de poderem tomar as ditas Aguas na sua nascente.

Com tudo, por adiantada que se considere a arte nestes descobrimentos, he certo que ainda floamos muito à quem da perfeição da natureza; e com effeito o fluido aeriforme, que se acha dissolvido nas Aguas naturaes, he mais activo, o enxofre mais attenuado, o ferro mais puro, e o calórico em combinação muito mais acertada; em huma palavra, todas as substancias salmas e terreas, que forão elaboradas pela mão do homem, não podem comparar-se com as que a natureza prepara no seu immenso laboratorio na composição das Aguas Mineraes. Ainda quando as suppozessesmos iguaes, como poderíamos assignar a cada humo o seu lugar, e o seu modo de existir?

A mesma agua que lhes serve de vehiculo, não se acha em hum estado tão homogeneo, e tão perfeito. Ora, suppondo ainda, que os resultados da analyse não mostrassem differença alguma, sempre nos ficaria o escrupulo do que as Aguas facticias padecem falta de alguma de suas partes. Em fim accrescentaremos que quasi em todos os casos a obra da natureza tem hum grão de perfeição, a que nunca os homens poderão chegar, ainda mesmo quando empreguem os mesmos materiais, e conheçam perfeitamente o processo porque ella opera.

A pezar destas considerações as aguas Mineraes artificiaes tem vantagens incontestaveis. O Practico que as receita he senhor de fixar cada dia os principios de que as quer compor, augmentar-lhes a efficacia, ou diminuir-lhes a actividade, mudando as proporções, ou

são para bebida, ou se determinem para banhos, ou em  
horcações; nem he menos de ponderar que as Aguas Mi-  
neraes naturais, só estão em uso em certas estações do  
anno, quando as facticias podem applicar-se em qualquer  
tempo do anno.

As Aguas Mineraes mais geralmente conhecidas divi-  
dem-se em quatro classes assaz vastas, a saber, Aguas  
sulfureas ou hepaticas, Aguas ferruginosas ou marciaes;  
Aguas gaseosas ou acidulas, em fim Aguas salinas. Quan-  
do menos, são estas, sobre cujas propriedades os Medicos  
reunirão maior quantidade de factos, e de observa-  
ções. Poderiamos, segundo a urgencia augmentar as pro-  
porções dos principios de que são compostas, obtendo as-  
sim remedios mais activos.

Em quanto ás Aguas Thermaes simples e compostas,  
póssivel he fazelas de todas as especies, dando antici-  
padamente a agua que deve servir de excipiente a tem-  
peratura necessaria; havendo sempre a precaução de em-  
pregar a agua destillada, e depois de a ter exposto ao  
ar atmospherico.

## AGUAS ACIDULAS.

### *Agua de Selz artificial.*

R... .. Acido Carbonico extrahido por effervescencia ..  
6 vezes o volume da Agua.

Carbonato de Cal	grãos 4.
Magnezia	grãos 2.
Carbonato de Soda	grãos 4.
Muriato de Soda.	grãos 22.
Agua destillada	onças 20.

### *Agua Alkalina Gazosa.*

R..... Acido carbonico extrahido por effervescencia ...  
6 vezes o volume da Agua.

Carbonato de Potassa	oitavas 2.
Agua destillada	onças 20.

Qu

R..... Carbonato de Soda crystalizado	oitava mela.
Agua destillada	onças 32.
Acido muriatico	q. b.

Mete-se o Carbonato de Soda em huma garrafa, e antes de se dissolverem, se lhes lance acido muriatico q. b. para saturar o Carbonato; tapa-se logo a garrafa para que o gaz que se desenvolve na effervescencia possa dissolver-se na agua. He muito conveniente determinar por huma experiencia preliminar a quantidade do acido que exige a saturação da Soda.

Ou

R..... Carbonato de Soda	scrópulos 4.
Agua pura	onças 32.
Acido sulfurico a 66.º	grãos 36.

Siga-se o processo acima.

Estas Aguas acidulas podem administrar-se, ou de per si, ou diluidas em agua, vinho, leite, etc. O seu uso he como alterantes, e refrigerantes em Bebida, Mesinha, Banho, Embrocção, Lavatorio, Fomentação, Injecção, etc São mui proprias em molestias lentas das visceras abdominaes, affecções chronicas da pelle, musculos, e nervos, etc.

### *Aguas Salinas.*

Elas comprehendem maior ou menor número de saes, entre os quaes ha alguns que predominão. As que predominao em Sulfato de Magnezia são Purgantes, e Alterantes; taes são as Aguas de Sedlitz. e Seidachutz.

### *Agua de Sedlitz artificial.*

R. —	Acido carbonico extrahido por effervescencia 5 vezes o volume da Agua.
------	---------------------------------------------------------------------------



Sulfato de Magnezia	oitavas 2.
Agua destillada.	onças 20.

*Agua de Epsom artificial.*

R. — — Sulfato de Magnezia	oitavas 2 e meia.
Agua	onças 32.

As que predominão em Muriato de Soda, são Alterantes, tal he a Agua de Balaruc.

*Agua de Balaruc artificial.*

R. — — Acido Carbonico extrahido por effervescência	2 vezes o volume da Agua.
Muriato de Soda	grãos 12.
Carbonato de Cal	grãos 4.
d <sup>o</sup> de Potassa	grãos 4.
Agua destillada	onças 20.

Ou

R. — — Acido carbonico 2 vezes o volume da Agua.	
Muriato de Soda	oitava 1 e grãos 41.
d <sup>o</sup> de Magnezia	grãos 24.
d <sup>o</sup> de Cal	grãos 12.
Sulfato de Cal	grãos 12.
Carbonato de Cal	grãos 8.
d. <sup>o</sup> de Magnezia	grão 1.
Agua destillada	onças 32.

As que predominão em Sulfato e Carbonato de Cal, são Alterantes; taes são as Aguas de Aix.

*Agua de Contrexeville artificial.*

R. — — Acido carbonico extrahido por effervescência	$\frac{1}{12}$ parte da Agua.
Sulfato de Cal	grãos 6.
Carbonato de Cal.	grãos 4.
Agua destillada	onças 20.

*Agua de Plombières artificial.*

R. ——— Acido carbonico extrahido por effervescencia.

$\frac{1}{20}$  parte do volume da Agua

Sulfato de Cal	grãos 3.
Carbonato de Cal	grãos 2.
Muriato de Magnezia	grão 1.
Agua destillada	onças 20

*Aguas Ferruginosas.*

Estas Aguas contêm carbonato acidulo de ferro, ou sulfato de ferro, e muitas vezes ambos. Ellas são ténicas, astringentes, e alterantes. Usão-se nas debilidades musculares, nervosas, gástricas, etc., na aphrodisia, na suppressão da catamenia por atonia, na chlorosis, nas scrophulas, etc.

*Agua de Bussang artificial.*

R. ——— Acido carbonico por effervescencia 3 vezes o volume da Agua.

Carbonato de Soda	grãos 6.
Carbonato de ferro	grão meio.
Agua	onças 20.

*Agua de Spa artificial.*

R. ——— Acido carbonico por effervescencia 5 vezes o volume da Agua.

Carbonato de ferro	grão meio.
do de Cal	grãos 2.
Magnezia	grãos 4.
Muriato de Soda	de rr. 1 terço.
Carbonato de Soda	grão 2
Agua destillada	onças 20

*Agua de Vichy artificial.*

R. —	Acido carbonico por effervescencia	2 vezes o volume da Agua
	Carbonato de ferro	de grão $\frac{1}{10}$
	— de Cal	grãos 2
	— de Magnesia	de grão meio.
	— de Soda	grãos 6
	Muriato de Soda	grãos 4
	Agua destillada	onças 20

As Aguas que predominão em Sulfato de ferro são tónicas, astringentes, alterantes, anthelmínticas.

*Agua ferrea artificial.*

R. —	Sulfato de ferro verde	grãos 3.
	Agua	libras 8.

As Aguas em que predominão o Sulfato e Carbonato acidulo de ferro, são como acima.

*Agua de Vals artificial.*

R. —	Acido carbonico por effervescencia,	3 vezes o volume da Agua.
	Carbonato de ferro	de grão 1 quarto.
	Sulfato de ferro	de grão meio.
	Muriato de Soda	grãos 13
	Sulfato de Aluminia	de grão meio.
	Agua destillada	onças 20

*Aguas Sulfurosas*

Estas Aguas são alterantes; convem nas molestias cutaneas chronicas, debilidade, e dores que vem em consequencia de grandes feridas; nas paralyrias, rheumatismos chronicos; affecções lentas das visceras do abdomen e do peito; syphilites inveterado, molestias causadas pelo mercurio, pelo chumbo, pelo arsenico.

### *Agua de Baréges artificial.*

R. —	Sulfur de Soda	3 partes.	
	Carbonato de soda		250 partes.
	Muriato de soda		30 partes.
	Oleo petroleo		gottas 12.
	Agua.		1000 partes.

Misture-se 10, ou 12 gottas desta solução com duas libras de agua.

Ou

R. —	Sulfur de soda	grãos 3.
	Muriato de Soda	grãos 6.
	Sulfur de Cal	grãos 3.
	Agua destillada.	libras 2.

Podemos substituir o hydrogeneo sulfurado aos sulfures de Soda e de Cal.

### *Agua sulfurea Salina.*

R. —	Agua hydrogenea sulfurada.	onças 32
	Agua de Epsom	onças 6.

Misture-se.

### *Aguas ferruginosas sulfurosas artificiaes.*

R.....	Sulfato de ferro verde	grãos 3.
	Sulfur de Soda	grãos 2
	Sulfato de Soda	grãos 12.
	Agua destillada	onças 32.

### *Aguas das Caldas da Rainha artificiaes.*

R.— Agua hydrogêneo sulfurada 6 volumes onças 28  
 Dita carbonizada de 4 volumes onças 4.  
 Sulfato de soda grãos 12.  
 Muriato de soda grãos 24.  
 Carbonato de ferro de grão um quarto.

Misture-se.

Concluiremos este artigo observando que as Aguas mine-  
 ras artificiaes, podem servir de grande utilidade aos mes-  
 mos enfermos que forão heber as aguas mineraes naturaes,  
 quando tendo voltado a suas casas não conseguirão to-  
 tal melhora da molestia, porque as forão tomar, e ne-  
 cessitão continuar-lhes o uso; pois em lugar de as fazer  
 vir da nascente, em cujo transporte, apesar de todas as  
 cantellas, sempre perdem muito de suas qualidades e ef-  
 ficacia, podemos suprilas com outras artificiaes analogas,  
 augmentando-lhes segundo convenha a proporção de se-  
 us principios. Deste modo nos serviríamos dos mesmos  
 meios, porem com mais utilidade e energia, servindo a  
 completar a cura que só tivera principio no uso das di-  
 tas Aguas na sua nascente, e na estação propria.

Não basta porem termos a mão as aguas mineraes  
 appropriadas no estado dos enfermos, he tamnem neces-  
 sario que nenhuma circumstancia estauha possa oppor-  
 se à sua efficacia, nem aggravar a enfermidade, em lugar  
 de diminui-la. Quantas nascentes em Portugal se achão  
 em lugares pouco saudaveis, bastante infectos, e cheios  
 de mil incommodos totalmente oppostas à saúde e conve-  
 niencia dos que as heben? Todos es es inconvenientes  
 podem, e devem antever se, porque as ditas aguas rendem  
 muito bem para se obviarem as incongruencias de que tal-  
 lamos. Igualmente he necessario hum passeio commodo,  
 e assez espaçoso para o exercicio tão importante, e que  
 alias serve de renhão para os doentes. A liberdade do cam-  
 po, a distracção, os movimentos da viagem; a interrupção do



necios habituaes, a mudança de ar, concorrem mais  
 para a efficacia das aguas mineraes, do que as proprias  
 aguas. Esta a razão porque os Profesores, ainda quan-  
 do reconhecão que as aguas mineraes artificiaes corres-  
 pondem em qualidades mellicidaes as que por arte se fa-  
 bricão, receitão com preferencia as naturaes, e destas  
 mesmas escolhem muitas vezes as que ficam mais de via-  
 das da morada dos enfermos, pois he tal a força da ima-  
 ginação em certas pessoas, e a preocupação em outras,  
 que avaliao a efficacia dos remedios pelo mais ou menos,  
 que lhes importão.

**DICCIONARIO NOSOLOGICO,**

**OU**

**NOMENCLATURA SYNONOMICA.**

**DAS MOL-STIAS, SYMPTOMAS, VICIOS, E AFFECÇÕES**

**DA NATUREZA**

---

Observando que os Mestres modernos se explicão com tanta brevidade, como propriedade sobre os nomes proprios das molestias, symptoms, vícios, e affecções da natureza, pareceo justo imital-os na presente Obra adoptando os mesmos termos; na esperanza de que o Publico reconheça o esforço empregado a satisfazel-o. Ninguém ignora que huma palavra só, representando com todá a clareza varias idéias, é preterivel a huma proposição no estilo didaneo.

Acampsia	Contractão , encolhimento dos nervos
Achlys	Cegueira , perda de vista
Achores	Tinha do Leite , Ozagre.
Acinastica	<i>Veja-se Synochus.</i>
Acor	<i>Veja Oxyregmia</i>
Acratia	Impotencia , falta de forças proli- ficas.
Acrochordon	Verruga , ou escrescencia de car- ne , preza por hum peque- no pê
Addephagia	Fome canina , demasiado appe- tite
Adenites	Inflamação das glandulas
Adenemphaxis	Obstrucção das glandulas
Adiapneustia	Supressão da transpiração
Adipsia	Falta de sede
Aedopsophia	Emissão sonora de flatos pelas partes genitales.
Agalactia	Falta de Leite
Agheustia	Falta de sabor , obstrucção das papillas
Agomphiasis	Dentes abalados.
Agrypnia	Vigilia , insomnia , falta de som- no.
Aipathia	Contínuo padecimento.
Alalia	Mudez , falta da falla.
Albaras	Lepra. <i>Albaras alba</i> Lepra bran- ca. <i>Albaras nigra</i> Lepra dos Gregos.
Alcolae	Aptas , Sapinhos.
Algema	Dôr
Allolalia	Modo de fallar fôra do natural.
Alotrophia	Nutrição , gordura desproporcio- nada.
Alopecia	Caimento dos cabellos , calvice.
Alphus	Lepra.

<b>Alyssa</b>	<b>Anciedade.</b>
<b>Alysmus</b>	<i>Veja</i> cardiognus.
<b>Amaurosis</b>	Gotta serena.
<b>Amblyopia</b>	Escurecimento da vista.
<b>Amenorrhœa</b>	Falta de menstruação.
<b>Amnesia</b>	Debilidade de memoria.
<b>Anaphimerino</b>	Mal, ou molestia quotidiana.
<b>Anadiplosis</b>	Frequente reduplicação da febre
<b>Anæsthesia</b>	Insensibilidade, ou falta de tacto.
<b>Anaphalantiasis</b>	Calimento dos cabellos das sobrancelhas.
<b>Anaphrodisia</b>	Falta de appetencia venerea.
<b>Anarrhopia</b>	Congestão formada nas partes superiores.
<b>Anatripsis</b>	Pizadura
<b>Anauidia</b>	<i>Veja-se</i> Aphonia.
<b>Anchilops</b>	Abcesso formado entre o angulo do olho, e do nariz.
<b>Anchylosis</b>	Regidez das juntas.
<b>Ancyloblepharo</b>	Concreção das palpebras.
<b>Ancyloglossa</b>	Demasiada extensão, e prizaõ do freio da lingua.
<b>Andromania</b>	<i>Veja</i> Nymphomania
<b>Anoca</b>	Demencia, falta de combinar as idéas
<b>Anorexya</b>	Fastio, falta de appetite.
<b>Anosmia</b>	Falta, ou perda do olfato.
<b>Antema</b>	Exanthemas.
<b>Antibacsis</b>	Ulceração de olhos crustosa, e corrosiva,
<b>Apepsia</b>	Indigestão.
<b>Aphonia</b>	Falta, ou perda da voz.
<b>Aphoria</b>	Esterilidade, ou incapacidade de gerar nas mulheres.
<b>Aphrodisia</b> molestia	Enfermidade, ou morbo galico.
<b>Aponea</b>	Perspiração embaraçada, ou perdida.
<b>Aposia</b>	Falta de sede.
<b>Apositia</b>	<i>Veja</i> Anorexya.



Aposyrma	Acção de cahir as crostas, ? ou escamas.
Apprehensão	Catalepia, ou supressão de todos os sentidos, ou movimentos voluntarios.
Apopsychia	Desmaio, Diliquio.
Apyrexia	Intermissão, ou tempo em que remette a febre.
Archoptosis	Quêda do anus.
Archosyrinx	Fistula do anus.
Aridora	Atrophia particular.
Arthrites	Gotta, Artetica.
Arthropoyosis	Veja Hydarthros.
Arthrodynia	Dor dos articulos, a este nome se juntao varios epithetos, v. g. Rodagrica, Arthritica, Rheumatica. para significar a molestia de que proeedem as dores.
Asitia	Falta de comer.
Aspermatismo	Falta, ou retenção do semen no acto venereo
Asphyxia	Falta de pulsos, morte apparente.
Assodes	Febre ardente com vomitos.
Astasia	Desassocego.
Asthenia	Debilidade de todas as forças.
Asynodia	Impossibilidade de cohabitar.
Atecnia	Falta de Luxuria, de estímulos carnaes.
Athelasma	Impossibilidade de criar, de dar mamar.
Atheroma	Inchaço tumor.
Athymia	Abatimento de Espirito.
Atonia	Frouxidão, languidez.
Atosia	Esterilidade.
Atrabile	Menlancolia.
Atrophia	Etiguidade, defecação, falta de nutrição.

Bacohia	Gotta rosada.
Ballismo	Dança de S. Vito.
Barylalia	Embaraço na falla.
Blechropyra	Veja Typhos. A este nome se jun- tão varios epithetos, v. g. Bi- liosa, Amarella, Putrida, Petea- chal, segundo as differentes es- pecies de Febres que hã.
Blennorrhagia.	Fluxo mucoso, e calido.
— do bofe	Tísica pituitosa,
— do recto	Fluxo celiaco.
— da Vagina	Flores brancas malignas.
— da bexiga	Veja Cystorrhagia.
— da uretra	Gonorrhœa maligna.
— do utero	Flores brancas calidas.
Blenorrhœa	Gonorrhœa mucosa fria, a este nome se juntão outros determi- nativos, v. g.
— do Bofe	Catarrho chronico
— do recto	Hemorroides mucosas.
— da vagina	Flores brancas benignas.
— da bexiga	Catarrho da bexiga chronico.
— da uretra	Gonorrhœa benigna.
— do utero	Veja Leucorrhœa.
Blennuria	Orina mucosa.
Blepharites	Inflamação das palpebras
Blepharoptosis	Descabimento das Palpebras
Boinhus	Zanido dos ouvidos.
Bradyspepsia	Digestão tardia.
Bradyspermatismo	Jaculação do semen retardada.
Brâcho	Rouquidão, Angina catarrhal.
Bronchocele	Papeira,
Brygmo	Ranger de dentes.
Bubonocèle	Heima inguinal.
Bulimia	Fome canina.
Cachexia	Mão habito do Corpo.
— virginea	Veja Chlorosis.
Cacolia	Bile mal disposta.

Cacochylia	Depravação da formação do chilo
Cacochymia	Mãos humores.
Cacoethes	Úlcera maligna.
Cacogalia	Constituição do Leite depravada.
Cacosphyxia	Pulso irregular.
Cacotrophia	Nutrição depravada.
Camarosis	Camaroma.
Cameração	Fractura do Craneo.
Cardiocele	Ruptura do Coração.
Cardiogmo	Dôr do Coração, Cardialgia
Cardiotrômos	Palpitações do Coração
Carditis	Inflamação do Coração, e do Pericardio.
Carpologia	Contractão tremula, e involuntaria dos dedos.
Carus	Somnolencia profunda.
Catagma	Fractura dos ossos.
Cataptosis	Epilepsia.
Catarrhenma	Oppressão de peito.
Catasarca	Anasarca.
Catatasis	Estenção do corpo nas partes inferiores
Cathemerina	Febre contínua
Cathypnia	Somno nimiamente pezado.
Cauledon	Fractura transversal.
Causodes	Grão menor da febre ardente.
Causus	Febre ardente, ou inflammatoria.
Cedmata	Defluxão dos articulos.
Cele	Hernia.
Cenchrias	Herpes miliares.
Cephalea	Dor de cabeça pertinaz
Cephalalgia	Dor de cabeça.
Cephalites	Inflamação do cerebro, ou cerebello.
Cephaloloxia	Encalhe, Entupimento de vaso.
Cephalopouia	Pezo de cabeça.
Cerchnasmo	Febre miliar.
Cerchnos	Tosse ferina.
Cercosis	Polypo do utero.
Chasmo	Abrimento de bocca.

<b>Cheilooace</b>	Escorbuto da boca das crianças.
<b>Chemosis</b>	Inflamação grave de olhos.
<b>Chimethlon</b>	Frieiras.
<b>Chiragra</b>	Gotta nas mãos.
<b>Chironio</b>	Ulcera maligna.
<b>Chlorosis</b>	Coras palidas. Cor amarella da cutis.
<b>Choeras</b>	Escrophulas.
<b>Cholelithus</b>	Pedra na bexiga do Feth.
<b>Cholorrhoea</b>	Fluxo de bilhe.
<b>Chordapso</b>	Paixão iliaca.
<b>Chrupsia</b>	Molestia que representa os objectos todos da mesma cor.
<b>Chylorrhoea</b>	Fluxo do Chylo.
<b>Cirsocela</b>	Hernia varicosa.
<b>Cnesmo</b>	Comixão.
<b>Cnissoregmia</b>	Veja Pyrosis.
<b>Coeloma</b>	Ulcera concava na Cornea.
<b>Colpoptosis</b>	Queda, ou descahimento da Vagina.
<b>Colporrhagia</b>	Hemorragia da Vagina.
<b>Coma</b>	Veja Carus.
<b>Coma vigil</b>	Veja Typhomania. Agripnia.
<b>Cophosis</b>	Sardez.
<b>Coprorrhoea</b>	Incontinencia do excremento.
<b>Coprostasia</b>	Retardação do excremento.
<b>Coryza</b>	Fluxo do nariz estillicidio.
<b>Coxagra</b>	Gotta sciatica.
<b>Cynanche</b>	Esquinencia.
<b>Cynantropia</b>	vide Hydrophobia.
<b>Cyphosis, Cypho, Cyphoma</b>	Curvatura da Espinha dorso.
<b>Cyrtosis</b>	Veja Rachitis
<b>Cyrtetes</b>	Inflamação da hexiga.
<b>Cystocela</b>	Hernia da bexiga.
<b>Cystorrhagia</b>	Hemorragia da bexiga.
<b>Cystospasmo</b>	Espasmo da bexiga.
<b>Dacryadenitis</b>	Inflamação da glandula lacrymal
<b>Dacryrrhoea</b>	Continua fluxão de lagrimas

Diachalasia	Dezunião das suturas.
Diacinoma	Deslocação, ou separação dos ossos.
Dialeipyræ	Febres intermittentes.
Dialysis	Quebrantamento de forças.
Diamnes	Incontinencia da urina, no acto de dormir.
Diastasis	Veja Diacinoma.
Diplopia	Representação duplicada dos objectos.
Distichiasis	Duplicada ordem de cabellos nas Palpebras.
Dyesthesia	Difficuldade de sentidos.
Discatabrosis	Difficuldade no engolir
Dyschezia	Deposição dolorosa do escremento.
Dyscinesia	Impossibilidade de movimento.
Dysgeusthia	Depravação do gosto.
Dyslalia	Vicio na fella.
Dysmasesis	Difficuldade em mastigar e comer.
Dysmenorhea	Menstruação supprimida.
Dysmnesia	Debilidade de memoria.
Dysodontiasis	Difficultosa dentificação.
Dysocoea	Difficuldade no ouvir.
Dysesmia	Cheiro importuno, e desagradavel.
Dyspepsia	Difficuldade de cozimento no estomago.
Dyspermatismo	Demora na ejaculação do semen.
Dysphagia	Difficuldade de engolir.
Dysphobia	Vista curta Myopia.
Dysphonia	Difficuldade de fallar.
Dyspnoea	Respiração difficultosa.
Dyspotismo	Difficuldade de beber.
Dysthymia	Anxiedade do espirito.
Dystocia	Parto difficultoso.
Dysuria	Supressão de urina.
Ecclisis	Separação dos ossos.
Eclampsia	Convulções nas crianças.
Ecpiesmus	Protuberancia dos olhos.
Ectropio	Palpebras reviradas.



Flephantiasis	Lepra negra.
Elodes	Febre sudatoria.
Emphysema	Tumor flatulento.
Ephemera	Febre diaria.
Ephialtes	Asthma nocturna.
Ephitrosis	Suor demasiado.
Epiala	Febre continua, e maligna, em que o calor e frio se sentem ao mesmo tempo.
Epilepsia	Gotta coral, Mal caduco.
Epiphora	Olhos lacrimosos involuntariamente.
Epilegia	Paralysis em metade do corpo.
Epiplocele	Hernia do Epiplon ou redenho.
Epilolitis	Inchação do Epiplon.
Epiplocephalo	Hernia umbilical do Epiplon
Epietasis	Hemorragia do nariz.
Epulis	Tumores inflammatorios das gengivas.
Erotomania	Mania por amores.
Erythema	Gotta rosada.
Esoche	Tuberculo na cavidade do intestino recto.
Exania	Sahida do anus.
Exarthrosis	Laxidão total.
Exichos	Deslocação do osso femural
Exocyste	Descalhamento da bexiga.
Exomphalos	Protuberancia, ou sahida do umbigo.
Exephtalmia	Descalhimento dos olhos.
Galactorrhea	Floxo do leite
Gastrites	Inflamação do ventriculo.
Gastrocele	Hernia do ventriculo.
Gastrodynia	Dôr de estomago.
Gelasma	Rizo sardonico
Glaucomo	Cataracta secca.
Gloftagra	Dôr da Lingua.
Glossolysis, Glossoplegia	Paralysis da Lingua.

Gomphiasis	Dentes abelados.
Gonagra	Gotta nos joelhos.
Gonocrasia	Incontinencia do semen.
Gryphosis	Incurvamento das unhas.
Hemalopia	Farpão nos olhos.
Hematemesis	Vomito de sangue.
Hemateucephalo	Effusão de sangue no cerebro.
Hematidrosis	Suor de Sangue.
Hematocoele	Effusão de sangue no escroto.
Hematochezia	Rejecção de sangue pelo ventre.
Hematocelia	Hemorragia na cavidade do abdômen.
Hematometra	Hemorragia do utero.
Hematosteon	Hemorragia na cavidade do osso.
Hematothorax	Effusão de sangue no thorax.
Hematuria	Orina sanguinolenta.
Hemorrhea	Fluxo de sangue passivo.
Hemorrhagia	Fluxo de sangue activo.
Helminthiasis	Molestias dos intestinos, por causa de lombrigas.
Helosis	Inversão das palpebras reflexas.
Hemitritea	Febre meia terça.
Hemiplegia	Paralyia de hum dos lados.
Hepatalgia	Dor do figado.
Hepatempyrraxis	Infarte do figado.
Hepatocoele	Hernia do figado.
Hepatirrhœa	Fluxo hepatico.
Hepatitis	Inflammação do figado.
Hidroschesis	Suspensão do suor.
Hyarthros	Hydropesia dos articulos.
hydrachnis	Bexigas lymphaticas.
Hydronion	Hydropesia do ovario.
Hydroblepharon	Hydropesia das palpebras.
Hydrocardia	Hydropesia do Pericardio.
Hydrocele	Hydropesia do escroto.
Hydrocephalo	Hydropesia da cabeça.
Hydroenterocele	Hydropesia do escroto com hernia.

Hydrogaster  
Hydrometra  
Hydropericardion  
Hydrophobia  
Hydrophthalmia  
Hydropneumonia  
Hydroorchis  
Hydrothachitis  
Hydroscheon  
Hydrosteon  
Hypercatharsis  
Hypernipele  
Hypersarcos  
Hypnobasis  
Hypocophosis  
Hypogastrocele  
Hypospasma  
Hyposphagma

Hypostaphyle  
Histeralgia  
Hysteratresia  
Hysteritis  
Hysterocele  
Hysteroconismus  
Hysteroloxia  
Hysteropsochia  
Hysteromania  
Hysteroptosis  
Hysteroribagia  
Hysterorrhea  
Hystrix

Ichthyosis

Icthanus

Leucophlegmacia

Hydropesia do ventriculo.

Hydropesia do utero

Hydropesia do pericardio

Raiva, aversão a agua.

Hydropesia do olho.

Hydropesia do bofe.

Hydropesia do testiculo.

Spina bifida.

Hydropesia do escroto.

Hydropesia dos ossos.

Demasiada evacuação.

Gordura demasiada.

Excrescencia carnosa.

Melestia de andar em pé sonhando.

Dificuldade no ouvir.

Hernia do ventre

Espasmo do olho.

Effusão de sangue por picada no  
olho.

Queda da madre.

Dôres no utero.

Inpenetração da vulva

Inflamação do utero.

Hernia do utero.

Conixão do utero.

Obliquidade do utero.

Flates pela vulva da vagina.

Furor uterino.

Queda do utero.

Hemorragia do utero.

Flores brancas.

Lepra espinhosa.

Lepra escamosa.

Inflamação das fauces.

Anasarca pituitosa.

<b>Leucorrhœa</b>	Flores brancas benignas.
<b>Liemeria</b>	Fluxo de alimento indigesto.
<b>Lipopyetia</b>	Pequeno dilúquio.
<b>Liposphyxia</b>	Intermittencia do pulso.
<b>Lipynia</b>	Febre continua, em quanto as partes externas estão frias, e as internas se abraçam.
<b>Lithiasis</b>	Geração da pedra na bexiga
<b>Lochii-chesia</b>	Supressão dos Lochios
<b>Lochiorrhœa</b>	Demasiado fluxo dos Lochios.
<b>Lordosis</b>	Torcimentos dos ossos.
<b>Luxanthros</b>	Perversão dos músculos, e ossos da cabeça.
<b>Lymphorrhœa</b>	Fluxo lymphatico.
<b>Lingodes</b>	Febre singultuosa.
<b>Malacrosis</b>	Queda das submandibulas
<b>Malacosteou</b>	Moleza dos ossos.
<b>Mastodynia</b>	Dor dos peitos.
<b>Mel-na</b>	Molestia negra, fluxo do hão.
<b>Malasiecterns</b>	Ictericia negra.
<b>Meratrophia</b>	Atrophia particular.
<b>Merocelo</b>	Hernia femoral.
<b>Merorixis</b>	Hernia crural.
<b>Metaptosis</b>	Degeneração de huma molestia em outra.
<b>Metranastrophe</b>	Inversão do utero.
<b>Metneuphaxis</b>	Inarte dos vasos uterinos.
<b>Metrites</b>	Inflamação do utero.
<b>Metrocampsis</b>	Reversão do utero a seu lugar.
<b>Metrorhexis</b>	Ruptura do utero.
<b>Metrorrhagia</b>	Hemorrhagia de utero.
<b>Milpha</b>	Cabimento dos cabellos das palpe- bras.
<b>Monopegia</b>	Dor que occupa só hum lugar da cabeça.
<b>Myetrophonla</b>	Falla pelos narizes.
<b>Mydriasis</b>	Demaziada dilatação da pupila.
<b>Myodesopsia</b>	Vizão de moscas, ou moscas na vista.

<b>Myodynia</b>	Rheumatismo agudo , ou inflammacão dos musculos , ou tendões.
<b>Myonarcosis</b>	Estupor dos musculos.
<b>Myopalmo</b>	Sobresalto de tendões.
<b>Myopia</b>	Vista curta.
<b>Myositis</b>	Inflamação dos musculos.
<b>Necrosis</b>	Esphacelo secco dos ossos.
<b>Nephralgia</b>	Dores nephriticas
<b>Nephremphraxis</b>	Infarte dos vasos dos rins.
<b>Nephrorrhagia</b>	Hemorrhagia dos rins.
<b>Neurasthenia</b>	Debilidade de nervos.
<b>Neurohlacia</b>	Torpor dos nervos.
<b>Neurodes</b>	Febre nervosa.
<b>Notialgia</b>	Dor das espadoas.
<b>Nyctalopia</b>	Cegueira de dia , e não de noite.
<b>Nymphomania</b>	Furor uterino.
<b>Odaxismo</b>	Comixão muito activa.
<b>Oestromania</b>	Veja Nymphomania , Satyriasis.
<b>Omphalocele</b>	Hernia umbilical.
<b>Opisthotonos</b>	Tetano dorsal.
<b>Orchitis</b>	Inflamação dos testiculos.
<b>Orchioccele</b>	Tumor dos testiculos , ou Hernia humeral.
<b>Orrorrhoea</b>	Fluxo seroso.
<b>Orthropnoea</b>	Falta de respiração.
<b>Osceloccele</b>	Hernia do escroto.
<b>Ostealgia</b>	Dor dos ossos.
<b>Osteopaedion</b>	Ossificação do feto.
<b>Otalgia</b>	Dor de ouvidos.
<b>Otitis</b>	Inflamação dos ouvidos.
<b>Otorrhagia</b>	Fluxo sanguineo dos ouvidos.
<b>Otorrhea</b>	Fluxo purulento dos ouvidos.
<b>Oxyphonia</b>	Voz extremamente aguda.
<b>Oxyegmia</b>	Arroto azedos.



<b>Pachyaema</b>	Sangue espesso.
<b>Panoclia</b>	Bubões inguinaes.
<b>Panophobia</b>	Terror repentino.
<b>Paracope</b>	Pequeno delirio no ardor da febre.
<b>Paracynanche</b>	Dor de garganta, Angina.
<b>Paraglosse</b>	Queda da Lingua.
<b>Paraphrenitis</b>	Dilirio com febre continua pela inflamação do diaphragma.
<b>Paraplexia</b>	Paralisia universal.
<b>Parasynanche</b>	Inflamação das fauces.
<b>Parosmia</b>	Alteração do cheiro.
<b>Parulis</b>	Inflamação das gengivas.
<b>Pemphigus</b>	Febre quente.
<b>Peritonitis</b>	Inflamação do Peritonio.
<b>Phalacroasis</b>	Cabimento dos cabellos.
<b>Phalangosis</b>	Duplicada ordem de cabello nas sobrancelhas.
<b>Phallopsophia</b>	Flatos pelo Penis.
<b>Phallorrhagia</b>	Hemorragia do Penis.
<b>Phimosia</b>	Aperto do Prepucio.
<b>Phleborrhagia</b>	Ruptura das veias.
<b>Phlogopyra</b>	<i>Vejá Synocha.</i>
<b>Phygethion</b>	Tumor procedido da inflamação das glandulas.
<b>Ptyscenia</b>	Inchaço do Abdomen.
<b>Pysometra</b>	Inchaço do utero.
<b>Pneumatocele</b>	Hernia ventosa.
<b>Pneumonorrhagia</b>	Hemorragia do hofe.
<b>Proctalgia</b>	Dor do anus.
<b>Proctitis</b>	Inflamação do anus.
<b>Proctocoele</b>	Queda do anus.
<b>Psora</b>	Sarna.
<b>Psoriasis</b>	Sarna secca do escroto.
<b>Psorophthalmia</b>	Sarna nas palpebras.
<b>Pudendagra</b>	Dor dos genitales.
<b>Pyica</b>	Febre putrida
<b>Pyuria</b>	Quina purulenta.
<b>Rhachialgia</b>	Colica de chumbo ou nervosa.
<b>Rachisagra</b>	Arthritis espinhal.

Rhenmopyra.  
Rhyas

Febre rheumatica.  
Ulceração da caruncula lacrimal.

Sapropyra  
Sarcocoele  
Sarcophallo  
Siagenagra  
Sparganosis  
Splanchnodyne  
Splenites  
Splenocoele  
Sondilalgia  
Stomatorrhagia  
Synocha  
Syphlites

Veja Synocha.  
Heraia carnosa.  
Excrecencia carnosa no embigo.  
Arthritis maxilar.  
Metastase lactea.  
Dor das visceras.  
Inflamação do baço.  
Hernia do baço.  
Dor das vertebrae.  
Sangue pela bocca.  
Febre inflammatoria.  
Mojestia venerea.

Toaxis  
Ty. cele  
Trachelagra  
Trichiasis  
Typhomania  
Typhos  
Tyrosis

Perfuração dos humores.  
Veja Bronchocoele.  
Anzina arthritica.  
Inflexão das pestanas para dentro.  
Cama vigil.  
Febre nervosa, febre maligna.  
Coalho de leite no ventriculo.

Uriasis

Veja Lithiasis.

Xerophthalmia  
Xerotes

Ophtalmia secca.  
Disposição secca do corpo,

Zarathan

Cancros dos peitos.

# INDICE

## A.

	Pag.
Acetato de Chumbo	65.
— de Potassa	75.
Acidos mineraes	63.
Acido muriatico	ib.
— nitrico	54.
— sulfurico	53.
Agrimonia	59.
Aguas acidulas	237.
Agua alkaliua gazoza	ib.
— de Balarne	239.
— de Barege	242.
— de Bussang	240.
— de Cal	III - 122.
— das Caldas da Rainha	243.
— de Contrexeville	239.
— de Epsom	ib.
Aguas Ferreas.	241.
— Ferruginosas	240.
— mineraes	236.
— ditas sulfureadas	242.
— de Plombieres	240.
Agua Ophthalmica	224.
Aguas Salinas	238.
Agua de Selz	237.
— de Sedlitz	238.
— de Spa	240.
Aguas Sulfurosas	241.
Agua Sulfuro-salina	242.
— de Vals	241.

Agua de Vichy	241.
Alambre	22
Alimentos	199.
Alkalís	123.
Alcohol	5
Almíscar	32
Althea	97
Ammoniaco	14
Angostura	48.
Antácidos	122.
Anthelmínticos	226.
Ammonio	66.
— carbonizado	33. 210.
Anti-pasmódicos	236.
Appendix sobre as Aguas mineraes	112.
Aphrodisíacos	44.
Arnica	113.
Aromaticos	64.
Arruda	53.
Arsenico branco	105.
Asaro	30.
As-a-fetida	33. 186.
Astringentes	174.
Atónicos	87. 154.
Azebre	101.
Azeugue	
<b>B.</b>	
Bálsamo de Cupaiba	73. 111.
Banhos frios	56. 128.
Bebida de Ammonia liquida citrada	148.
— Antihystérica	219.
— com Oxy. el colchico	158.
Baito de Scylla	168.
Belladena	24.
Bijoum	96.
Bisorta	49.
Bolo de Almíscar	218.
Dito dito Camphorado	219.

Bolo de Almiscar com Nitrato de Potassa, e	
Camphora	148.
— de Cantharidas com Camphora	155.
— — com Carbonato de Ammoniac	211.
— de Carbonato de Ammoniac com Camphora	147.
— — de Ferro	203.
— de Castorio	219.
— de Ferro Ammoniacal	213.
— de Guaiaco com Tartrito de Potassa antimoniado	151.
— de Muriato de Mercurio doce	228.
— de Oxyda de Antimonio com Phosphato de Cal	150.
— de Rhuibarbo com Muriato de	
Mercurio doce	166.
— de Sábão com Oleo volatil de Junipero	158.
— de Scylla	137.
— de Sulfato de Zinco	138.
Borato de Soda	128.

C

Calumba	48.
Camphora	60.
Canafistula	79.
Canella	9.
Cantharidas	72 113 126.
Carbonato de Ammoniac crystalizado	14.
— Calcareo	122.
— de Magnezia	123.
Cardamomo	110.
Cardo santo	44.
Carminativos	108.
Cárcalho	39.
Castorio	38.
Cataplasma de Chumbo acetada	186.
— de Lipbaça	183.
— de Tabaco	137.
Catharticos	78 161 162.
Cato	41.
Ceroto Antihemorrhoidal	224.
Chamedrios	62.
Chymicos ( <i>Productos</i> )	229.



Cienta	25.
Clyster de Almiscar	221.
— de Assafetida	231.
— Campborado	229.
— de Coloquintidas	168.
— de leite com Opio	183.
— de Linhaça com Tintura de Opio	182.
— de Macella com Sabina	174.
— de Muriato de Soda	167.
— Nutriente	234.
— Opio	212-225.
— Quinado	199.
— de Sulfato de Magnezia	167.
— de Soda com Electuario de Senne	167.
— de Tabaco	168-219.
— Terebintinado	167.
Colyrio de Acetato de Chumbo, e Sulfato de	
Alumina	191.
— de Acetito de Ammoniac	185.
— de Chumbo	185-212.
— de Sulfato de Cobre	213.
— de Zinco, e de Alumina	186.
— com Camphora	191.
Colchico	72.
Coloquintidas	85.
Cozimento de casca de Carvalho com Sulfato	
de Alumina	189.
— — de Salgueiro composto	199.
Cozimento de Musgo Islandico	182.
Cravo da India	12.
Cumo de Limão com Tintura de Opio	179.

## D.

Diaphoreticos	57-144-145.
Digitalis	70.
Diureticos	69-169.

## E.

Electricidade	16.121.
Electuario de Cato com Magnezia	189.
— de Enxofre	169.
— de Estanho	228.
— de Quina com Carbonato de Ferro	201.
— — com Macella	201.
— de Rosas com Acido sulfurico	182.
— de Tamarindos com Rhuibarbo	169.
Emenagogos	89.171.
Emeticos	104.115.
Emolientes	179.
Emulção de Gomma Ammoniaco composta	141.
— com Assaetida em lugar de Ammonia	141.
— de Oleo de Amendoas doces	181.
— — de Ricino com Tintura de Senne	171.
Enema Terebentinado	159.
Enxofre	68.
Epithema de Muriato de Ammoniaco	186.
Errhins	175.
Escamonea	85.
Esponja calcinada	124.
Estanho	120.
Estimulantes	1.204.
Ether sulfurico	13.
Expectorantes	94.138.

## F.

Ferro	49.92.125.
Feto maxo	119.
Fomentação Antipatalytica	215.
— de Cozimento de Macella com Dor- mideiras	213.
— de Muriato de Mercurio corrosivo	215.
Fricções	126.

## G.

Galbano	93.
Gargarejo galhoso	189.

Gargarejo mercurial	178.
— com Borato de Soda	178.
— de Quina composto	213
Gelea de Musgo Islandico	182.
— de Salepo	182.
Genciana	47.
Giugibre	11. 109.
Gomma Ammoniac	94.
Gomma Guta	87.
Gottas de Tintura de Opio com Vinho de Au- timonio	143.
Gualaco	63.

H

HERva doce	110.
Hortela pimenta	109.
— vulgar	109.
Hysopo	98.

I.

Imperatoria	64.
Infusão de Digitalis	71. 157
— — composta	157.
Infusão de Ipecacuanha	138.
— de Junipero	159.
— de Quina composta	199.
— — vinhosa composta	199.
— de Quacia com Tintura de Quina	200.
— de Rosas acidula com Tintura de Kino	190.
— de Senne com Sulfato de Magnezia	170.
Injecção de Acetato de Chumbo	191.
— de Sulfato de Zinco, e de Alumina	191.
Ipecacuanha	106.

J.

Jalapa	84.
Jarro	69.
Junipero	70.

de Kino

Kino 42.

L.

Ladano 31

Lambedor de Oxymel de Scylla 148.

Laranja, e Limão 108.

Lexivia caustica 112.

Limonada Muriatica 203.

— Nitrica 178 203

— Sulfurica 203

Linimento de Ammoniac 126

— de Espirito de Camphora 127

— de Sábão ib.

— Terebentinado 159.

Lithontripticos 111

Lozna 49.

M.

Magnezia calcinada 123.

Malvas 98.

Manná 79.

Meimendro negro 26.

Mercurio 121.

Mezerião 62.

Millefolio 40.

Mistura de Acetato de Ammoniac com Tintura d'Opio 147.

— de Acido Muriatico. 185.

— de Ammoniac com Scylla 159

— Anodina 223

— Antibysterica 218.

— Antispasmodica com Tintura d'Opio 151.

— Aromatica 214.

— de Arrobe de S bugo 152.

— de Assaetida 219.

— de Balsamo de Cupaiba 211.

Mistura de Beljoim composta	141.
— Camphorada	147.
— de Camphora composta	210.
— — com Tintura de Opio	149.
— de Cêra	181.
— de Ether com Tintura de Opio	223.
— de Gambogina	171.
— de Gomma Kino	182.
— de Greda com Tintura de Cato	189.
— de Guaiaco	149.
— de Ipecacuanha com Carbonato de Soda	221.
— de Magnezia	232.
— de Myrrha com Carbonato de Ferro	201.
— de Oleo de Ricino com Tintura d'Opio	170.
— de Oxy mel	159.
— de Quina com Guaiaco	200.
— de Rhuibarbo composta	167.
— Salina ou Effervescente	185.
— — Camphorada	155.
— de Scylla com Antimonio Tartarizado	143.
— — com Nitrato de Potassa	143.
— de Spermaceti	152.
— de Tintura d'Opio com Cumo de Li- mao.	224.
— de Valeriana com Ammoniac	214.
Mostarda	167. 147
Moxa	127.
Muriato de Ammoniac	13.
— de Barytes	121.
— de Mercurio doce por sublimação.	102.
— — precipitado	102.
— — de Scheele	104.
— — oxygenado	104.
Muriato de Mercurio sublimado	86.
Musgo Islandico	99.
Myrrha	90.



IV.

Narcoticos	17 222.
Nicotiana	27. 100 107
Nuz muscada	12
Nuz vomica	42. 120.

O.

Oleos	121.
Oleo de Alcamfor com Tintura de Opio	220.
de Ricino	80 121.
volatil de Alambre	127.
Opio	19. 124.
Opoponaco	93.
Oxyda d'Antimonio	68.
— sulfurada rubro fusca	ib.
de Arsenico branco	53.
de Ferro amarella	92.
de Mercurio vermelha pelo fogo	101.
— por Acido nitrico	ib.
de Zinco	62.

P.

Pão Campeche	58.
Phosphoro	8.
Pillulas de Acetato de Chumbo	190.
de Antimonio tartarizado com Opio.	151.
de Assafetida com Extracto de Macella	174.
de Carbonato de Soda	168-232.
de Extracto de Coloquintidas com Opio	163
— de Pão campeche com Rhuibarbo	188.
de Gomma Guta com Muriato de Mercurio doce.	169.
de Guaiaco com Opio, e Ipecacuanha.	151.
de Ipecacuanha com Opio	150.

Pillulas	de Meimandro	293.
—	— com Ipecacuanha	142.
—	de Mariato de Mercurio doce	177.
—	— oxygenado	ib.
—	de Myrrha com Carbonato de Ferro	201.
—	de Nitrato de Prata	215.
—	de Opio.	225.
—	— compostas	142.
—	— com Tartrito de Potassa Antimoniado	151.
—	de Oxyda de Mercurio cinerea	177.
—	— vermelha	176.
—	— de Zibco com Sulfato de	176.
Cobre	Ammoniacal	202.
—	de Quina com Ferro	198.
—	de Rhuibarbo com Mariato de Mercurio doce	166.
—	de Scylla com Mariato de Mercurio doce	155.
—	de Sulfato de Cobre	202.
—	de Tabaco	142.
Pimenta		11.
Pomada	de Digitalis	160.
—	Mercurial	ib.
—	— com Acetato de Chumbo	178.
—	de Scylla	160.
Pds	de Acnito com Antimonio	150.
—	Antidyentericos	234.
—	de Araica com Canella	22.
—	de Asaro compostos	137.
—	de Calumba com Carbonato de Ferro	200.
—	de Carbonato de Ferro com Canella	218.
—	de Casca de Castanheiro com Gengibre	198.
—	de Casca de Carvalho com Macella	188.
—	— de Salgueiro com Quina	200.
Pds	Dentifricos	234.
—	de Digitalis com Tartrito acidulo de Potassa	157.
—	de Euxofre com Tartrito acidulo de Potassa	165.
—	de Escamonea com Jalapa	227.
—	de Espigelia	228.

Pó de Extracto de Aconite	148.
— de Ferro Ammoniacal com Rhuibarbo	193.
— de Gomma Arabia, e Gomma de Trigo	181.
— de Gomma Gualaco com Tartrito de Potassa	149.
— de Gomma Guta	163.
— de Ipecacuanha	140.
— com Antimonio Tartarizado	133.
— de Jalapa com Muriato de Mercurio doce	168.
— de Macella com Myrrha	198.
— de Magnezia com Rhuibarbo	232.
— de Myrrha	141.
— de Nitrato de Potassa com Tartrito acidulo de Potassa	185.
— de Oxyda de Antimonio hydro-sulfurado rubro-fusco com Greda	143.
— com Tartrito acidulo de Potassa	150.
— de Oxyda de Mercurio vermelha pelo fogo	214.
— de Quina com Cravo-aromatico	197.
— com Cascarrilha	ib.
— com Sulfato de Magnezia	ib.
— de Quina com Valerianna	220.
— de Rhuibarbo com Magnezia	165.
— com Mercurio doce	227.
— com Potassa tartarizada	166.
— com Sulfato de Magnezia	166. 197.
— com Tartrito acidulo de Potassa	166.
— de Sabina com Sulfato de Potassa	174.
— de Seylla	140.
— com Camphora	ib.
— com Nitrato de Potassa	155.
— de Sulfato de Mercurio amarello com Asaro	175.
— de Sulfato de Zinco com Angustura.	203.
— com Assucar	234.
— de Tartrito acidulo de Potassa compostos	156.
— de Valerianna	220.
Potassa liquida	113.

Productos chymicos  
Pyrethro

229.  
100

Q

Quercia  
Quina

47.  
36.

R.

Rabão rustico  
Refrigerantes  
Remedios que não podem reduzir-se a Classe  
alguma, etc.  
Rhubarbo  
Roma  
Rubefacientes  
Ruiva dos Tiatureiros

76.  
183.  
233.  
82.  
40.  
125.  
91.

S.

Sabão  
Sbina  
Sbuzueiro  
Sne neutros purgantes  
Silqueiro  
Salsa parilla  
Sangue de Drago  
Sesafraz  
Secordio  
Sylla  
Semente de Alexandria  
Senne  
Seneca  
Serpentaria virginiana  
Silagogos  
Simaruba  
Solução de Antimonio tartarizado  
- Arsenical.

111 124.  
91.  
98.  
83.  
38.  
64.  
43-  
65.  
65-  
77-96  
119.  
81 120  
99.  
29.  
100 176.  
40.  
126-137.  
203.

<b>Solução de Gomma Ammoniaco com Vinagre</b>	
Seyllitico	160.
— de Muriato de Mercurio corrosivo	177.
— de Soda tartarizada	170.
— de Sulfato de Magnezia	170.
— de Soda.	169.
— de Zinco	190.
— de Tartrito acidulo de Potassa com Alkool	
de Junipero composto	150.
— de Antimonio	151.
— com Opio	151.
<b>Sero de Leite Aluminoso</b>	191.
<b>Spermaceti</b>	98.
<b>Spigelia</b>	120.
<b>Sternutatorios</b>	125.
<b>Storaque</b>	32.
<b>Sulfato de Alumina</b>	55.
— de Cobre	75-107.
— de Ferro	92.
— de Magnezia	83.
— de Mercurio amarello	101.
— de Potassa	84.
— de Soda	83.
— de Zinco	51-107.
<b>Sulfureto de Mercurio Antimoniado negro</b>	102.
— de Mercurio negro	103.
— vermelho	ib.
— de Potassa com Assucar	179.

## T.

<b>Tabaco</b>	27-100 107.
<b>Tamarindos</b>	80.
<b>Tartrito de Potassa</b>	84.
— antimoniado	106.
— de Soda	84.
<b>Terebentina de Veneza</b>	71.
<b>Terra Japonica</b>	41.
<b>Tintura de Aconito</b>	224.
— de Bellonin composta	15.



Tintura de Camphora Terebentinada	211.
— de Castorio com Alkool Ammoniacal fetido	174.
— de Digitalis	157.
— de Muriato de Ferro com Calumba	202.
— de Seylla	167.
— de Serpentina com Alkool de Canella	212.
Tomilho Bravo	65.
Tonicos	33-121-191.
Topicos	125.
Tossilage	97.
Trifolio Fibrino	43.

U.

Unguento Antipsorico	18 235.
— Cantharidas	211.
— de Mercurio	103.
— Nitrado	103.
— de Oxyda de Mercurio rubro , ou Ophthalmico	214.
— de Sulfato de Zinco	191.
— de Tartrito de Potassa Antimoniado	126.
Ura-ursi	111.

V.

Valeriana Silvestre	29.
Veado ( <i>fronta de</i> )	123.
Vermifugos	118.
Vinho	6.
— de Ipecacuanha com Antimonio Tarta- rizado	137.
Vitriolado branco	51.

Z

Zinco	51.
-------	-----

F I M.

# EMENDAS

Paginas	linhas	lea-se
17	19	do movimento.
19	34	de incitamento.
80	11	Fructo.
133	85	phlegmasias.
136	1	7.
142	13	tomar uma por trez vezes.
149	8	Gualaco
155	18	41.
	27	42
213	18	178.



